SAFLAX®

Tips

SKU: 13013 Große Schneebanane



© Ranulf Bennet - About © : Contact SAFLAX

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

Български	BG	.....	2
Dansk	DK	.....	2
Deutsch	DE	.....	2
English	UK	.....	2
Eesti	EE	.....	3
Suomalainen	FI	.....	3
Français	FR	.....	3
Ελληνική	GR	.....	3
Gaeilge	IE	.....	4
íslenskur	IS	.....	4
Italiano	IT	.....	4
Hrvatski	HR	.....	4
Latviešu	LV	.....	5
Lietuvių kalba	LT	.....	5
Malti	MT	.....	5
Nederlands	NL	.....	5
Norsk	NO	.....	6
Polski	PL	.....	6
Português	PT	.....	6
Românesc	RO	.....	6
Svenska	SE	.....	7
Slovensky	SK	.....	7
Slovenski	SI	.....	7
Español	ES	.....	7
Česky	CZ	.....	8
Türkçe	TR	.....	8
Magyar	HU	.....	8
日本語	JP	.....	9

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Голям снежен банан

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

Бързо растящ с впечатляващи листа до два метра височина

Бързорастящият снежен банан все още не е толкова известен, колкото много други видове. Образува силно, восъчно и зелено-синьо псевдостъбло. Дългите му листа могат да достигнат 2-2,5 метра, а стволът до 3-3,5 метра. Расте толкова бързо, че след 4 месеца може да достигне метър височина. Това е най-твърдият вид ensete. В англоезичния свят се нарича Снежен банан. Първоначално се смяташе, че е толкова здрав, колкото Musa Basjoo. Смята се, че семето идва от Юнан, където расте до надморска височина от 2700 метра. Наподобяващ Ensete Ventricosum, има дебел синкав ствол, леко бял отвън - но остава малко по-малък и има впечатляващо големи листа. Районът на разпространение се простира над Юнан, Тибет, Североизточна Индия, Тайланд до Нова Гвинея, зимната устойчивост може да бъде много променлива. Ето защо е много важно да знаете откъде идват семената, ако искате да ги култивирате успешно. Семената от района на Юнан (високите планини) са за предпочитане! Не образува ядливи плодове, а и едва ли ще произведем плодове. Видовете Ensete обикновено не образуват деца. Само в редки случаи се появяват спонтанно - при увреждане на вегетационната точка. Ако псевдостъблото замръзне до земята, обикновено се очаква пълна загуба на цялото растение. В противен случай Musas са за предпочитане пред видовете Ensete, тъй като видовете Musa са много по-способни да се регенерират и да образуват нови kidels след въздействието на замръзване. Семената от района на Юнан (високите планини) са за предпочитане! Не образува ядливи плодове, а и едва ли ще произведем плодове. Видовете Ensete обикновено не образуват деца. Само в редки случаи се появяват спонтанно - при увреждане на вегетационната точка. Ако псевдостъблото замръзне до земята, обикновено се очаква пълна загуба на цялото растение. В противен случай Musas са за предпочитане пред видовете Ensete, тъй като видовете Musa са много по-способни да се регенерират и да образуват нови kidels след въздействието на замръзване. Семената от района на Юнан (високите планини) са за предпочитане! Не образува ядливи плодове, а и едва ли ще произведем плодове. Видовете Ensete обикновено не образуват деца. Само в редки случаи се появяват спонтанно - при увреждане на вегетационната точка. Ако псевдостъблото замръзне до земята, обикновено се очаква пълна загуба на цялото растение. В противен случай Musas са за предпочитане пред видовете Ensete, тъй като видовете Musa са много по-способни да се регенерират и да образуват нови kidels след въздействието на замръзване. Ако псевдостъблото замръзне до земята, обикновено се очаква пълна загуба на цялото растение. В противен случай Musas са за предпочитане пред видовете Ensete, тъй като видовете Musa са много по-способни да се регенерират и да образуват нови kidels след въздействието на замръзване. Ако псевдостъблото замръзне до земята, обикновено се очаква пълна загуба на цялото растение. В противен случай Musas са за предпочитане пред видовете Ensete, тъй като видовете Musa са много по-способни да се регенерират и да образуват нови kidels след въздействието на замръзване. **Естествено местоположение**: Ensete glaucum е роден в Непал, Китай и Индонезия. Там расте на надморска височина от 800 - 2000 метра. **Успешно отглеждане:** Отглеждането на семена в къщата е възможно през цялата година. Много твърдите семена трябва внимателно да се награпавят с шкурка, след това да се накиснат в топла вода за 24 часа и след това да се засадят на дълбочина 1 см във влажен субстрат за отглеждане. При температура 22°-25°C поникването става след 3-6 седмици. **Най-доброто местоположение:** Банановите растения обичат светли до слънчеви места, които са донякъде защитени от вятъра. **Оптимална грижа:** Ако снежният банан се държи в саксия, той трябва да е доста голям, тъй като 3-годишно растение вече се нуждае от 60-70 литрова саксия. Ако бананът е засаден, изкопайте голяма дупка и я напълнете с богата на хумус почва преди засаждане. Доставяйте контейнерни растителни торове на всеки 10 дни от май до края на септември. В зависимост от отношението и растежа, растението може да даде и неядливи плодове. **През зимата:** Растението може да оцелее навън през зимата. За тази цел всички листа се отрязват в края на есента. Лъжовото стъбло на многогодишното растение се отрязва на 20 см над земята с прав срез и след това се увива в юта или кокосова рогозка. Поставете върху него пластмасова саксия и я натрупайте с пръст. В оранжерия бананът може да презимува при 10°-12°C. Трябва да се отделят само листата. В края на пролетта снежният банан ще поникне отново до останалия ствол. Презимуването на тези банани в земята се препоръчва само в райони с особено благоприятен климат, като Тичино. Най-добре е да изкопаете растението през есента и да отрежете листата, да презимувате голия фалшив ствол с подложка (моля, не отрязвайте фалшивия ствол, тъй като иначе вече не може да се регенерира) без замръзване и сухо при около +5°C. Засадете растението отново през пролетта, тогава то ще поникне отново.



Stor snebanan

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

Hurtigtvoksende med imponerende blade op til to meter høje

Den hurtigt voksende snebanan er endnu ikke så kendt som mange andre arter. Den danner en stærk, voksagtig og grønblå pseudostamme. Dens lange blade kan nå 2-2,5 meter og stammen op til 3-3,5 meter. Den vokser så hurtigt, at den kan blive en meter høj efter 4 måneder. Dette er den hårdeste ensete-art. I den engelsktalende verden kaldes den for snebananen. Først mente man, at den var lige så hård som Musa Basjoo. Frøet siges at komme fra Yunnan, hvor det vokser op til 2700 meters højde. Den ligner Ensete Ventricosum og har en tyk blålig stamme, let hvid på ydersiden - men forbliver lidt mindre og har imponerende store blade. Distributionsområdet strækker sig over Yunnan, Tibet, Nordøstindien, Thailand til Ny Guinea, vinterhårdførheden kan være meget varierende. Det er derfor meget vigtigt at vide, hvor frøene kommer fra, hvis man ønsker at dyrke dem med succes. Frø fra Yunnan-regionen (høje bjerge) er at foretrække! Den danner ingen spiselige frugter, og det er heller ikke sandsynligt, at vi producerer frugt. Ensete-arterne danner normalt ikke børn. Kun i sjældne tilfælde opstår de spontant - når vegetationspunktet er beskadiget. Hvis pseudo-stammen fryser til jorden, er et totalt tab af hele planten normalt at forvente. Ellers er Musas at foretrække frem for Ensete-arter, da Musa-arter er meget mere i stand til at regenerere og danne nye kidels efter påvirkningerne af frost. Frø fra Yunnan-regionen (høje bjerge) er at foretrække! Den danner ingen spiselige frugter, og det er heller ikke sandsynligt, at vi producerer frugt. Ensete-arterne danner normalt ikke børn. Kun i sjældne tilfælde opstår de spontant - når vegetationspunktet er beskadiget. Hvis pseudo-stammen fryser til jorden, er et totalt tab af hele planten normalt at forvente. Ellers er Musas at foretrække frem for Ensete-arter, da Musa-arter er meget mere i stand til at regenerere og danne nye kidels efter påvirkningerne af frost. Frø fra Yunnan-regionen (høje bjerge) er at foretrække! Den danner ingen spiselige frugter, og det er heller ikke sandsynligt, at vi producerer frugt. Ensete-arterne danner normalt ikke børn. Kun i sjældne tilfælde opstår de spontant - når vegetationspunktet er beskadiget. Hvis pseudo-stammen fryser til jorden, er et totalt tab af hele planten normalt at forvente. Ellers er Musas at foretrække frem for Ensete-arter, da Musa-arter er meget mere i stand til at regenerere og danne nye kidels efter påvirkningerne af frost. Hvis pseudo-stammen fryser til jorden, er et totalt tab af hele planten normalt at forvente. Ellers er Musas at foretrække frem for Ensete-arter, da Musa-arter er meget mere i stand til at regenerere og danne nye kidels efter påvirkningerne af frost. Hvis pseudo-stammen fryser til jorden, er et totalt tab af hele planten normalt at forvente. Ellers er Musas at foretrække frem for Ensete-arter, da Musa-arter er meget mere i stand til at regenerere og danne nye kidels efter påvirkningerne af frost. **Naturlig beliggenhed**: Ensete glaucum er hjemmehørende i Nepal, Kina og Indonesien. Der vokser den i 800 - 2000 meters højde. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning af frøene i huset er mulig hele året rundt. De meget hårde frø skal omhyggeligt gøres ru med sandpapir, derefter lægges i blød i stuevarmt vand i 24 timer og derefter plantes 1 cm dybt i fugtigt vækstsubstrat. Ved en temperatur på 22°-25° C sker spiringen efter 3-6 uger. **Den bedste beliggenhed:** Bananplanter elsker lyse til solrige steder, der er lidt i læ for vinden. **Optimal pleje:** Hvis snebananen opbevares i en potte, skal den være ret stor, da en 3-årig plante allerede har brug for en 60-70 liters potte. Hvis bananen er plantet ud, graves et stort hul og fyldes med humusrig jord inden plantning. Tilfør containerplantegødning hver 10. dag fra maj til slutningen af september. Afhængig af holdning og vækst kan planten også producere ikke-spiselige frugter. **Om vinteren:** Planten kan overleve udenfor om vinteren. Til dette formål skæres alle blade af sidst på efteråret. Staudens falske stængel skæres 20 cm over jorden med et lige snit og pakkes derefter ind i jutefleece eller en kokosmåtte. Sæt en plastikpotte over den og bun den op med jord. I drivhuset kan bananen overvintre ved 10°-12°C. Kun bladene skal skilles ad. I det sene forår vil snebananen spire igen ved siden af den resterende stamme. Overvintring af disse bananer i jorden anbefales kun i områder med et særligt gunstigt klima, såsom Ticino. Det er bedst at grave planten op om efteråret og skære bladene af, overvintre den nøgne falske stamme med grundstamme (vær venlig ikke at skære den falske stamme tilbage, da ellers ikke længere er i stand til at regenerere) frostfri og tør ved omkring +5°C. Plant planten igen om foråret, så spirer den igen.



Große Schneebanane

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

Schnellwachsend mit eindrucksvollen bis zu zwei Meter hohen Blättern

Die schnellwachsende Schneebanane ist noch nicht so bekannt wie viele andere Arten. Sie bildet einen starken, wachsartigen und grünblauen Scheinstamm aus. Ihre langen Blätter können 2 - 2,5 Meter und der Stamm bis zu 3 - 3,5 Metern erreichen. Sie wächst so schnell, dass sie durchaus nach 4 Monaten schon einen Meter hoch werden kann. Das ist die härteste Ensete-Art. Im englischen Sprachraum wird sie die Snow Banana (Schneebanane) genannt. Zunächst nahm man an, sie sei so hart wie die Musa Basjoo. Das Saatgut soll aus Yunnan stammen, dort wächst sie bis in Höhen von 2700 Meter. Sie ähnelt Ensete Ventricosum, hat einen dicken bläulichen Stamm, außen leicht weiß - bleibt aber etwas kleiner und hat eindrucksvolle große Blätter. Das Verbreitungsgebiet erstreckt über Yunnan, Tibet, Nordostindien, Thailand bis Neuguinea, die Winterhärte kann sehr variabel sein. Es ist deshalb ganz wichtig zu wissen, woher das Saatgut stammt, wenn man sie erfolgreich kultivieren will. Saatgut aus der Region Yunnan (große Berghöhen) ist unbedingt zu bevorzugen! Sie bildet keine essbaren Früchte, zur Fruchtbildung wird es auch bei uns wohl kaum kommen. Die Ensete-Arten bilden gewöhnlich keine Kindel. Nur in seltenen Fällen gibt es spontan welche - wenn der Vegetationspunkt geschädigt ist. Falls der Scheinstamm bis zum Boden abfriert, ist meistens mit einem Totalverlust der ganzen Pflanze zu rechnen. Ansonsten sind Musas den Ensete-Arten vorzuziehen, da Musa-Arten viel regenerierungsfähiger sind und nach Frosteinwirkung neue Kidel bilden. **Naturstandort**: Die Heimat der Ensete glaucum liegt in Nepal, China und Indonesien. Dort wächst sie in Höhenlagen von 800 - 2000 Metern. **Anzucht:** Die Anzucht der Samen im Haus ist ganzjährig möglich. Die sehr harten Samen sollten Sie mit Sandpapier vorsichtig anrauen, anschließend für 24 Stunden in raumwarmen Wasser vorquellen und danach 1 cm tief in feuchtes Anzuchtsubstrat setzen. Bei einer Temperatur von 22°-25° C erfolgt die Keimung nach 3 -6 Wochen. **Standort:** Bananenpflanzen lieben helle bis sonnige und etwas windgeschützte Standplätze. **Pflege:** Wird die Schneebanane im Kübel gehalten, sollte dieser recht groß ausfallen, da bereits eine 3 Jahre alte Pflanze einen 60-70 Liter Topf benötigt. Wird die Banane ausgepflanzt, ein großes Loch graben und dieses mit humusreicher Erde füllen bevor Sie die Pflanze einsetzen. Von Mai bis Ende September alle 10 Tage mit Kübelpflanzendünger versorgen. Je nach Haltung und Wachstum kann die Pflanze auch nicht essbare Früchte ansetzen. **Im Winter:** Die Pflanze kann im Winter draußen überleben. Dafür werden bereits im Spätherbst erst alle Blätter abgeschnitten. Der Scheinstamm der Staude wird mit einem geraden Schnitt 20 cm oberhalb der Erdoberfläche abgetrennt und danach mit einem Jute-Fleece oder einer Kokosmatte umhüllt. Einen Plastiktopf darüberstülpen und mit Erde anhäufeln. Im Gewächshaus kann die Banane bei 10°-12°C überwintern. Es müssen nur die Blätter abgetrennt werden. Im späten Frühjahr treibt die Schneebanane neben dem Reststamm wieder aus. Diese Banane im Boden zu überwintern ist nur in klimatisch ganz besonders bevorzugten Gebieten zu empfehlen, wie zum Beispiel im Tessin. Am Besten ist, man gräbt die Pflanze im Herbst aus und schneidet die Blätter ab, überwintert den nackten Scheinstamm mit Wurzelstock (Scheinstamm bitte nicht zurückschneiden, da sonst nicht mehr regenerierungsfähig) frostfrei und trocken bei ungefähr +5°C. Im Frühjahr die Pflanze wieder auspflanzen, sie treibt dann wieder aus.



Snow Banana

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

Rapidly-growing with impressive up to 2 m long leaves

The fast-growing Snow Banana is the strongest specimen of the Ensente family, but by far not as famous as other species. It grows a strong and wax-like, green-blue coloured pseudo-stem that can reach a height of 3 m to 3,50 m, whereas the long leaves of the plant can become 2 m to 2,50 m tall. It grows as rapidly as it can become one meter tall in just about four months. In English-speaking areas the Ensente glaucum is called Snow Banana, and initially it was believed to be as strong as the Musa Basjoo. The seeds come most likely from Yunnan, where it grows in heights of up to 2700 meters above sea level. The Snow Banana resembles the Ensente Ventricosum, with a thick bluey stem, slightly white on the surface - but it grows a bit smaller and develops impressive large leaves. Its dispersal area stretches from Yunnan, Tibet and North East India to Thailand and until New Guinea, while its winter hardiness is quite variable. Therefore, it is imperative to know for cultivation from where the seeds came from. seeds from the high mountain area of Yunnan are definitely the best choice! The Snow Banana doesn't produce any eatable fruits and you will likely not see any fructification at all. The Ensente species also usually doesn't develop any layers - only in rare cases it happens spontaneously. If the pseudo-stem freezes off all the way to the ground, the plant will most certainly die. However, a Musa plant is always be preferable to an Ensente species since it is more likely to regenerate after frost and produce new layers. **Natural location**: The natural habitat of the Snow Banana is in Nepal, China and Indonesia. There, it grows in heights of 800 to 2000 meters above sea level. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase the germinability, you should slightly roughen the hard seed with a piece of sandpaper and place it for about 24 hours in warm water for priming. After that, plant the seeds about 1 cm deep into moist potting compost. At a temperature between 22° and 25° Celsius the germination will take three to six weeks. **The best location:** Banana plants prefer bright and sunny places, ideally in a wind-protected spot. **Optimal care:** Tub plants have to be kept in a rather big pot right away since it will need already with three years of age a large tub of 60 to 70 litres. For outdoor plants you have to fill up a huge hole with humus-rich earth before planting the Snow Banana. From May until the end of September you may give fertilizer for tub plants every 10 days. Depending on the way of cultivation, the Snow Banana may even produce fruits, but they are not good to eat. **In the winter:** The Snow Banana can hibernate outdoors. For that you may cut all the leaves in late autumn. The pseudo-stem is to be cut straight at a height of 20 cm above ground and has to be covered with jute-fleece or coconut-matting. After that, you put a plastic pot over it and earth up the soil. Inside a greenhouse the Snow Banana can hibernate at a temperature of 10° to 12°Celsius - only the leaves have to be cut off. In late spring the plant will sprout again next to the left-over stem. To let the Snow Banana hibernate outdoors is only advisable in special climate areas, for example in the Tessin region. The best and safest way to bring your plant through the winter is by digging it up, cutting off the leaves and just keep the naked pseudo-stem with its rooting in a dry and frost-free place with a temperature around 5°Celsius. Don't cut the stem since the plant will not regenerate otherwise. In spring the Snow Banana can be planted out and will sprout again.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Suur lumine banaan

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

Kiirekasvuline muljetavaldavate kuni kahe meetri kõrguste lehtedega

Kiiresti kasvav lumebanaan pole veel nii tuntud kui paljud teised liigid. See moodustab tugeva, vahaja ja rohekassinise pseudostüve. Tema pikad lehed võivad ulatuda 2-2,5 meetrini ja tüvi kuni 3-3,5 meetrini. Ta kasvab nii kiiresti, et võib 4 kuu pärast olla meetri kõrgune. See on kõige kõvem ensete liik. Ingliskeelses maailmas nimetatakse seda lumebanaaniks. Alguses arvati, et see on sama karm kui Musa Basjoo. Väidetavalt pärineb seeme Yunnanist, kus see kasvab kuni 2700 meetri kõrgusele. See meenutab Ensete Ventricosumit, on jämeda sinaka tüvega, väljast kergelt valge - kuid jääb veidi väiksemaks ja muljetavaldavalt suurte lehtedega. Leviala ulatub Yunnanist, Tiibetist, Kirde-Indiast, Taist kuni Uus-Guineani, talvekindlus võib olla väga erinev. Seetõttu on väga oluline teada, kust seemned pärinevad, kui soovite neid edukalt kasvatada. Eelistada tuleb Yunnani piirkonnast (kõrgmägedest) pärit seemneid! See ei moodusta sööda vaid vilju ja on ebatõenäoline, et me ka vilja toodame. Ensete liigid tavaliselt lapsi ei moodusta. Ainult harvadel juhtudel ilmnevad need spontaanselt - taimestikupunkti kahjustamisel. Kui pseudovars külmub maapinnale, on tavaliselt oodata kogu taime täielikku kadumist. Muidu on musad eelistatavamad kui Ensete liigid, kuna musa liigid on palju uuenemisvõimelisemad ja moodustavad pärast külma mõju uusi kideleid. Eelistada tuleb Yunnani piirkonnast (kõrgmägedest) pärit seemneid! See ei moodusta sööda vaid vilju ja on ebatõenäoline, et me ka vilja toodame. Ensete liigid tavaliselt lapsi ei moodusta. Ainult harvadel juhtudel ilmnevad need spontaanselt - taimestikupunkti kahjustamisel. Kui pseudovars külmub maapinnale, on tavaliselt oodata kogu taime täielikku kadumist. Muidu on musad eelistatavamad kui Ensete liigid, kuna musa liigid on palju uuenemisvõimelisemad ja moodustavad pärast külma mõju uusi kideleid. Eelistada tuleb Yunnani piirkonnast (kõrgmägedest) pärit seemneid! See ei moodusta sööda vaid vilju ja on ebatõenäoline, et me ka vilja toodame. Ensete liigid tavaliselt lapsi ei moodusta. Ainult harvadel juhtudel ilmnevad need spontaanselt - taimestikupunkti kahjustamisel. Kui pseudovars külmub maapinnale, on tavaliselt oodata kogu taime täielikku kadumist. Muidu on musad eelistatavamad kui Ensete liigid, kuna musa liigid on palju uuenemisvõimelisemad ja moodustavad pärast külma mõju uusi kideleid. Kui pseudovars külmub maapinnale, on tavaliselt oodata kogu taime täielikku kadumist. Muidu on musad eelistatavamad kui Ensete liigid, kuna musa liigid on palju uuenemisvõimelisemad ja moodustavad pärast külma mõju uusi kideleid. Kui pseudovars külmub maapinnale, on tavaliselt oodata kogu taime täielikku kadumist. Muidu on musad eelistatavamad kui Ensete liigid, kuna musa liigid on palju uuenemisvõimelisemad ja moodustavad pärast külma mõju uusi kideleid. **Looduslik asukoht**: Ensete glaucum on pärit Nepalist, Hiinast ja Indoneesiast. Seal kasvab see 800–2000 meetri kõrgusel. **Edukas kasvatamine:** Seemnete kasvatamine majas on võimalik aastaringselt. Väga kõvad seemned tuleb hoolikalt liivapaberiga karestada, seejärel 24 tunniks toasoojas vees leotada ja seejärel istutada 1 cm sügavusele niiskesse kasvusubstraati. Temperatuuril 22°-25° C toimub idanemine 3-6 nädala pärast. **Parim asukoht:** Banaanitaimed armastavad valgust ja päikesepaistelisi kohti, mis on veidi tuule eest kaitstud. **Optimaalne hooldus:** Kui lumebanaani hoida potis, peaks see olema üsna suur, kuna 3-aastane taim vajab juba 60-70-liitrist potti. Kui banaan on välja istutatud, kaevake enne istutamist suur auk ja täitke see huumusrikka mullaga. Varustage konteineritaimede väetist iga 10 päeva järel maist septembri lõpuni. Olenevalt suhtumisest ja kasvust võib taim anda ka mittesöödavaid vilju. **Talvel:** Taim suudab talvel väljas elada. Sel eesmärgil lõigatakse kõik lehed hilissügisel maha. Püsiku valevars lõigatakse sirge lõikega 20 cm kõrguselt maapinnast ja mähitakse seejärel džuudist fliisi või kookosmatti. Pange sellele plastikpott ja kuhjake see mullaga. Kasvuhoones võib banaan talvituda 10°-12°C juures. Eraldada tuleb ainult lehed. Hiliskevadel tärkab lumebanaan uuesti allesjäänud tüve kõrval. Nende banaanide ületalvetamine maapinnas on soovitatav ainult eriti soodsa kliimaga piirkondades, näiteks Ticinos. Kõige parem on taim sügisel üles kaevata ja lehed ära lõigata, paljas valetüvi koos pookealusega üle talvitada (palun valetüve mitte tagasi lõigata, kuna muidu pole enam regeneratsioonivõimeline) külmavaba ja kuiv umbes +5°C juures. Kevadel istuta taim uuesti, siis tärkab ta uuesti.



Iso luminen banaani

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

Nopeakasvuinen vaikuttavilla jopa kahden metrin korkuisilla lehdillä

Nopeasti kasvava lumibanaani ei ole vielä niin tunnettu kuin monet muut lajit. Se muodostaa vahvan, vahamaisen ja vihreänsinisen pseudostaudin. Sen pitkät lehdet voivat olla 2-2,5 metriä ja runko 3-3,5 metriä. Se kasvaa niin nopeasti, että se voi olla metrin korkea 4 kuukauden kuluttua. Tämä on vaikein ensete-laji. Englanninkielisessä maailmassa sitä kutsutaan lumibanaaniksi. Aluksi sen uskottiin olevan yhtä kova kuin Musa Basjoo. Siemenen kerrotaan tulevan Yunnanista, missä se kasvaa 2700 metrin korkeuteen. Ensete Ventricosumia muistuttava, sillä on paksu sinertävä runko, ulkopuolelta hieman valkoinen - mutta jää hieman pienemmäksi ja siinä on vaikuttavan suuret lehdet. Jakelualue ulottuu Yunnanista, Tiibetistä, Koillis-Intiasta, Thaimaasta Uuteen-Guineaan, talvikestävyys voi vaihdella hyvinkin paljon. Siksi on erittäin tärkeää tietää, mistä siemenet ovat peräisin, jos haluat viljellä niitä menestyksekkäästi. Siemenet Yunnanin alueelta (korkeat vuoret) ovat suositeltavia! Se ei muodosta syötäviä hedelmiä, ja on epätodennäköistä, että myös tuotamme hedelmää. Ensete-lajit eivät yleensä muodosta lapsia. Vain harvoissa tapauksissa ne ilmestyvät spontaanisti - kun kasvillisuuspiste on vaurioitunut. Jos pseudovarsi jäätyy maahan, on yleensä odotettavissa koko kasvin täydellinen menetys. Muussa tapauksessa musat ovat parempia kuin Ensete-lajit, koska Musa-lajit ovat paljon kykenevämpiä uusiutumaan ja muodostavat uusia kidelejä pakkasen vaikutuksen jälkeen. Siemenet Yunnanin alueelta (korkeat vuoret) ovat suositeltavia! Se ei muodosta syötäviä hedelmiä, ja on epätodennäköistä, että myös tuotamme hedelmää. Ensete-lajit eivät yleensä muodosta lapsia. Vain harvoissa tapauksissa ne ilmestyvät spontaanisti - kun kasvillisuuspiste on vaurioitunut. Jos pseudovarsi jäätyy maahan, on yleensä odotettavissa koko kasvin täydellinen menetys. Muussa tapauksessa musat ovat parempia kuin Ensete-lajit, koska Musa-lajit ovat paljon kykenevämpiä uusiutumaan ja muodostavat uusia kidelejä pakkasen vaikutuksen jälkeen. Siemenet Yunnanin alueelta (korkeat vuoret) ovat suositeltavia! Se ei muodosta syötäviä hedelmiä, ja on epätodennäköistä, että myös tuotamme hedelmää. Ensete-lajit eivät yleensä muodosta lapsia. Vain harvoissa tapauksissa ne ilmestyvät spontaanisti - kun kasvillisuuspiste on vaurioitunut. Jos pseudovarsi jäätyy maahan, on yleensä odotettavissa koko kasvin täydellinen menetys. Muussa tapauksessa musat ovat parempia kuin Ensete-lajit, koska Musa-lajit ovat paljon kykenevämpiä uusiutumaan ja muodostavat uusia kidelejä pakkasen vaikutuksen jälkeen. Jos pseudovarsi jäätyy maahan, on yleensä odotettavissa koko kasvin täydellinen menetys. Muussa tapauksessa musat ovat parempia kuin Ensete-lajit, koska Musa-lajit ovat paljon kykenevämpiä uusiutumaan ja muodostavat uusia kidelejä pakkasen vaikutuksen jälkeen. Jos pseudovarsi jäätyy maahan, on yleensä odotettavissa koko kasvin täydellinen menetys. Muussa tapauksessa musat ovat parempia kuin Ensete-lajit, koska Musa-lajit ovat paljon kykenevämpiä uusiutumaan ja muodostavat uusia kidelejä pakkasen vaikutuksen jälkeen. **Luonnollinen sijainti**: Ensete glaucum on kotoisin Nepalista, Kiinasta ja Indonesiasta. Siellä se kasvaa 800 - 2000 metrin korkeudessa. **Onnistunut viljely:** Siementen viljely talossa on mahdollista ympäri vuoden. Erittäin kovat siemenet tulee karhentaa huolellisesti hiekkapaperilla, liottaa sitten huoneenlämpöisessä vedessä 24 tuntia ja istuttaa sitten 1 cm syvyyteen kosteaan kasvualustaan. 22–25 °C:n lämpötilassa itäminen tapahtuu 3–6 viikon kuluttua. **Paras sijainti:** Banaanikasvit rakastavat valoa aurinkoisiin paikkoihin, jotka ovat hieman suojassa tuulelta. **Optimaalinen hoito:** Jos lumibanaani säilytetään ruukussa, sen tulisi olla melko suuri, koska 3-vuotias kasvi tarvitsee jo 60-70 litran ruukun. Jos banaani istutetaan ulos, kaivaa suuri reikä ja täytä se humusrikkaalla maalla ennen istutusta. Toimita konttikasvilannoitetta 10 päivän välein toukokuusta syyskuun loppuun. Asenteesta ja kasvusta riippuen kasvi voi tuottaa myös syötäväksi kelpaamattomia hedelmiä. **Talvella:** Kasvi selviää ulkona talvella. Tätä tarkoitusta varten kaikki lehdet leikataan myöhään syksyllä. Perennun väärä varsi leikataan 20 cm maanpinnan yläpuolelta suoralla leikkauksella ja kääritään juuttifleeceen tai kookosmattoon. Laita muoviruukku sen päälle ja kasa se multaa. Kasvihuoneessa banaani voi talvehtia 10–12 °C:ssa. Vain lehdet on erotettava toisistaan. Myöhään keväällä lumibanaani itää jälleen jäljellä olevan rungon vieressä. Näiden banaanien talvehtimista maassa suositellaan vain alueilla, joilla on erityisen suotuisa ilmasto, kuten Ticinossa. Kasvi on parasta kaivaa syksyllä ja katkaista lehdet, talvehtia paljas valerunko perusrungolla (älä leikkaa väärää runkoa, koska muuten ei enää pysty uusiutumaan) jäätymätön ja kuiva noin +5°C. Istuta kasvi uudelleen keväällä, sitten se itää uudelleen.



Bananier des neiges

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

Croissance rapide avec des feuilles impréssionnantes jusqu'à deux mètres de long

Le bananier des neiges à croissance rapide n'est pas encore aussi connu que beaucoup d'autres espèces. Il forme un pseudo-tronc fort, cireux, et bleu-vert. Ses longues feuilles peuvent atteindre une longueur de 2 - 2,5 mètres, et le tronc peut atteindre une longueur de 3 - 3,5 mètres. Il grandit tellement rapidement qu'il peut atteindre une hauteur de 1 mètre en seulement quatre mois. Il est le plus dur des Ensete. Dans les pays anglophones, il est appelé Snow Banana (banane de neige). On a d'abord accepté que le bananier de neiges soit aussi dur que le bananier du Japon. L'ensemencement doit venir du Yunnan, il grandit à des altitudes jusqu'à 2 700 mètres là-bas. Il ressemble au bananier d'Abyssine, a un gros tronc bleuâtre et légèrement blanc à l'extérieur, mais il est un peu plus petit et a des grosses feuilles impressionantes. L'aire de distribution du bananier des neiges s'étend du Yunnan, du Tibet, du nord-est de l'Inde, et de la Thaïlande jusqu'à la Nouvelle-Guinée, sa rusticité peut varier considérablement. Il est donc très important de savoir d'où les graines viennent si l'on veut bien les cultiver. Il faut surtout éviter les graines venant du Yunnan (grandes montagnes) ! Elles ne produisent aucun fruit comestible, et n'en produisent quasiment pas chez nous. Les Ensete ne forment pas de bébés-plantes en général. Il y'en a parfois dans des cas très particuliers - si le bourgeon terminal est endommagé. Si le pseudo-tronc est gelé jusqu'au sol, il faut généralement s'attendre à une perte totale de l'arbre. Sinon, les musas des espèces Ensete sont préférables, car les musa ont beaucoup plus de capacités de regénération et forme de nouvelles bébés-plantes après les effets du gel. **Emplacement naturel**: L'habitation du bananier des neiges se trouve au Népal, en Chine, et en Indonésie. Là-bas, il grandit à des altitudes de 800 - 2 000 mètres. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Vous devez rendre les graines rigides rugueuses avec du papier de verre, puis les mettre dans de l'eau à température ambiante pendant 24 heures. Enfin, mettez les graines dans du terreau humide à environ un centimètre de profondeur. A une température de 22°-25° C, la germination a lieu après trois à six semaines. **Le meilleur emplacement:** Les bananiers aiment des emplacements lumineux à ensoleillés et assez protégés du vent. **Soins optimaux:** Si le bananier des neiges est dans un pot, ce dernier doit être grand, car une plante de 3 ans a déjà besoin d'un pot de 60-70 litres. Si le bananier est repiqué, creusez un gros trou et remplissez-le avec de la terre riche en humus avant d'y mettre la plante. Vous devez engraisser la plante tous les 10 jours de mai à fin septembre avec de l'engrais pour plantes en pot. En fonction de l'entretien et de la croissance, la plante peut aussi ne pas pousser de fruits comestibles. **En hiver:** La plante peut survivre l'hiver dehors. Pour ce faire, il faut couper toutes les feuilles en fin d'automne. Le pseudo-tronc de l'abrisseau est coupé 20 centimètres au-dessus de la surface au sol et recouvert par un toison en jute ou une natte de fibres de coco. Recouvrir avec un pot en plastique et butter avec de la terre. Le bananier peut hiverner à 10°-12° C dans la véranda. Seules les feuilles doivent être coupées. En début du printemps, le bananier des neiges repousse à côté du reste du tronc. Il est conseillé de mettre ce bananier seulement dans des endroits à climat favorable pour hiverner dans le sol, comme au Tessin, par exemple. Le mieux est de déterre la plante en automne et de couper les feuilles et d'hiverner le pseudo-tronc dans un endroit sans gel et au sec à environ 5° C avec des rhizomes (ne coupez pas le pseudo-tronc, car il ne sera plus capable de se regénérer sinon). Repiquez la plante en printemps, elle repoussera ensuite.



Μεγάλη μπανάνα χιονιού

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

Γρήγορη ανάπτυξη με εντυπωσιακά φύλλα ύψους έως και δύο μέτρων

Η ταχέως αναπτυσσόμενη μπανάνα χιονιού δεν είναι ακόμη τόσο γνωστή όσο πολλά άλλα είδη. Σχηματίζει ένα ισχυρό, κηρώδες και πράσινο-μπλε ψευδοστέλεχος. Τα μακριά φύλλα του φτάνουν τα 2-2,5 μέτρα και ο κορμός μέχρι τα 3-3,5 μέτρα. Μεγαλώνει τόσο γρήγορα που μπορεί να φτάσει ένα μέτρο ύψος μετά από 4 μήνες. Αυτό είναι το πιο σκληρό ένθετο είδος. Στον αγγλόφωνο κόσμο ονομάζεται Snow Banana. Αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν τόσο σκληρό όσο το Musa Basjoo. Ο σπόρος λέγεται ότι προέρχεται από το Γιουνάν, όπου μεγαλώνει σε υψόμετρο 2700 μέτρων. Μοιάζει με το Ensete Ventricosum, έχει χοντρό γαλαζωπό κορμό, ελαφρώς λευκό εξωτερικά - αλλά παραμένει ελαφρώς μικρότερο και έχει εντυπωσιακά μεγάλα φύλλα. Η περιοχή διανομής εκτείνεται πάνω από το Yunnan, το Θιβέτ, τη βορειοανατολική Ινδία, την Ταϊλάνδη έως τη Νέα Γουινέα, η χειμερινή αντοχή μπορεί να είναι πολύ μεταβλητή. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να γνωρίζετε από πού προέρχονται οι σπόροι εάν θέλετε να τους καλλιεργήσετε με επιτυχία. Σπόροι από την περιοχή Γιουνάν (υψηλά βουνά) πρέπει να προτιμηθούν! Δεν σχηματίζει βρώσιμους καρπούς και είναι απίθανο να παράγουμε και καρπούς. Τα είδη Ensete συνήθως δεν σχηματίζουν παιδιά. Μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις εμφανίζονται αυθόρμητα - όταν το σημείο βλάστησης έχει καταστραφεί. Εάν το ψευδο-στέλεχος παγώσει στο έδαφος, συνήθως αναμένεται συνολική απώλεια ολόκληρου του φυτού. Διαφορετικά, τα Musas είναι προτιμότερα από τα είδη Ensete, αφού τα είδη Musa είναι πολύ πιο ικανά για αναγέννηση και σχηματίζουν νέα παιδιά μετά τις επιπτώσεις του παγετού. Σπόροι από την περιοχή Γιουνάν (υψηλά βουνά) πρέπει να προτιμηθούν! Δεν σχηματίζει βρώσιμους καρπούς και είναι απίθανο να παράγουμε και καρπούς. Τα είδη Ensete συνήθως δεν σχηματίζουν παιδιά. Μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις εμφανίζονται αυθόρμητα - όταν το σημείο βλάστησης έχει καταστραφεί. Εάν το ψευδο-στέλεχος παγώσει στο έδαφος, συνήθως αναμένεται συνολική απώλεια ολόκληρου του φυτού. Διαφορετικά, τα Musas είναι προτιμότερα από τα είδη Ensete, αφού τα είδη Musa είναι πολύ πιο ικανά για αναγέννηση και σχηματίζουν νέα παιδιά μετά τις επιπτώσεις του παγετού. Σπόροι από την περιοχή Γιουνάν (υψηλά βουνά) πρέπει να προτιμηθούν! Δεν σχηματίζει βρώσιμους καρπούς και είναι απίθανο να παράγουμε και καρπούς. Τα είδη Ensete συνήθως δεν σχηματίζουν παιδιά. Μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις εμφανίζονται αυθόρμητα - όταν το σημείο βλάστησης έχει καταστραφεί. Εάν το ψευδο-στέλεχος παγώσει στο έδαφος, συνήθως αναμένεται συνολική απώλεια ολόκληρου του φυτού. Διαφορετικά, τα Musas είναι προτιμότερα από τα είδη Ensete, αφού τα είδη Musa είναι πολύ πιο ικανά για αναγέννηση και σχηματίζουν νέα παιδιά μετά τις επιπτώσεις του παγετού. Σπόροι από την περιοχή Γιουνάν (υψηλά βουνά) πρέπει να προτιμηθούν! Δεν σχηματίζει βρώσιμους καρπούς και είναι απίθανο να παράγουμε και καρπούς. Τα είδη Ensete συνήθως δεν σχηματίζουν παιδιά. Μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις εμφανίζονται αυθόρμητα - όταν το σημείο βλάστησης έχει καταστραφεί. Εάν το ψευδο-στέλεχος παγώσει στο έδαφος, συνήθως αναμένεται συνολική απώλεια ολόκληρου του φυτού. Διαφορετικά, τα Musas είναι προτιμότερα από τα είδη Ensete, αφού τα είδη Musa είναι πολύ πιο ικανά για αναγέννηση και σχηματίζουν νέα παιδιά μετά τις επιπτώσεις του παγετού. Εάν το ψευδο-στέλεχος παγώσει στο έδαφος, συνήθως αναμένεται συνολική απώλεια ολόκληρου του φυτού. Διαφορετικά, τα Musas είναι προτιμότερα από τα είδη Ensete, αφού τα είδη Musa είναι πολύ πιο ικανά για αναγέννηση και σχηματίζουν νέα παιδιά μετά τις επιπτώσεις του παγετού. **Φυσική τοποθεσία**: Το Ensete glaucum είναι εγγενές στο Νεπάλ, την Κίνα και την Ινδονησία. Εκεί φύεται σε υψόμετρα 800 - 2000 μέτρων. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια των σπόρων στο σπίτι είναι δυνατή όλο το χρόνο. Οι πολύ σκληροί σπόροι πρέπει να τραχύνονται προσεκτικά με γυαλόχαρτο, στη συνέχεια να μουλιάζονται σε ζεστό νερό του δωματίου για 24 ώρες και στη συνέχεια να φυτεύονται σε βάθος 1 cm σε υγρό υπόστρωμα ανάπτυξης. Σε θερμοκρασία 22°-25° C η βλάστηση γίνεται μετά από 3-6 εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Τα φυτά μπανάνας αγαπούν το φως έως τις ηλιόλουστες τοποθεσίες που είναι κάπως προστατευμένες από τον άνεμο. **Βέλτιστη φροντίδα:** Εάν η μπανάνα του χιονιού διατηρείται σε γλάστρα, θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη, αφού ένα φυτό 3 ετών χρειάζεται ήδη μια γλάστρα 60-70 λίτρων. Εάν η μπανάνα φυτευτεί έξω, σκάψτε μια μεγάλη τρύπα και γεμίστε την με χώμα πλούσιο σε χούμο πριν τη φύτευση. Προμήθεια λιπάσματος φυτών δοχείων κάθε 10 ημέρες από τον Μάιο έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Ανάλογα με τη στάση και την ανάπτυξη, το φυτό μπορεί να παράγει και μη βρώσιμους καρπούς. **Το χειμώνα:** Το φυτό μπορεί να επιβιώσει έξω το χειμώνα. Για το σκοπό αυτό κόβονται όλα τα φύλλα στα τέλη του φθινοπώρου. Το ψεύτικο στέλεχος του πολυετούς κόβεται 20 cm πάνω από το έδαφος με ίσια κοπή και στη συνέχεια τυλίγεται σε φλις από γιούτα ή σε ψάθα καρύδας. Βάλτε από πάνω μια πλαστική γλάστρα και γεμίστε τη με χώμα. Στο θερμοκήπιο, η μπανάνα μπορεί να ξεχειμωνιάσει στους 10°-12°C. Μόνο τα φύλλα πρέπει να διαχωριστούν. Στα τέλη της άνοιξης, η μπανάνα του χιονιού θα φυτρώσει ξανά δίπλα στον υπόλοιπο κορμό. Το ξεχειμώνιασμα αυτών των μπανανών στο έδαφος συνιστάται μόνο σε περιοχές με ιδιαίτερα ευνοϊκό κλίμα, όπως το Ticino. Είναι καλύτερο να σκάψετε το φυτό το φθινόπωρο και να κόψετε τα φύλλα, να ξεχειμωνιάσετε τον γυμνό ψεύτικο κορμό με υποκείμενο (παρακαλώ μην κόψετε τον ψεύτικο κορμό, αφού διαφορετικά δεν είναι πλέον ικανό για αναγέννηση) χωρίς παγετό και στεγνό στους +5°C περίπου. Φυτέψτε ξανά το φυτό την άνοιξη και μετά θα ξαναβλαστήσει.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Banana sneachta mór

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

Ag fás go tapa le duilleoga go hiontach suas le dhá mhéadar ar airde

Níl an banana sneachta atá ag fás go tapa chomh maith le go leor speiceas eile fós. Cruthaíonn sé pseudostem láidir, waxy agus glas-gorm. Is féidir a duilleoga fada a bhaint amach 2-2.5 méadar agus an trunk suas go dtí 3-3.5 méadar. Fásann sé chomh tapa sin gur féidir é a bheith méadar ar airde tar éis 4 mhí. Is é seo an speiceas enset is deacra. I saol an Bhéarla tugtar an Snow Banana air. Ar dtús measadh go raibh sé chomh dian leis an Musa Basjoo. Deirtear go dtagann an síol ó Yunnan, áit a bhfásann sé suas go dtí airde 2700 méadar. Cosúil le Ensete Ventricosum, tá stoc tiubh bluish aige, beagán bán ar an taobh amuigh - ach fanann sé beagán níos lú agus tá duilleoga an-mhór air. Síneann an limistéar dáileacháin thar Yunnan, an Tibéid, Oirthuaisceart na hIndia, an Téalainn go dtí an Nua-Ghuine, is féidir le hardiness an gheimhridh a bheith an-athraitheach. Tá sé an-tábhachtach, mar sin, go mbeadh a fhios agat cad as a dtagann na síolta más mian leat iad a chothú go rathúil. Is fearr síolta ó réigiún Yunnan (sléibhte arda)! Ní fhoirmíonn sé aon torthaí inite, agus ní dócha go mbeidh muid ag táirgeadh torthaí ach an oiread. De ghnáth ní dhéanann na speicis Ensete leanaí. Is i gcásanna neamhchoitianta amháin a bhíonn siad le feiceáil go spontáineach - nuair a dhéantar damáiste don phointe fásra. Má reonn an pseudo-gas go dtí an talamh, is gnách a bheith ag súil le caillteanas iomlán den phlanda ar fad. Seachas sin, is fearr Musas ná speicis Ensete, ós rud é go bhfuil speicis Musa i bhfad níos cumasaí athghiniúint agus kidels nua a fhoirmiú tar éis éifeachtaí sioc. Is fearr síolta ó réigiún Yunnan (sléibhte arda)! Ní fhoirmíonn sé aon torthaí inite, agus ní dócha go mbeidh muid ag táirgeadh torthaí ach an oiread. De ghnáth ní dhéanann na speicis Ensete leanaí. Is i gcásanna neamhchoitianta amháin a bhíonn siad le feiceáil go spontáineach - nuair a dhéantar damáiste don phointe fásra. Má reonn an pseudo-gas go dtí an talamh, is gnách a bheith ag súil le caillteanas iomlán den phlanda ar fad. Seachas sin, is fearr Musas ná speicis Ensete, ós rud é go bhfuil speicis Musa i bhfad níos cumasaí athghiniúint agus kidels nua a fhoirmiú tar éis éifeachtaí sioc. Is fearr síolta ó réigiún Yunnan (sléibhte arda)! Ní fhoirmíonn sé aon torthaí inite, agus ní dócha go mbeidh muid ag táirgeadh torthaí ach an oiread. De ghnáth ní dhéanann na speicis Ensete leanaí. Is i gcásanna neamhchoitianta amháin a bhíonn siad le feiceáil go spontáineach - nuair a dhéantar damáiste don phointe fásra. Má reonn an pseudo-gas go dtí an talamh, is gnách a bheith ag súil le caillteanas iomlán den phlanda ar fad. Seachas sin, is fearr Musas ná speicis Ensete, ós rud é go bhfuil speicis Musa i bhfad níos cumasaí athghiniúint agus kidels nua a fhoirmiú tar éis éifeachtaí sioc. Má reonn an pseudo-gas go dtí an talamh, is gnách a bheith ag súil le caillteanas iomlán den phlanda ar fad. Seachas sin, is fearr Musas ná speicis Ensete, ós rud é go bhfuil speicis Musa i bhfad níos cumasaí athghiniúint agus kidels nua a fhoirmiú tar éis éifeachtaí sioc. **Suíomh nádúrtha**: Tá Ensete glaucum dúchasach do Neipeal , an tSín agus an Indinéis . Fásann sé ansin ag airde 800 - 2000 méadar. **Saothrú rathúil:** Is féidir saothrú na síolta sa teach ar feadh na bliana. Ba chóir na síolta an-chrua a garbhú go cúramach le páirín, ansin iad a bheith sáithithe in uisce te seomra ar feadh 24 uair an chloig agus ansin iad a chur ar doimhneacht 1 cm i bhfoshraith tais atá ag fás. Ag teocht 22 ° -25 ° C, tarlaíonn péacadh tar éis 3-6 seachtaine. **An suíomh is fearr:** Is breá le plandaí banana solas chuig áiteanna grianmhara a bhfuil foscadh éigin acu ón ngaoth. **Cúram is fearr is féidir:** Má choinnítear an banana sneachta i bpota, ba chóir go mbeadh sé sách mór, ós rud é go dteastaíonn pota 60-70 lítear cheana féin ar phlanda 3 bliana d'aois. Má tá an banana curtha amach, tochailt poll mór agus é a líonadh le hithreach saibhir humus roimh phlandáil. Soláthair leasachán plandaí coimeádán gach 10 lá ó Bhealtaine go deireadh mhí Mheán Fómhair. Ag brath ar an dearcadh agus an fás, is féidir leis an gléasra torthaí neamh-inite a tháirgeadh freisin. **Sa gheimhreadh:** Is féidir leis an gléasra maireachtáil lasmuigh sa gheimhreadh. Chun na críche seo, gearrtar amach na duilleoga go léir go déanach san fhómhar. Gearrtar gas bréagach an ilbhliantúil 20 cm os cionn na talún le gearrtha díreach agus ansin fillte i lomra siúit nó mata cnó cócó. Cuir pota plaisteach thairis air agus carn suas le hithir é. Sa cheaptha teasa, is féidir leis an banana geimhreadh ag 10 ° -12 ° C. Ní mór ach na duilleoga a scaradh. Go déanach san earrach, beidh an banana sneachta sprout arís in aice leis an stoc atá fágtha. Ní mholtar na bananaí seo a gheimhreadh sa talamh ach amháin i gceantair a bhfuil aeráid thar a bheith fabhrach, mar Ticino. Is fearr an planda a thochailt san fhómhar agus na duilleoga a ghearradh amach, an stoc bréagach lom a gheimhreadh le fréamhstoc (ná gearrtha siar an stoc bréagach, le do thoil, ós rud é nach bhfuil sé in ann athghiniúint a thuilleadh) saor ó sioc agus tirim ag thart ar +5 °C. Déan an gléasra arís san earrach, beidh sé sprout arís.



Stór snjó banani

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

Ört vaxandi með glæsilegum laufum allt að tveggja metra háum

Hraðvaxandi snjóbananinn er ekki enn eins þekktur og margar aðrar tegundir. Það myndar sterkan, vaxkenndan og grænbláan gervistofn. Löng blöð hennar geta orðið 2-2,5 metrar og stofninn allt að 3-3,5 metrar. Hann vex svo hratt að hann getur orðið metri á hæð eftir 4 mánuði. Þetta er erfiðasta enseta tegundin. Í enskumælandi heimi er það kallað Snow Banana. Í fyrstu var talið að hann væri jafn erfiður og Musa Basjoo. Sagt er að fræið komi frá Yunnan þar sem það vex upp í 2700 metra hæð. Hann líkist Ensete Ventricosum og hefur þykkan bláleitan stofn, örlítið hvítur að utan - en helst aðeins minni og hefur tilkomumikið stór blöð. Dreifingarsvæðið nær yfir Yunnan, Tíbet, Norðaustur Indland, Tæland til Nýju Gíneu, vetrarþolið getur verið mjög breytilegt. Það er því mjög mikilvægt að vita hvaðan fræin koma ef þú vilt rækta þau með góðum árangri. Fræ frá Yunnan svæðinu (há fjöll) eru tilvalin! Það myndar enga æta ávexti og það er ólíklegt að við framleiðum ávexti heldur. Ensete tegundirnar mynda yfirleitt ekki börn. Aðeins í mjög sjaldgæfum tilfellum birtast þau af sjálfu sér - þegar gróðurpunkturinn er skemmdur. Ef gervistofninn frýs til jarðar má venjulega búast við algjöru tapi á allri plöntunni. Annars eru Musas æskilegri en Ensete tegundir, þar sem Musa tegundir eru mun hæfari til að endurnýjast og mynda nýjar kidels eftir áhrif frostsins. Fræ frá Yunnan svæðinu (há fjöll) eru tilvalin! Það myndar enga æta ávexti og það er ólíklegt að við framleiðum ávexti heldur. Ensete tegundirnar mynda yfirleitt ekki börn. Aðeins í mjög sjaldgæfum tilfellum birtast þau af sjálfu sér - þegar gróðurpunkturinn er skemmdur. Ef gervistofninn frýs til jarðar má venjulega búast við algjöru tapi á allri plöntunni. Annars eru Musas æskilegri en Ensete tegundir, þar sem Musa tegundir eru mun hæfari til að endurnýjast og mynda nýjar kidels eftir áhrif frostsins. Fræ frá Yunnan svæðinu (há fjöll) eru tilvalin! Það myndar enga æta ávexti og það er ólíklegt að við framleiðum ávexti heldur. Ensete tegundirnar mynda yfirleitt ekki börn. Aðeins í mjög sjaldgæfum tilfellum birtast þau af sjálfu sér - þegar gróðurpunkturinn er skemmdur. Ef gervistofninn frýs til jarðar má venjulega búast við algjöru tapi á allri plöntunni. Annars eru Musas æskilegri en Ensete tegundir, þar sem Musa tegundir eru mun hæfari til að endurnýjast og mynda nýjar kidels eftir áhrif frostsins. Ef gervistofninn frýs til jarðar má venjulega búast við algjöru tapi á allri plöntunni. Annars eru Musas æskilegri en Ensete tegundir, þar sem Musa tegundir eru mun hæfari til að endurnýjast og mynda nýjar kidels eftir áhrif frostsins. Ef gervistofninn frýs til jarðar má venjulega búast við algjöru tapi á allri plöntunni. Annars eru Musas æskilegri en Ensete tegundir, þar sem Musa tegundir eru mun hæfari til að endurnýjast og mynda nýjar kidels eftir áhrif frostsins. **Náttúruleg staðsetning**: Ensete glaucum er innfæddur maður í Nepal, Kína og Indónesíu. Þar vex það í 800 - 2000 metra hæð. **Árangursrík ræktun:** Ræktun fræja í húsinu er möguleg allt árið um kring. Mjög hörð fræ á að gróa vandlega með sandpappír, liggja síðan í bleyti í herbergisheitu vatni í 24 klukkustundir og síðan planta 1 cm djúpt í rakt vaxtarlag. Við 22°-25°C hita á sér stað spírun eftir 3-6 vikur. **Besta staðsetningin:** Bananaplöntur elska ljósa til sólríka staði sem eru nokkuð í skjóli fyrir vindi. **Besta umönnun:** Ef snjóbananinn er geymdur í potti ætti hann að vera nokkuð stór, þar sem 3 ára planta þarf þegar 60-70 lítra pott. Ef bananinn er gróðursettur út skaltu grafa stóra holu og fylla hana með humusríkum jarðvegi áður en gróðursett er. Gefðu gámaplöntuáburði á 10 daga fresti frá maí til loka september. Það fer eftir viðhorfi og vexti, plöntan getur einnig framleitt óæta ávexti. **Á veturna:** Plöntan getur lifað úti á veturna. Í þessu skyni eru öll lauf skorin af síðla hausts. Falskur stöngull fjölærunnar er skorinn 20 cm yfir jörðu með beinum skurði og síðan vafinn inn í jútureyði eða kókosmottu. Setjið plastpott yfir það og hrúgið það upp með mold. Í gróðurhúsinu getur bananinn yfirvetur við 10°-12°C. Aðeins þarf að aðskilja blöðin. Seint á vorin mun snjóbananinn spretta aftur við hliðina á stofninum sem eftir er. Aðeins er mælt með því að yfirvetra þessa banana í jörðu á svæðum með sérstaklega hagstæðu loftslagi, eins og Ticino. Best er að grafa plöntuna upp á haustin og klippa af laufblöðin, yfirvetra berum fölsku stofninum með rótarstofni (vinsamlegast ekki skera niður fölsku stofninn, þar sem annars ekki lengur hægt að endurnýjast) frostlaust og þurrt við um +5°C. Gróðursettu plöntuna aftur á vorin, hún mun þá spíra aftur.



Grande banano delle nevi

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

Pianta dalla crescita veloce con foglie incredibilmente grandi che crescono fino a due metri

Il Banano delle nevi a crescita veloce non è ancora cosìconosciuto come lo sono tante altre specie. Esso sviluppa un falso tronco robusto, ceroso e di colore verde-bluastro. Le lunghe foglie possono raggiungere una lunghezza di 2 - 2.5 metri e il tronco 3 - 3.5 metri. Questa pianta cresce così velocemente che già in quattro mesi può crescere di un metro. Questa è la specie di Ensete più resistente. In inglese colloquiale viene chiamata Snow Banana (Banano delle nevi), per il momento si ritiene che sia tanto resistente quanto la Musa Basjoo (Banano giapponese). Il seme deve provenire dalla regione dello Yunnan, dove cresce a un'altitudine di 2700 metri. Il Banano delle nevi assomiglia al Ensete Ventricosum, ha uno spesso tronco bluastro, leggermente bianco all'esterno, ma rimane un po' più piccolo e ha foglie incredibilmente grandi. L'areale si estende fra la regione cinese di Yunnan, il Tibet, il nord-est dell'India, la tailandia fino alla Nuova Guinea e la sua resistenza al freddo può variare molto. Per questo è molto importante sapere da dove viene il seme, per avere una buona riuscita nella coltivazione. Sementi che provengono dalla regione dello Yunnan (dalle grandi montagne) sono assolutamente da preferire! Questa varietà non produce frutti commestibili, ma in quanto alla produzione di frutti sarebbe molto esigua anche nel nostro contesto. Le specie appartenenti al genere Ensete normalmente non producono polloni, solo in casi rari ne nascono spontaneamente (quando il punto di vegetazione è danneggiato). Se il falso tronco si congela fino alla base è da prevedere una perdita di tutta la pianta. Altrimenti, le Musa sono le specie di Ensete da preferire, poiché sono molto più capaci di rigenerarsi e perché producono polloni dopo gli effetti del gelo. **Posizione naturale**: L'areale dell'Ensete glaucum si trova in Nepal, Cina e Indonesia. Là cresce ad altitudini fra gli 800 e i 2000 metri. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Strofinate attentamente i semi molto duri con carta vetrata, poi lasciateli immersi per 24 ore in acqua a temperatura ambiente affinché si gonfino. Collocate i semi a circa un centimetro di profondità nel substrato di coltivo umido. A una temperatura fra i 22° e i 25°C, la germinazione avviene da tre a sei settimane dopo. **La posizione migliore:** Le piante di banane amano gli ambienti da luminosi a soleggiati e al riparo dal vento. **Cura ottimale:** Se coltivate il Banano delle nevi in vaso, questo dovrebbe essere molto grande, poiché una pianta di 3 anni ha già bisogno di un vaso da 60-70 litri. Se il banano viene trapiantato, praticate un grosso foro e riempitelo con terra ricca di humus prima di mettere a dimora la pianta. Nel periodo da maggio a settembre concimatela ogni 10 giorni con fertilizzante per piante da vaso. A seconda del mantenimento e della crescita la pianta potrebbe anche non produrre frutti commestibili. **In inverno:** In inverno la pianta può sopravvivere all'esterno. A questo scopo, già in tardo autunno tagliate tutte le foglie e dividete il falso tronco della pianta con un taglio diritto di 20 cm sopra la superficie della terra, poi avvolgetelo con Juta o con una stuoia in fibra di cocco. Coprite con un vaso di plastica e rincalzate con la terra. In serra il Banano può svernare a una temperatura fra i - 10° e i - 12° C, solo le foglie secche devono essere staccate. In tarda primavera il Banano delle nevi torna a germogliare, vicino al tronco tagliato. E' consigliabile far svernare questo Banano come trapiantato solo in zone dalle condizioni climatiche particolari, come ad esempio a Tessin. L'ideale sarebbe dissotterare la pianta in autunno e tagliare le foglie, poi far svernare il falso tronco spoglio con un portainnesto (non va tagliato il falso tronco, altrimenti non si rigenera) in un ambiente secco e al riparo dal gelo, a circa + 5° C. In primavera la pianta può essere trapiantata di nuovo, in modo da tornare a germogliare.



Velika snježna banana

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

Brzorastuće s impresivnim listovima visokim do dva metra

Brzorastuća snježna banana još nije toliko poznata kao mnoge druge vrste. Formira jaku, voštanu i zeleno-plavu pseudostabljiku. Njegovi dugi listovi mogu doseći 2-2,5 metra, a deblo do 3-3,5 metara. Raste tako brzo da već nakon 4 mjeseca može biti visok metar. Ovo je najteža ensete vrsta. Na engleskom govornom području zove se Snow Banana. U početku se mislilo da je čvrst kao Musa Basjoo. Kaže se da sjeme dolazi iz Yunnana, gdje raste do nadmorske visine od 2700 metara. Nalik Ensete Ventricosum, ima debelo plavkasto deblo, blago bijelo izvana - ali ostaje nešto manje i ima impresivno velike listove. Područje distribucije proteže se preko Yunnana, Tibeta, sjeveroistočne Indije, Tajlanda do Nove Gvineje, otpornost na zimu može biti vrlo različita. Stoga je vrlo važno znati odakle sjeme dolazi ako ga želite uspješno uzgajati. Sjemenke iz regije Yunnan (visoke planine) treba imati prednost! Ne stvara plodove za jelo, a teško da ćemo i roditi. Vrste Ensete obično ne stvaraju djecu. Samo u rijetkim slučajevima javljaju se spontano – oštećenjem vegetacijske točke. Ako pseudostabljika smrzne do tla, obično se očekuje potpuni gubitak cijele biljke. Inače, Muse su poželjnije od Ensete vrsta, budući da su Musa vrste mnogo sposobnije za regeneraciju i stvaranje novih kidela nakon djelovanja mraza. Sjemenke iz regije Yunnan (visoke planine) treba imati prednost! Ne stvara plodove za jelo, a teško da ćemo i roditi. Vrste Ensete obično ne stvaraju djecu. Samo u rijetkim slučajevima javljaju se spontano – oštećenjem vegetacijske točke. Ako pseudostabljika smrzne do tla, obično se očekuje potpuni gubitak cijele biljke. Inače, Muse su poželjnije od Ensete vrsta, budući da su Musa vrste mnogo sposobnije za regeneraciju i stvaranje novih kidela nakon djelovanja mraza. Sjemenke iz regije Yunnan (visoke planine) treba imati prednost! Ne stvara plodove za jelo, a teško da ćemo i roditi. Vrste Ensete obično ne stvaraju djecu. Samo u rijetkim slučajevima javljaju se spontano – oštećenjem vegetacijske točke. Ako pseudostabljika smrzne do tla, obično se očekuje potpuni gubitak cijele biljke. Inače, Muse su poželjnije od Ensete vrsta, budući da su Musa vrste mnogo sposobnije za regeneraciju i stvaranje novih kidela nakon djelovanja mraza. Ako pseudostabljika smrzne do tla, obično se očekuje potpuni gubitak cijele biljke. Inače, Muse su poželjnije od Ensete vrsta, budući da su Musa vrste mnogo sposobnije za regeneraciju i stvaranje novih kidela nakon djelovanja mraza. Ako pseudostabljika smrzne do tla, obično se očekuje potpuni gubitak cijele biljke. Inače, Muse su poželjnije od Ensete vrsta, budući da su Musa vrste mnogo sposobnije za regeneraciju i stvaranje novih kidela nakon djelovanja mraza. **Zemlja porijekla**: Ensete glaucum je porijeklom iz Nepala, Kine i Indonezije. Tamo raste na nadmorskim visinama od 800 - 2000 metara. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj sjemena u kući moguć je tijekom cijele godine. Vrlo tvrdo sjeme potrebno je pažljivo nahrapaviti brusnim papirom, potom potopiti u sobno toplu vodu 24 sata i potom posaditi 1 cm duboko u vlažan supstrat za uzgoj. Na temperaturi od 22°-25°C klijanje se odvija nakon 3-6 tjedana. **Najbolja lokacija:** Biljke banane vole svjetlost do sunčanih mjesta koja su donekle zaštićena od vjetra. **Optimalna njega:** Ako se snježna banana drži u loncu, ona bi trebala biti prilično velika, jer već trogodišnja biljka treba lonac od 60-70 litara. Ako bananu sadite vani, prije sadnje iskopajte veliku rupu i napunite je zemljom bogatom humusom. Dobavljajte gnojivo za biljke u kontejnere svakih 10 dana od svibnja do kraja rujna. Ovisno o stavu i rastu, biljka može dati i nejestive plodove. **U zimi:** Biljka može preživjeti vani zimi. U tu svrhu sve se lišće odreže u kasnu jesen. Lažna stabljika trajnice odreže se ravnim rezom 20 cm iznad tla, a zatim omota jutanim flisom ili kokosovom prostirkom. Preko toga stavite plastičnu posudu i natrpajte je zemljom. U stakleniku banana može preživjeti na 10°-12°C. Samo se listovi moraju odvojiti. U kasno proljeće snježna banana ponovno će niknuti uz preostalo deblo. Prezimljavanje ovih banana u zemlji preporučuje se samo u područjima s posebno povoljnom klimom, kao što je Ticino. Najbolje je biljku iskopati u jesen i odrezati lišće, prezimiti golo lažno deblo s podankom (nemojte rezati lažno deblo, jer inače više nije sposoban za regeneraciju) bez mraza i suh na oko +5°C. Posadite biljku ponovno u proljeće, tada će ponovno niknuti.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Liels sniega banāns

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

Ātri augošs ar iespaidīgām lapām līdz divu metru augstumā

Ātri augošais sniega banāns vēl nav tik labi pazīstams kā daudzas citas sugas. Tas veido spēcīgu, vaskainu un zaļi zilu pseidostēmu. Tās garās lapas var sasniegt 2-2,5 metrus, bet stumbrs - līdz 3-3,5 metriem. Tas aug tik ātri, ka pēc 4 mēnešiem var sasniegt metru augstumu. Šī ir vissmagākā ensete suga. Angļu valodā runājošajā pasaulē to sauc par sniega banānu. Sākumā tika uzskatīts, ka tas ir tikpat izturīgs kā Musa Basjoo. Tiek ziņots, ka sēklas nāk no Junaņas, kur tās izaug līdz 2700 metru augstumam. Tas atgādina Ensete Ventricosum, tam ir biezs zilgans stumbrs, nedaudz balts no ārpuses - bet paliek nedaudz mazāks un ar iespaidīgi lielām lapām. Izplatības apgabals sniedzas pāri Junaņai, Tibetai, Indijas ziemeļaustrumiem, Taizemei līdz Jaungvinejai, ziemcietība var būt ļoti mainīga. Tāpēc ir ļoti svarīgi zināt, no kurienes sēklas nāk, ja vēlaties tās veiksmīgi kultivēt. Priekšroka jādod sēklām no Yunnan reģiona (augstiem kalniem). Tas neveido nekādus ēdamus augļus, un maz ticams, ka mēs arī ražosim augļus. Ensetes sugas parasti neveido bērnus. Tikai retos gadījumos tie parādās spontāni - kad ir bojāts veģetācijas punkts. Ja pseido kāts sasalst līdz zemei, parasti ir sagaidāms visa auga kopējais zudums. Citādi mūsas ir labākas nekā Ensete sugas, jo musu sugas ir daudz spējīgākas atjaunoties un pēc sala ietekmes veido jaunus mazuļus. Priekšroka jādod sēklām no Yunnan reģiona (augstiem kalniem). Tas neveido nekādus ēdamus augļus, un maz ticams, ka mēs arī ražosim augļus. Ensetes sugas parasti neveido bērnus. Tikai retos gadījumos tie parādās spontāni - kad ir bojāts veģetācijas punkts. Ja pseido kāts sasalst līdz zemei, parasti ir sagaidāms visa auga kopējais zudums. Citādi mūsas ir labākas nekā Ensete sugas, jo musu sugas ir daudz spējīgākas atjaunoties un pēc sala ietekmes veido jaunus mazuļus. Priekšroka jādod sēklām no Yunnan reģiona (augstiem kalniem). Tas neveido nekādus ēdamus augļus, un maz ticams, ka mēs arī ražosim augļus. Ensetes sugas parasti neveido bērnus. Tikai retos gadījumos tie parādās spontāni - kad ir bojāts veģetācijas punkts. Ja pseido kāts sasalst līdz zemei, parasti ir sagaidāms visa auga kopējais zudums. Citādi mūsas ir labākas nekā Ensete sugas, jo musu sugas ir daudz spējīgākas atjaunoties un pēc sala ietekmes veido jaunus mazuļus. Ja pseido kāts sasalst līdz zemei, parasti ir sagaidāms visa auga kopējais zudums. Citādi mūsas ir labākas nekā Ensete sugas, jo musu sugas ir daudz spējīgākas atjaunoties un pēc sala ietekmes veido jaunus mazuļus. **Dabiska vieta**: Ensete glaucum dzimtene ir Nepāla, Ķīna un Indonēzija. Tur tas aug 800 - 2000 metru augstumā. **Veiksmīga audzēšana:** Sēklu audzēšana mājā ir iespējama visu gadu. Ļoti cietās sēklas rūpīgi jāraupina ar smilšpapīru, pēc tam 24 stundas iemērc istabas siltā ūdenī un pēc tam jāstāda 1 cm dziļi mitrā augšanas substrātā. 22°-25° C temperatūrā dīgšana notiek pēc 3-6 nedēļām. **Labākā atrašanās vieta:** Banānu augiem patīk gaišas vai saulainas vietas, kas ir nedaudz aizsargātas no vēja. **Optimāla aprūpe:** Ja sniega banānu tur podā, tam jābūt diezgan lielam, jo 3 gadus vecam augam jau nepieciešams 60-70 litru pods. Ja banāns ir iestādīts, pirms stādīšanas izrakiet lielu bedri un piepildiet to ar trūdvielām bagātu augsni. Piegādājiet konteineru mēslojumu ik pēc 10 dienām no maija līdz septembra beigām. Atkarībā no attieksmes un augšanas augs var dot arī neēdamus augļus. **Ziemā:** Augs var izdzīvot ārā ziemā. Šim nolūkam vēlā rudenī nogriež visas lapas. Daudzgadīgo viltus stublāju nogriež 20 cm virs zemes ar taisnu griezumu un pēc tam ietin džutas vilnā vai kokosriekstu paklājiņā. Uzlieciet tam plastmasas podu un sakraujiet to ar augsni. Siltumnīcā banāns var pārziemot 10°-12°C temperatūrā. Jāatdala tikai lapas. Vēlā pavasarī pie atlikušā stumbra atkal uzdīgs sniega banāns. Šo banānu pārziemošana zemē ir ieteicama tikai apgabalos ar īpaši labvēlīgu klimatu, piemēram, Ticīno. Vislabāk augu izrakt rudenī un nogriezt lapas, pārziemot kailo viltus stumbru ar potcelmu (lūdzu negriezt viltus stumbru, jo citādi vairs nav spējīgs atjaunoties) bez sala un sauss ap +5°C. Pavasarī stādiet augu vēlreiz, tad tas atkal sadīgst.



Didelis sniego bananas

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

Greitai augantis įspūdingais lapais iki dviejų metrų aukščio

Sparčiai augantis snieginis bananas dar nėra taip gerai žinomas kaip daugelis kitų rūšių. Jis sudaro stiprų, vaškinį ir žaliai mėlyną pseudostemą. Jo ilgi lapai gali siekti 2–2,5 metro, o kamienas – iki 3–3,5 metro. Jis auga taip greitai, kad po 4 mėnesių gali būti metro aukščio. Tai sunkiausia ensete rūšis. Angliškai kalbančiame pasaulyje jis vadinamas sniego bananu. Iš pradžių buvo manoma, kad jis toks pat kietas kaip Musa Basjoo. Teigiama, kad sėkla kilusi iš Junano, kur užauga iki 2700 metrų aukščio. Panašus į Ensete Ventricosum, jis turi storą melsvą kamieną, šiek tiek baltą išorėje - bet išlieka šiek tiek mažesnis ir turi įspūdingai didelius lapus. Paplitimo sritis apima Junanį, Tibetą, Šiaurės Rytų Indiją, Tailandą iki Naujosios Gvinėjos, žiemos atsparumas gali būti labai įvairus. Todėl labai svarbu žinoti, iš kur atkeliauja sėklos, jei norite jas sėkmingai auginti. Pirmenybė teikiama Yunnan regiono (aukštų kalnų) sėkloms! Valgomų vaisių nesudaro, vargu ar ir mes duosime vaisių. Ensete rūšys paprastai nesudaro vaikų. Tik retais atvejais jie atsiranda spontaniškai – pažeidžiant augmenijos vietą. Jei pseudostiebas sušąla prie žemės, paprastai galima tikėtis visiško viso augalo praradimo. Priešingu atveju musos yra labiau mėgstamos nei Ensete rūšys, nes musų rūšys yra daug pajėgesnės atsinaujinti ir formuoja naujus kidelius po šalčio poveikio. Pirmenybė teikiama Yunnan regiono (aukštų kalnų) sėkloms! Valgomų vaisių nesudaro, vargu ar ir mes duosime vaisių. Ensete rūšys paprastai nesudaro vaikų. Tik retais atvejais jie atsiranda spontaniškai – pažeidžiant augmenijos vietą. Jei pseudostiebas sušąla prie žemės, paprastai galima tikėtis visiško viso augalo praradimo. Priešingu atveju musos yra labiau mėgstamos nei Ensete rūšys, nes musų rūšys yra daug pajėgesnės atsinaujinti ir formuoja naujus kidelius po šalčio poveikio. Pirmenybė teikiama Yunnan regiono (aukštų kalnų) sėkloms! Valgomų vaisių nesudaro, vargu ar ir mes duosime vaisių. Ensete rūšys paprastai nesudaro vaikų. Tik retais atvejais jie atsiranda spontaniškai – pažeidžiant augmenijos vietą. Jei pseudostiebas sušąla prie žemės, paprastai galima tikėtis visiško viso augalo praradimo. Priešingu atveju musos yra labiau mėgstamos nei Ensete rūšys, nes musų rūšys yra daug pajėgesnės atsinaujinti ir formuoja naujus kidelius po šalčio poveikio. Jei pseudostiebas sušąla prie žemės, paprastai galima tikėtis visiško viso augalo praradimo. Priešingu atveju musos yra labiau mėgstamos nei Ensete rūšys, nes musų rūšys yra daug pajėgesnės atsinaujinti ir formuoja naujus kidelius po šalčio poveikio. **Natūrali vieta**: Ensete glaucum yra kilęs iš Nepalo, Kinijos ir Indonezijos. Ten auga 800 - 2000 metrų aukštyje. **Sėkmingas auginimas:** Sėklas auginti namuose galima ištisus metus. Labai kietas sėklas reikia kruopščiai grublėt švitriniu popieriumi, tada 24 valandas mirkyti kambario šiltame vandenyje ir 1 cm gyliu pasodinti į drėgną auginimo substratą. Esant 22°-25° C temperatūrai, sudygsta po 3-6 savaičių. **Geriausia vieta:** Bananų augalai mėgsta šviesias ir saulėtas vietas, kurios yra šiek tiek apsaugotos nuo vėjo. **Optimali priežiūra:** Jei snieginis bananas laikomas vazone, jis turėtų būti gana didelis, nes 3 metų augalui jau reikia 60-70 litrų vazono. Jei bananai pasodinti, prieš sodindami iškaskite didelę duobę ir užpilkite humusinga žeme. Nuo gegužės iki rugsėjo pabaigos kas 10 dienų tiekkite konteinerines augalų trąšas. Priklausomai nuo požiūrio ir augimo, augalas gali duoti ir nevalgomų vaisių. **Žiemą:** Žiemą augalas gali išgyventi lauke. Šiuo tikslu vėlyvą rudenį nupjaunami visi lapai. Netikras daugiamečio stiebas nupjaunamas 20 cm virš žemės tiesiais pjūviu ir apvyniojamas džiuto vilna arba kokoso kilimėliu. Ant jo uždėkite plastikinį puodą ir supilkite žemę. Šiltnamyje bananas gali peržiemoti 10°-12°C temperatūroje. Būtina atskirti tik lapus. Vėlyvą pavasarį sniego bananas vėl išdygs šalia likusio kamieno. Peržiemoti šiuos bananus žemėje rekomenduojama tik ypač palankaus klimato vietovėse, pavyzdžiui, Ticino. Geriausia augalą iškasti rudenį ir nupjauti lapus, peržiemoti pliką netikrą kamieną su poskiepiu (nepjauti netikro kamieno, nes kitaip nebegali atsinaujinti) neužšąla ir sausa apie +5°C. Pasodinkite augalą dar kartą pavasarį, tada jis vėl išdygs.




Banana tas-silġ kbira

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

Li qed jikbru malajr bi weraq impressjonanti sa żewġ metri għoli

Il-banana tas-silġ li qed tikber malajr għadha mhix magħrufa daqs ħafna speċi oħra. Jifforma pseudostem qawwi, xama' u aħdar-blu. Il-weraq twal tiegħu jistgħu jilħqu 2-2.5 metri u t-tronk sa 3-3.5 metri. Tant jikber malajr li jista' jkun għoli metru wara 4 xhur. Din hija l-aktar speċi ensete diffiċli. Fid-dinja li titkellem bl-Ingliż tissejjaħ Snow Banana. Għall-ewwel kien maħsub li kien iebsa daqs il-Musa Basjoo. Iż-żerriegħa jingħad li ġejja minn Yunnan, fejn tikber sa altitudni ta '2700 metru. Tixbah lil Ensete Ventricosum, għandha zokk blu oħxon, kemmxejn abjad fuq barra - iżda jibqa 'ftit iżgħar u għandu weraq impressjonanti kbar. Iż-żona tad-distribuzzjoni testendi fuq Yunnan, it-Tibet, il-Grigal tal-Indja, it-Tajlandja sa New Guinea, ir-reżistenza għax-xitwa tista 'tkun varjabbli ħafna. Għalhekk huwa importanti ħafna li tkun taf minn fejn jiġu ż-żrieragħ jekk trid tikkultivahom b'suċċess. Żrieragħ mir-reġjun ta 'Yunnan (muntanji għoljin) għandhom ikunu preferuti! Ma tifforma l-ebda frott li jittiekel, u huwa improbabbli li aħna se nipproduċu frott lanqas. L-ispeċi Ensete normalment ma jiffurmawx tfal. F'każijiet rari biss jidhru spontanjament - meta l-punt tal-veġetazzjoni jkun bil-ħsara. Jekk il-psewdo-zokk jiffriża mal-art, ġeneralment ikun mistenni telf totali tal-pjanta kollha. Inkella, Musas huma preferibbli għall-ispeċi Ensete, peress li l-ispeċi Musa huma ħafna aktar kapaċi li jirriġeneraw u jiffurmaw kidels ġodda wara l-effetti tal-ġlata. Żrieragħ mir-reġjun ta 'Yunnan (muntanji għoljin) għandhom ikunu preferuti! Ma tifforma l-ebda frott li jittiekel, u huwa improbabbli li aħna se nipproduċu frott lanqas. L-ispeċi Ensete normalment ma jiffurmawx tfal. F'każijiet rari biss jidhru spontanjament - meta l-punt tal-veġetazzjoni jkun bil-ħsara. Jekk il-psewdo-zokk jiffriża mal-art, ġeneralment ikun mistenni telf totali tal-pjanta kollha. Inkella, Musas huma preferibbli għall-ispeċi Ensete, peress li l-ispeċi Musa huma ħafna aktar kapaċi li jirriġeneraw u jiffurmaw kidels ġodda wara l-effetti tal-ġlata. Żrieragħ mir-reġjun ta 'Yunnan (muntanji għoljin) għandhom ikunu preferuti! Ma tifforma l-ebda frott li jittiekel, u huwa improbabbli li aħna se nipproduċu frott lanqas. L-ispeċi Ensete normalment ma jiffurmawx tfal. F'każijiet rari biss jidhru spontanjament - meta l-punt tal-veġetazzjoni jkun bil-ħsara. Jekk il-psewdo-zokk jiffriża mal-art, ġeneralment ikun mistenni telf totali tal-pjanta kollha. Inkella, Musas huma preferibbli għall-ispeċi Ensete, peress li l-ispeċi Musa huma ħafna aktar kapaċi li jirriġeneraw u jiffurmaw kidels ġodda wara l-effetti tal-ġlata. Jekk il-psewdo-zokk jiffriża mal-art, ġeneralment ikun mistenni telf totali tal-pjanta kollha. Inkella, Musas huma preferibbli għall-ispeċi Ensete, peress li l-ispeċi Musa huma ħafna aktar kapaċi li jirriġeneraw u jiffurmaw kidels ġodda wara l-effetti tal-ġlata. **Post naturali**: Ensete glaucum huwa indiġenu fin-Nepal, iċ-Ċina u l-Indoneżja. Hemmhekk tikber f'altitudni ta '800 - 2000 metru. **Kultivazzjoni b'suċċess:** Il-kultivazzjoni taż-żrieragħ fid-dar hija possibbli s-sena kollha. Iż-żrieragħ iebsa ħafna għandhom ikunu mħarrka bir-reqqa b'sandpaper, imbagħad imxarrba f'ilma sħun tal-kamra għal siegħa 24 u mbagħad imħawla 1 ċm fond f'sottostrat niedja li qed tikber. F'temperatura ta '22 ° -25 ° C, il-ġerminazzjoni sseħħ wara ġimgħat 3-6. **L-aħjar post:** Pjanti tal-banana jħobbu postijiet ħfief għal xemxija li huma kemmxejn kenn mir-riħ. **Kura ottimali:** Jekk il-banana tas-silġ tinżamm f'borma, għandha tkun pjuttost kbira, peress li pjanta ta '3 snin diġà teħtieġ borma ta' 60-70 litru. Jekk il-banana titħawwel barra, ħaffer toqba kbira u imla b'ħamrija b'ħafna ħumus qabel tħawwil. Ipprovdi fertilizzant tal-pjanti tal-kontenituri kull 10 ijiem minn Mejju sal-aħħar ta 'Settembru. Skont l-attitudni u t-tkabbir, l-impjant jista 'wkoll jipproduċi frott li ma jittiekelx. **Fix-xitwa:** L-impjant jista 'jgħix barra fix-xitwa. Għal dan il-għan, il-weraq kollha jinqatgħu tard fil-ħarifa. Iż-zokk falz tal-perenni huwa maqtugħ 20 cm 'il fuq mill-art b'qatgħa dritta u mbagħad imgeżwer fi suf tal-ġuta jew tapit tal-ġewż. Poġġi borma tal-plastik fuqha u avvjaha bil-ħamrija. Fis-serra, il-banana tista 'tix-xitwa f'temperatura ta' 10 ° -12 ° C. Il-weraq biss iridu jiġu separati. Fl-aħħar tar-rebbiegħa, il-banana tas-silġ terġa 'tinbet ħdejn it-tronk li fadal. It-tixwit ta' din il-banana fl-art huwa rakkomandat biss f'żoni bi klima partikolarment favorevoli, bħat-Ticino. L-aħjar huwa li tħaffer l-impjant fil-ħarifa u taqta 'l-weraq, ix-xitwa z-zokk falz vojt b'għeruq (jekk jogħġbok ma taqtax it-tronk falz, peress li inkella m'għadux kapaċi ta' riġenerazzjoni) mingħajr ġlata u nixxef f'madwar +5°C. Erġa 'ħawwel l-impjant fir-rebbiegħa, imbagħad jerġa' jinbet.



Grote Sneeuwbanaan

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

Snelgroeiend met indrukwekkende bladeren tot wel twee meter hoog

De snelgroeiende sneeuwbanaan is niet zo bekend als veel andere soorten. Het vormt een sterke, wasachtige en groenblauwe pseudostam. Hun lange bladeren kunnen 2 - 2,5 meter bereiken en de stam tot 3 - 3,5 meter. Hij groeit zo snel dat hij na 4 maanden wel een meter hoog kan worden. Dit is het sterkste type Ensete. In de Engelssprekende wereld wordt het de Sneeuwbanaan genoemd. Aanvankelijk dacht men dat het zo moeilijk was als de Musa Basjoo. De zaden zouden afkomstig zijn uit Yunnan, waar ze opgroeien tot een hoogte van 2700 meter. Hij lijkt op Ensete Ventricosum, heeft een dikke blauwachtige stam, iets wit van buiten, maar blijft iets kleiner en heeft indrukwekkend grote bladeren. Het verspreidingsgebied strekt zich uit van Yunnan, Tibet, Noordoost-India, Thailand tot Nieuw-Guinea, de winterhardheid kan erg wisselend zijn. Het is daarom erg belangrijk om te weten waar de zaden vandaan komen als je ze succesvol wilt kweken. Zaden uit de regio Yunnan (hoge berghoogten) hebben absoluut de voorkeur! Het produceert geen eetbaar fruit, ook hier is het onwaarschijnlijk dat fruitproductie plaatsvindt. De Ensete-soorten vormen meestal geen Kindel. Slechts in zeldzame gevallen komen ze spontaan voor - wanneer het vegetatiepunt is beschadigd. Als de valse stam aan de grond vastvriest, kan meestal een totaal verlies van de hele plant worden verwacht. Anders hebben Musa's de voorkeur boven de Ensete-soorten, omdat Musa-soorten veel beter in staat zijn tot regeneratie en nieuwe nieren vormen na blootstelling aan vorst. Zaden uit de regio Yunnan (hoge berghoogten) hebben zeker de voorkeur! Het produceert geen eetbaar fruit, ook hier is het onwaarschijnlijk dat fruitproductie plaatsvindt. De Ensete-soorten vormen meestal geen Kindel. Slechts in zeldzame gevallen komen ze spontaan voor - wanneer het vegetatiepunt is beschadigd. Als de valse stam aan de grond vastvriest, kan meestal een totaal verlies van de hele plant worden verwacht. Anders hebben Musa's de voorkeur boven Ensete-soorten, omdat Musa-soorten veel beter in staat zijn tot regeneratie en nieuwe nieren vormen na blootstelling aan vorst. Zaden uit de regio Yunnan (hoge berghoogten) hebben zeker de voorkeur! Het produceert geen eetbare vruchten, ook hier is het onwaarschijnlijk dat fruitproductie plaatsvindt. De Ensete-soorten vormen meestal geen Kindel. Slechts in zeldzame gevallen komen ze spontaan voor - wanneer het vegetatiepunt is beschadigd. Als de dummystam aan de grond vastvriest, kan meestal een totaal verlies van de hele plant worden verwacht. Anders hebben Musa's de voorkeur boven de Ensete-soorten, omdat Musa-soorten veel beter in staat zijn tot regeneratie en nieuwe nieren vormen na blootstelling aan vorst. Als de valse stam aan de grond vastvriest, kan meestal een totaal verlies van de hele plant worden verwacht. Anders hebben Musa's de voorkeur boven de Ensete-soorten, omdat Musa-soorten veel beter in staat zijn tot regeneratie en nieuwe nieren vormen na blootstelling aan vorst. Als de valse stam aan de grond vastvriest, kan meestal een totaal verlies van de hele plant worden verwacht. Anders hebben Musa's de voorkeur boven de Ensete-soorten, omdat Musa-soorten veel beter in staat zijn tot regeneratie en nieuwe nieren vormen na blootstelling aan vorst. **Natuurlijke locatie**: De thuisbasis van de Ensete glaucum is in Nepal, China en Indonesië. Daar groeit het op een hoogte van 800 - 2000 meter. **Succesvolle teelt:** De zaden kunnen het hele jaar door binnen worden gekweekt. De zeer harde zaden moeten voorzichtig worden opgeruwd met schuurpapier, vervolgens 24 uur in warm water worden geweekt en vervolgens 1 cm diep in een vochtig groeimedium worden geplaatst. Bij een temperatuur van 22 ° -25 ° C vindt kieming plaats na 3-6 weken. **De beste locatie:** Bananenplanten houden van licht tot zonnige locaties die wat beschut zijn tegen de wind. **Optimale verzorging:** Als de sneeuwbanaan in de emmer wordt bewaard, moet deze behoorlijk groot zijn, aangezien een 3-jarige plant een pot van 60-70 liter nodig heeft. Als de banaan is uitgeplant, graaf dan een groot gat en vul deze met humusrijke grond voordat je de plant op zijn plaats zet. Geef van mei tot eind september om de 10 dagen potplantenmest. Afhankelijk van hoe het wordt gehouden en hoe het wordt gekweekt, kan de plant ook oneetbare vruchten produceren. **In de winter:** De plant kan in de winter buiten overleven. Hiervoor worden alle bladeren in de late herfst afgesneden. De valse stam van de vaste plant wordt met een rechte snede 20 cm boven het aardoppervlak gescheiden en vervolgens bedekt met een jutevlies of een kokosmat. Zet er een plastic pot overheen en voeg aarde toe. De banaan kan in de kas overwinteren bij 10 ° -12 ° C. Alleen de bladeren moeten worden gescheiden. In het late voorjaar ontspruit de sneeuwbanaan naast de overgebleven stam. Het is alleen aan te raden om deze banaan in de volle grond te laten overwinteren in klimatologisch bijzonder gunstige gebieden, zoals Ticino. Het is het beste om de plant in de herfst op te graven en de bladeren af te snijden, de kale valse stam te overwinteren met wortelstok (snijd de valse stam niet weg, anders kan het niet meer geregenereerd worden) vorstvrij en droog bij ca. + 5 ° C. Plant de plant in het voorjaar weer uit, hij zal dan weer uitlopen.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Stor snøbanan

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

Hurtigvoksende med imponerende blader opp til to meter høye

Den raskt voksende snøbananen er ennå ikke like kjent som mange andre arter. Den danner en sterk, voksaktig og grønnblå pseudostamme. De lange bladene kan nå 2-2,5 meter og stammen opp til 3-3,5 meter. Den vokser så fort at den kan bli en meter høy etter 4 måneder. Dette er den vanskeligste ensete-arten. I den engelsktalende verden kalles den Snow Banana. Først ble den antatt å være like tøff som Musa Basjoo. Frøet sies å komme fra Yunnan, hvor det vokser opp til en høyde på 2700 meter. Den ligner Ensete Ventricosum og har en tykk blåaktig stamme, litt hvit på utsiden - men forblir litt mindre og har imponerende store blader. Distribusjonsområdet strekker seg over Yunnan, Tibet, Nordøst-India, Thailand til New Guinea, vinterhardheten kan være svært varierende. Det er derfor svært viktig å vite hvor frøene kommer fra hvis du ønsker å dyrke dem med hell. Frø fra Yunnan-regionen (høye fjell) er å foretrekke! Den danner ingen spiselig frukt, og det er lite sannsynlig at vi produserer frukt heller. Ensete-artene danner vanligvis ikke barn. Bare i sjeldne tilfeller dukker de opp spontant - når vegetasjonspunktet er skadet. Hvis pseudo-stammen fryser til bakken, er det vanligvis å forvente et totalt tap av hele planten. Ellers er Musas å foretrekke fremfor Ensete-arter, siden Musa-arter er mye mer i stand til å regenerere og danner nye kideler etter effekten av frost. Frø fra Yunnan-regionen (høye fjell) er å foretrekke! Den danner ingen spiselig frukt, og det er lite sannsynlig at vi produserer frukt heller. Ensete-artene danner vanligvis ikke barn. Bare i sjeldne tilfeller dukker de opp spontant - når vegetasjonspunktet er skadet. Hvis pseudo-stammen fryser til bakken, er det vanligvis å forvente et totalt tap av hele planten. Ellers er Musas å foretrekke fremfor Ensete-arter, siden Musa-arter er mye mer i stand til å regenerere og danner nye kideler etter effekten av frost. Frø fra Yunnan-regionen (høye fjell) er å foretrekke! Den danner ingen spiselig frukt, og det er lite sannsynlig at vi produserer frukt heller. Ensete-artene danner vanligvis ikke barn. Bare i sjeldne tilfeller dukker de opp spontant - når vegetasjonspunktet er skadet. Hvis pseudo-stammen fryser til bakken, er det vanligvis å forvente et totalt tap av hele planten. Ellers er Musas å foretrekke fremfor Ensete-arter, siden Musa-arter er mye mer i stand til å regenerere og danner nye kideler etter effekten av frost. Hvis pseudo-stammen fryser til bakken, er det vanligvis å forvente et totalt tap av hele planten. Ellers er Musas å foretrekke fremfor Ensete-arter, siden Musa-arter er mye mer i stand til å regenerere og danner nye kideler etter effekten av frost. **Naturlig beliggenhet**: Ensete glaucum er hjemmehørende i Nepal, Kina og Indonesia. Der vokser den i høyder på 800 - 2000 meter. **Vellykket dyrking:** Dyrking av frøene i huset er mulig hele året. De svært harde frøene bør groves forsiktig med sandpapir, deretter bløtlegges i romvarmt vann i 24 timer og så plantes 1 cm dypt i fuktig vekstsubstrat. Ved en temperatur på 22°-25°C skjer spiringen etter 3-6 uker. **Den beste beliggenheten:** Bananplanter elsker lyse til solrike steder som er litt skjermet for vinden. **Optimal omsorg:** Hvis snøbananen oppbevares i en potte, bør den være ganske stor, siden en 3 år gammel plante allerede trenger en 60-70 liters potte. Hvis bananen er plantet ut, graver du et stort hull og fyller det med humusrik jord før du planter. Tilfør beholderplantegjødsel hver 10. dag fra mai til slutten av september. Avhengig av holdning og vekst kan planten også produsere ikke-spiselige frukter. **Om vinteren:** Planten kan overleve ute om vinteren. For dette formålet blir alle blader kuttet av på senhøsten. Staudens falske stilk kuttes 20 cm over bakken med et rett kutt og pakkes deretter inn i jute fleece eller en kokosmatte. Sett en plastpotte over og haug den opp med jord. I drivhuset kan bananen overvintre ved 10°-12°C. Bare bladene må skilles. På slutten av våren vil snøbananen spire igjen ved siden av den gjenværende stammen. Overvintring av disse bananene i bakken anbefales kun i områder med spesielt gunstig klima, som for eksempel Ticino. Det er best å grave opp planten om høsten og klippe av bladene, overvintre den nakne falske stammen med grunnstamme (vennligst ikke kutte ned den falske stammen, siden ellers ikke lenger kan regenereres) frostfri og tørr ved rundt +5°C. Plant planten igjen om våren, den vil da spire igjen.



Duży Banan Śnieżny

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

Szybko rośnie o okazałych liściach do dwóch metrów wysokości

Szybko rosnący banan śnieżny to najsilniejszy okaz z rodziny Ensente, ale zdecydowanie nie tak sławny jak inne gatunki. Wyrasta na mocną, woskowatą, zielono-niebieską pseudo-łodygę, która może osiągać wysokość od 3 m do 3,50 m, podczas gdy długie liście rośliny mogą mieć od 2 m do 2,50 m wysokości. Rośnie tak szybko, jak osiąga metr wysokości w ciągu zaledwie czterech miesięcy. W obszarach anglojęzycznych Ensente glaucum nazywa się Snow Banana i początkowo uważano, że jest tak silny jak Musa Basjoo. Nasiona pochodzą najprawdopodobniej z Yunnan, gdzie rośnie na wysokości do 2700 metrów nad poziomem morza. Śnieżny banan przypomina Ensente ventricosum, z grubą niebieskawą łodygą, lekko białą na powierzchni - ale rośnie trochę mniej i rozwija imponujące duże liście. Jego obszar rozproszenia rozciąga się od Yunnan, Tybet i północno-wschodnie Indie do Tajlandii i Nowej Gwinei, podczas gdy jego zimotrwalosc jest dość zmienna. Dlatego konieczne jest, aby wiedzieć, skąd pochodzą nasiona do uprawy. nasiona z wysokogórskich obszarów Yunnan to zdecydowanie najlepszy wybór! Snow Banana nie wytwarza żadnych jadalnych owoców i prawdopodobnie nie zobaczysz żadnych owoców. Gatunek Ensente również zazwyczaj nie tworzy warstw - tylko w rzadkich przypadkach dzieje się to samoistnie. Jeśli pseudo-łodyga zamarznie do samej ziemi, roślina z pewnością umrze. Jednak roślina Musa jest zawsze lepsza od gatunku Ensente, ponieważ jest bardziej prawdopodobne, że zregeneruje się po mrozie i wytworzy nowe warstwy. pryz uprawie ważne jest, aby wiedzieć, skąd pochodzą nasiona. nasiona z wysokogórskich obszarów Yunnan to zdecydowanie najlepszy wybór! Snow Banana nie wytwarza żadnych jadalnych owoców i prawdopodobnie nie zobaczysz żadnych owoców. Gatunek Ensente również zazwyczaj nie tworzy warstw - tylko w rzadkich przypadkach dzieje się to samoistnie. Jeśli pseudo-łodyga zamarznie do samej ziemi, roślina z pewnością umrze. Jednak roślina Musa jest zawsze lepsza od gatunku Ensente, ponieważ jest bardziej prawdopodobne, że zregeneruje się po mrozie i wytworzy nowe warstwy. pryz uprawie ważne jest, aby wiedzieć, skąd pochodzą nasiona. nasiona z wysokogórskich obszarów Yunnan to zdecydowanie najlepszy wybór! Snow Banana nie wytwarza żadnych jadalnych owoców i prawdopodobnie nie zobaczysz żadnych owoców. Gatunek Ensente również zwykle nie tworzy warstw - tylko w rzadkich przypadkach dzieje się to spontanicznie. Jeśli pseudo-łodyga zamarznie do samej ziemi, roślina z pewnością umrze. Jednak roślina Musa jest zawsze lepsza od gatunku Ensente, ponieważ jest bardziej prawdopodobne, że zregeneruje się po mrozie i wytworzy nowe warstwy. Gatunek Ensente również zazwyczaj nie tworzy warstw - tylko w rzadkich przypadkach dzieje się to samoistnie. Jeśli pseudo-łodyga zamarznie do samej ziemi, roślina z pewnością umrze. Jednak roślina Musa jest zawsze lepsza od gatunku Ensente, ponieważ jest bardziej prawdopodobne, że zregeneruje się po mrozie i wytworzy nowe warstwy. Gatunek Ensente również zazwyczaj nie tworzy warstw - tylko w rzadkich przypadkach dzieje się to samoistnie. Jeśli pseudo-łodyga zamarznie do samej ziemi, roślina z pewnością umrze. Jednak roślina Musa jest zawsze lepsza od gatunku Ensente, ponieważ jest bardziej prawdopodobne, że zregeneruje się po mrozie i wytworzy nowe warstwy. **Naturalne położenie**: Naturalne siedlisko Banana Śnieżnego znajduje się w Nepalu, Chinach i Indonezji. Tam rośnie na wysokości od 800 do 2000 metrów nad poziomem morza. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, należy lekko zmatowić twarde nasiona kawałkiem papieru ściernego i umieścić je w ciepłej wodzie na około 24 godziny w celu zagruntowania. Następnie posadź nasiona na głębokość około 1 cm w wilgotnym kompoście doniczkowym. W temperaturze od 22 ° do 25 ° Celsjusza kiełkowanie zajmie od trzech do sześciu tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Rośliny bananowe preferują miejsca jasne i nasłonecznione, najlepiej chronione przed wiatrem. **Optymalna pielęgnacja:** Rośliny doniczkowe muszą być od razu trzymane w dość dużej donicy, ponieważ już w wieku trzech lat będzie potrzebować dużej wanny o pojemności 60 do 70 litrów. W przypadku roślin zewnętrznych musisz wypełnić ogromną dziurę ziemią bogatą w próchnicę, zanim zasadzisz banan śnieżny. Od maja do końca września można co 10 dni podawać nawóz dla roślin doniczkowych. W zależności od sposobu uprawy, Snow Banana może nawet rodzić owoce, ale nie nadają się one do jedzenia. **W zimę:** Śnieżny banan może hibernować na zewnątrz. W tym celu możesz ściąć wszystkie liście późną jesienią. Pseudo-łodygę należy przyciąć prosto na wysokości 20 cm nad ziemią i przykryć włókniną jutową lub matą kokosową. Następnie kładziesz na nim plastikowy garnek i uziemiasz ziemię. W szklarni Snow Banana może hibernować w temperaturze od 10 ° do 12 ° Celsjusza - wystarczy ściąć liście. Późną wiosną roślina ponownie wykiełkuje obok pozostawionej łodygi. Pozwolenie na hibernację bananów śnieżnych na zewnątrz jest wskazane tylko w obszarach o szczególnym klimacie, na przykład w regionie Tessin. Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem na przeżycie rośliny przez zimę jest wykopanie jej, odcięcie liści i po prostu trzymanie nagiej pseudo-łodygi z jej ukorzenianiem w suchym i wolnym od mrozu miejscu o temperaturze około 5 ° Celsjusza. Nie przecinaj łodygi, ponieważ w przeciwnym razie roślina nie zregeneruje się. Wiosną banan śnieżny można zasadzić i ponownie wykiełkować.



Banana da neve grande

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

Crescimento rápido com folhas impressionantes de até dois metros de altura

A banana da neve de crescimento rápido ainda não é tão conhecida quanto muitas outras espécies. Forma um pseudocaule forte, ceroso e verde-azulado. Suas longas folhas podem atingir 2-2,5 metros e o tronco até 3-3,5 metros. Cresce tão rápido que pode atingir um metro de altura após 4 meses. Esta é a espécie de ensete mais difícil. No mundo de língua inglesa, é chamado de Snow Banana. A princípio, foi considerado tão resistente quanto o Musa Basjoo. Diz-se que a semente vem de Yunnan, onde cresce até uma altitude de 2.700 metros. Assemelhando-se ao Ensete Ventricosum, possui um tronco espesso e azulado, levemente branco por fora - mas permanece um pouco menor e possui folhas impressionantemente grandes. A área de distribuição se estende por Yunnan, Tibete, Nordeste da Índia, Tailândia até Nova Guiné, a resistência do inverno pode ser muito variável. Portanto, é muito importante saber de onde vêm as sementes se você deseja cultivá-las com sucesso. As sementes da região de Yunnan (altas montanhas) são as preferidas! Não forma frutos comestíveis e é improvável que produzamos frutos também. A espécie Ensete não costuma formar filhos. Apenas em casos raros eles aparecem espontaneamente - quando o ponto de vegetação é danificado. Se o pseudocaule congelar no solo, geralmente é esperada uma perda total de toda a planta. Caso contrário, as Musas são preferíveis às espécies de Ensete, uma vez que as espécies de Musa são muito mais capazes de se regenerar e formar novos cabritos após os efeitos da geada. As sementes da região de Yunnan (altas montanhas) são as preferidas! Não forma frutos comestíveis e é improvável que produzamos frutos também. A espécie Ensete não costuma formar filhos. Apenas em casos raros eles aparecem espontaneamente - quando o ponto de vegetação é danificado. Se o pseudocaule congelar no solo, geralmente é esperada uma perda total de toda a planta. Caso contrário, as Musas são preferíveis às espécies de Ensete, uma vez que as espécies de Musa são muito mais capazes de se regenerar e formar novos cabritos após os efeitos da geada. As sementes da região de Yunnan (altas montanhas) são as preferidas! Não forma frutos comestíveis e é improvável que produzamos frutos também. A espécie Ensete não costuma formar filhos. Apenas em casos raros eles aparecem espontaneamente - quando o ponto de vegetação é danificado. Se o pseudocaule congelar no solo, geralmente é esperada uma perda total de toda a planta. Caso contrário, as Musas são preferíveis às espécies de Ensete, uma vez que as espécies de Musa são muito mais capazes de se regenerar e formar novos cabritos após os efeitos da geada. Se o pseudocaule congelar no solo, geralmente é esperada uma perda total de toda a planta. Caso contrário, as Musas são preferíveis às espécies de Ensete, uma vez que as espécies de Musa são muito mais capazes de se regenerar e formar novos cabritos após os efeitos da geada. **Localização natural**: Ensete glaucum é nativa do Nepal, China e Indonésia. Lá cresce em altitudes de 800 a 2.000 metros. **Cultivo bem sucedido:** O cultivo das sementes em casa é possível durante todo o ano. As sementes muito duras devem ser cuidadosamente lixadas com lixa, depois embebidas em água morna por 24 horas e depois plantadas a 1 cm de profundidade em substrato de crescimento úmido. A uma temperatura de 22°-25° C, a germinação ocorre após 3-6 semanas. **A melhor localização:** As bananeiras adoram a luz em locais ensolarados que são um pouco protegidos do vento. **Cuidado ideal:** Se a banana da neve for guardada em vaso, ela deve ser bem grande, pois uma planta de 3 anos já precisa de um vaso de 60-70 litros. Se a banana for plantada, cave um buraco grande e encha-o com terra rica em húmus antes de plantar. Forneça fertilizante para plantas em contêineres a cada 10 dias, de maio até o final de setembro. Dependendo da atitude e do crescimento, a planta também pode produzir frutos não comestíveis. **No inverno:** A planta pode sobreviver fora no inverno. Para isso, todas as folhas são cortadas no final do outono. O caule falso da perene é cortado 20 cm acima do solo com um corte reto e depois envolto em lã de juta ou esteira de coco. Coloque um pote de plástico sobre ele e empilhe-o com terra. Na estufa, a banana pode hibernar a 10°-12°C. Apenas as folhas devem ser separadas. No final da primavera, a banana da neve brotará novamente ao lado do tronco restante. O inverno dessas bananas no solo é recomendado apenas em áreas com clima particularmente favorável, como o Ticino. É melhor desenterrar a planta no outono e cortar as folhas, hibernar o tronco falso nu com porta-enxerto (por favor, não corte o tronco falso, caso contrário, não é mais capaz de se regenerar) sem gelo e seco em torno de +5°C. Plante a planta novamente na primavera, ela brotará novamente.



Banana De Zăpadă

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

Creștere rapidă cu frunze impresionante de până la doi metri înălțime

Banana de zăpadă cu creștere rapidă nu este la fel de cunoscută ca multe alte specii. Formează o pseudo-tulpină puternică, cerată și verde-albastră. Frunzele lor lungi pot ajunge la 2 - 2,5 metri, iar trunchiul până la 3 - 3,5 metri. Crește atât de repede încât poate ajunge la o înălțime de un metru după 4 luni. Acesta este cel mai dur tip de Ensete. În lumea de limbă engleză, se numește Banana de zăpadă. La început s-a crezut că este la fel de dur ca Musa Basjoo. Se spune că semințele provin din Yunnan, unde cresc până la înălțimi de 2.700 de metri. Seamănă cu Ensete Ventricosum, are un trunchi albastru gros, ușor alb la exterior - dar rămâne puțin mai mic și are frunze mari impresionante. Zona de distribuție se întinde de la Yunnan, Tibet, nord-estul Indiei, Thailanda până la Noua Guinee, rezistența la iarnă poate fi foarte variabilă. Prin urmare, este foarte important să știți de unde provin semințele dacă doriți să le cultivați cu succes. Semințele din regiunea Yunnan (înălțimi înalte de munte) sunt cu siguranță de preferat! Nu produce fructe comestibile și cu greu vom produce niciodată fructe. De obicei, speciile Ensete nu formează Kindel. Numai în cazuri rare apar spontan - când punctul de vegetație este deteriorat. Dacă trunchiul manechin îngheață la pământ, de obicei se poate aștepta la o pierdere totală a întregii plante. În caz contrar, muzele sunt de preferat speciilor Ensete, deoarece speciile de musa sunt mult mai capabile de regenerare și formează un rinichi nou după expunerea la îngheț. Semințele din regiunea Yunnan (înălțimi înalte de munte) sunt cu siguranță preferate! Nu produce fructe comestibile și cu greu vom produce niciodată fructe. De obicei, speciile Ensete nu formează Kindel. Numai în cazuri rare apar spontan - când punctul de vegetație este deteriorat. Dacă trunchiul fals îngheață la pământ, de obicei se poate aștepta la o pierdere totală a întregii plante. În caz contrar, muzele sunt de preferat speciilor Ensete, deoarece speciile de musa sunt mult mai capabile de regenerare și formează un rinichi nou după expunerea la îngheț. Semințele din regiunea Yunnan (înălțimi înalte de munte) sunt cu siguranță preferate! Nu produce fructe comestibile, este puțin probabil să se producă și fructe aici. De obicei, speciile Ensete nu formează Kindel. Numai în cazuri rare apar spontan - când punctul de vegetație este deteriorat. Dacă trunchiul manechin îngheață la pământ, de obicei se poate aștepta la o pierdere totală a întregii plante. În caz contrar, muzele sunt de preferat speciilor Ensete, deoarece speciile de musa sunt mult mai capabile de regenerare și formează un rinichi nou după expunerea la îngheț. Dacă trunchiul manechin îngheață la pământ, de obicei se poate aștepta la o pierdere totală a întregii plante. În caz contrar, muzele sunt de preferat speciilor Ensete, deoarece speciile de musa sunt mult mai capabile de regenerare și formează un rinichi nou după expunerea la îngheț. Dacă trunchiul manechin îngheață la pământ, de obicei se poate aștepta la o pierdere totală a întregii plante. În caz contrar, muzele sunt preferabile speciilor Ensete, deoarece speciile Musa sunt mult mai capabile de regenerare și formează un rinichi nou după expunerea la îngheț. **Locație naturală**: Locuința glaculului Ensete se află în Nepal, China și Indonezia. Acolo crește la altitudini de 800 - 2000 de metri. **Cultivare de succes:** Semințele pot fi cultivate în interior tot timpul anului. Semințele foarte dure trebuie asprite cu atenție cu șmirghel, apoi pre-înmuiate în apă la temperatura camerei timp de 24 de ore și apoi așezate la 1 cm adâncime în substratul umed de creștere. La o temperatură de 22 ° -25 ° C, germinarea are loc după 3 -6 săptămâni. **Cea mai bună locație:** Plantele de bananier adoră locațiile luminoase până la soare, care sunt oarecum la adăpost de vânt. **Îngrijire optimă:** Dacă banana de zăpadă este păstrată în găleată, ar trebui să fie destul de mare, deoarece o plantă de 3 ani are nevoie de o oală de 60-70 litri. Dacă banana este plantată, săpați o gaură mare și umpleți-o cu sol bogat în humus înainte de a pune planta în loc. Din mai până la sfârșitul lunii septembrie, furnizați îngrășământ pentru plante în ghiveci la fiecare 10 zile. În funcție de modul în care este păstrată și de modul în care este cultivată, planta poate produce și fructe necomestibile. **În iarnă:** Planta poate supraviețui afară iarna. Pentru a face acest lucru, toate frunzele sunt tăiate la sfârșitul toamnei. Trunchiul fals al perenei este tăiat cu o tăietură dreaptă la 20 cm deasupra suprafeței pământului și apoi acoperit cu o lână de iută sau cu un covor de cocos. Puneți o oală de plastic peste ea și adăugați sol. Banana poate ierni la seră la 10 ° -12 ° C. Doar frunzele trebuie separate. La sfârșitul primăverii, banana de zăpadă răsare lângă trunchiul rămas. Hibernarea acestei banane în sol este recomandată numai în zone favorabile din punct de vedere climatic, cum ar fi Ticino. Cel mai bine este să dezgropați planta toamna și să tăiați frunzele, să iernati trunchiul fals gol cu rizom (vă rugăm să nu tăiați trunchiul fals, altfel nu mai poate fi regenerat) fără îngheț și uscat la aproximativ + 5 ° C. În primăvară, plantați planta din nou, apoi va răsări din nou.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Stor Snöbanan

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

Snabbväxande med imponerande blad upp till två meter höga

Den snabbt växande snöbananen är inte lika känd som många andra arter. Det bildar en stark, vaxartad och grönblå pseudostam. Deras långa löv kan nå 2 - 2,5 meter och stammen upp till 3 - 3,5 meter. Den växer så snabbt att den når en meters höjd efter fyra månader. Detta är den tuffaste typen av Ensete. I den engelsktalande världen kallas den Snow Banana. Först ansågs det vara lika hårt som Musa Basjoo. Fröna sägs komma från Yunnan, där de växer upp till höjder på 2700 meter. Den liknar Ensete Ventricosum, har en tjock blåaktig bagageutrymme, lite vit på utsidan - men förblir lite mindre och har imponerande stora löv. Distributionsområdet sträcker sig från Yunnan, Tibet, nordöstra Indien, Thailand till Nya Guinea, vinterhårdheten kan vara mycket varierande. Det är därför mycket viktigt att veta var fröna kommer ifrån om du vill odla dem framgångsrikt. Frön från Yunnan-regionen (höga bergshöjder) är definitivt att föredra! Den producerar inte någon ätbar frukt, och vi kommer knappast någonsin att producera frukt. Ensete-arten bildar vanligtvis inte Kindel. Endast i sällsynta fall uppträder de spontant - när vegetationspunkten skadas. Om dummystammen fryser till marken kan en total förlust av hela växten vanligtvis förväntas. Annars är Musas att föredra framför Ensete-arten, eftersom Musa-arter är mycket mer kapabla till regenerering och bildar ny kidel efter exponering för frost. Frön från Yunnan-regionen (höga bergshöjder) är definitivt att föredra! Det producerar inga ätbara frukter, fruktproduktion är sannolikt inte heller här. Ensete-arten bildar vanligtvis inte Kindel. Endast i sällsynta fall uppträder de spontant - när vegetationspunkten skadas. Om dummystammen fryser till marken, kan en total förlust av hela växten vanligtvis förväntas. Annars är Musas att föredra framför Ensete-arten, eftersom Musa-arter är mycket mer kapabla till regenerering och bildar ny kidel efter exponering för frost. Frön från Yunnan-regionen (höga bergshöjder) är definitivt att föredra! Det producerar inga ätbara frukter, fruktproduktion är sannolikt inte heller här. Ensete-arten bildar vanligtvis inte Kindel. Endast i sällsynta fall uppträder de spontant - när vegetationspunkten skadas. Om dummystammen fryser till marken kan en total förlust av hela växten vanligtvis förväntas. Annars är Musas att föredra framför Ensete-arter, eftersom Musa-arter är mycket mer kapabla till regenerering och bildar ny kidel efter exponering för frost. Om dummystammen fryser till marken, kan en total förlust av hela växten vanligtvis förväntas. Annars är Musas att föredra framför Ensete-arten, eftersom Musa-arter är mycket mer kapabla till regenerering och bildar ny kidel efter exponering för frost. Om den falska stammen fryser till marken kan en total förlust av hela växten vanligtvis förväntas. Annars är Musas att föredra framför Ensete-arten, eftersom Musa-arter är mycket mer kapabla till regenerering och bildar ny kidel efter exponering för frost. **Naturligt läge**: Ensete glaucums hem är i Nepal, Kina och Indonesien. Där växer den på 800-2000 meters höjd. **Framgångsrik odling:** Fröna kan odlas inomhus året runt. De mycket hårda frön bör grova upp med sandpapper, sedan blötläggas i varmt vatten i 24 timmar och placeras sedan 1 cm djupt i ett fuktigt odlingsmedium. Vid en temperatur av 22 ° -25 ° C sker groddning efter 3-6 veckor. **Den bästa platsen:** Bananplanter älskar ljusa till soliga platser som är något skyddade från vinden. **Optimal vård:** Om snöbananen hålls i skopan bör den vara ganska stor, eftersom en 3-årig växt behöver en 60-70 liters kruka. Om bananen planteras, gräva ett stort hål och fyll den med humusrik jord innan du placerar växten på plats. Från maj till slutet av september, ge gödselmedel i krukväxt var 10: e dag. Beroende på hur den hålls och hur den odlas kan växten också producera oätliga frukter. **På vintern:** Växten kan överleva ute på vintern. För detta klipps alla blad av på senhösten. Den fleråriga falska stammen separeras med ett rakt snitt 20 cm ovanför jordytan och täcks sedan med en jute-fleece eller en kokosmatta. Lägg en plastkruka över den och lägg till jord. Bananen kan övervintra i växthuset vid 10 ° -12 ° C. Endast bladen måste separeras. På våren spirar snöbananen bredvid den återstående bagageutrymmet. Viloläge av denna banan i marken rekommenderas endast i klimatligt särskilt gynnsamma områden, såsom Ticino. Det är bäst att gräva upp växten på hösten och klippa av bladen, övervintra den nakna falska stammen med rhizom (snälla skär inte den falska stammen, annars kan den inte längre regenereras) frostfri och torr vid ca + 5 ° C. På våren, plantera växten ut igen, den kommer sedan att gro igen.



Veľký snehový banán

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

Rýchlo rastúce s pôsobivými listami vysokými až dva metre

Rýchlo rastúci snežný banán ešte nie je taký známy ako mnohé iné druhy. Tvorí silný, voskový a zelenomodrý pseudokmeň. Jeho dlhé listy môžu dosiahnuť 2-2,5 metra a kmeň až 3-3,5 metra. Rastie tak rýchlo, že už po 4 mesiacoch môže byť meter vysoký. Toto je najtvrdší druh ensete. V anglicky hovoriacom svete sa nazýva Snow Banana. Spočiatku sa myslelo, že je taký tvrdý ako Musa Basjoo. Semeno údajne pochádza z Yunnanu, kde rastie až do nadmorskej výšky 2700 metrov. Podobá sa Ensete Ventricosum, má hustý modrastý kmeň, zvonku mierne biely - zostáva však o niečo menší a má pôsobivo veľké listy. Oblasť distribúcie siaha cez Yunnan, Tibet, severovýchodnú Indiu, Thajsko až po Novú Guineu, zimná odolnosť môže byť veľmi variabilná. Je preto veľmi dôležité vedieť, odkiaľ semená pochádzajú, ak ich chcete úspešne pestovať. Uprednostňujte semená z oblasti Yunnan (vysoké hory)! Netvorí žiadne jedlé plody a je nepravdepodobné, že budeme plodiť aj my. Druh Ensete zvyčajne netvorí deti. Len v ojedinelých prípadoch sa objavia spontánne – pri poškodení vegetačného bodu. Ak pseudostonka primrzne k zemi, zvyčajne sa dá očakávať totálna strata celej rastliny. V opačnom prípade sú Musy vhodnejšie ako druhy Ensete, pretože druhy Musa sú oveľa schopnejšie regenerácie a tvoria nové kidely po účinkoch mrazu. Uprednostňujte semená z oblasti Yunnan (vysoké hory)! Netvorí žiadne jedlé plody a je nepravdepodobné, že budeme plodiť aj my. Druh Ensete zvyčajne netvorí deti. Len v ojedinelých prípadoch sa objavia spontánne – pri poškodení vegetačného bodu. Ak pseudostonka primrzne k zemi, zvyčajne sa dá očakávať totálna strata celej rastliny. V opačnom prípade sú Musy vhodnejšie ako druhy Ensete, pretože druhy Musa sú oveľa schopnejšie regenerácie a tvoria nové kidely po účinkoch mrazu. Uprednostňujte semená z oblasti Yunnan (vysoké hory)! Netvorí žiadne jedlé plody a je nepravdepodobné, že budeme plodiť aj my. Druh Ensete zvyčajne netvorí deti. Len v ojedinelých prípadoch sa objavia spontánne – pri poškodení vegetačného bodu. Ak pseudostonka primrzne k zemi, zvyčajne sa dá očakávať totálna strata celej rastliny. V opačnom prípade sú Musy vhodnejšie ako druhy Ensete, pretože druhy Musa sú oveľa schopnejšie regenerácie a tvoria nové kidely po účinkoch mrazu. Ak pseudostonka primrzne k zemi, zvyčajne sa dá očakávať totálna strata celej rastliny. V opačnom prípade sú Musy vhodnejšie ako druhy Ensete, pretože druhy Musa sú oveľa schopnejšie regenerácie a tvoria nové kidely po účinkoch mrazu. **Prirodzená poloha**: Ensete glaucum pochádza z Nepálu, Číny a Indonézie. Tam rastie v nadmorských výškach 800 - 2000 metrov. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie semien v dome je možné po celý rok. Veľmi tvrdé semená treba opatrne zdrsniť brúsnym papierom, potom ich na 24 hodín namočiť do izbovej vody a potom zasadiť 1 cm hlboko do vlhkého pestovateľského substrátu. Pri teplote 22°-25° C kličenie prebieha po 3-6 týždňoch. **Najlepšie umiestnenie:** Banánovníky milujú svetlo až slnečné miesta, ktoré sú trochu chránené pred vetrom. **Optimálna starostlivosť:** Ak sa snehový banán chová v kvetináči, mal by byť dosť veľký, pretože 3-ročná rastlina už potrebuje 60-70 litrový kvetináč. Ak je banán vysadený, pred výsadbou vykopte veľkú jamu a naplňte ju pôdou bohatou na humus. Hnojivo pre kontajnerové rastliny dodávajte každých 10 dní od mája do konca septembra. V závislosti od postoja a rastu môže rastlina produkovať aj nejedlé plody. **V zime:** Rastlina môže v zime prežiť vonku. Na tento účel sa koncom jesene odrežú všetky listy. Nepravá stonka tvrdo sa odreže 20 cm nad zemou rovným rezom a následne sa obalí jutovým rúnom alebo kokosovou rohožou. Položte naň plastový hrniec a nakopte ho zeminou. V skleníku môže banán prezimovať pri teplote 10°-12°C. Je potrebné oddeliť iba listy. Koncom jari snehový banán opäť vyraší vedľa zvyšného kmeňa. Prezimovanie týchto banánov v zemi sa odporúča iba v oblastiach s obzvlášť priaznivou klímou, ako je Ticino. Rastlinu je najlepšie vykopať na jeseň a odrezať listy, holý nepravý kmeň prezimovať podpníkom (falošný kmeň, prosím, neodrezávať, pretože inak už nie sú schopné regenerácie) nemrznúce a suché pri teplote okolo +5°C. Rastlinu opäť zasaďte na jar, potom opäť vyraší.



Velika snežna banana

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

Hitro rastoča z impresivnimi listi, visokimi do dva metra

Hitro rastoča snežna banana še ni tako poznana kot mnoge druge vrste. Tvori močno, voskasto in zelenomodro psevdosteblo. Njegovi dolgi listi lahko dosežejo 2-2,5 metra, deblo pa do 3-3,5 metra. Raste tako hitro, da je že po 4 mesecih visok meter. To je najtežja vrsta ensete. V angleško govorečem svetu jo imenujejo Snow Banana. Sprva so mislili, da je tako trd kot Musa Basjoo. Seme naj bi prihajalo iz Yunnana, kjer raste do nadmorske višine 2700 metrov. Podobno Ensete Ventricosum, ima debelo modrikasto deblo, rahlo belo na zunanji strani - vendar ostaja nekoliko manjše in ima osupljivo velike liste. Območje distribucije sega čez Yunnan, Tibet, severovzhodno Indijo, Tajsko do Nove Gvineje, zimska odpornost je lahko zelo različna. Zato je zelo pomembno vedeti, od kod prihajajo semena, če jih želite uspešno gojiti. Prednost imajo semena iz regije Yunnan (visoke gore)! Užitnih plodov ne tvori, malo verjetno pa je tudi, da bomo plodove obrodili. Vrste Ensete običajno ne tvorijo otrok. Le v redkih primerih se pojavijo spontano – ob poškodbi vegetacijske točke. Če psevdosteblo zmrzne do tal, je običajno pričakovati popolno izgubo celotne rastline. Sicer pa so Muse bolj zaželene kot vrste Ensete, saj so vrste Musa veliko bolj sposobne regeneracije in tvorbe novih kidlov po vplivih zmrzali. Prednost imajo semena iz regije Yunnan (visoke gore)! Užitnih plodov ne tvori, malo verjetno pa je tudi, da bomo plodove obrodili. Vrste Ensete običajno ne tvorijo otrok. Le v redkih primerih se pojavijo spontano – ob poškodbi vegetacijske točke. Če psevdosteblo zmrzne do tal, je običajno pričakovati popolno izgubo celotne rastline. Sicer pa so Muse bolj zaželene kot vrste Ensete, saj so vrste Musa veliko bolj sposobne regeneracije in tvorbe novih kidlov po vplivih zmrzali. Prednost imajo semena iz regije Yunnan (visoke gore)! Užitnih plodov ne tvori, malo verjetno pa je tudi, da bomo plodove obrodili. Vrste Ensete običajno ne tvorijo otrok. Le v redkih primerih se pojavijo spontano – ob poškodbi vegetacijske točke. Če psevdosteblo zmrzne do tal, je običajno pričakovati popolno izgubo celotne rastline. Sicer pa so Muse bolj zaželene kot vrste Ensete, saj so vrste Musa veliko bolj sposobne regeneracije in tvorbe novih kidlov po vplivih zmrzali. Če psevdosteblo zmrzne do tal, je običajno pričakovati popolno izgubo celotne rastline. Sicer pa so Muse bolj zaželene kot vrste Ensete, saj so vrste Musa veliko bolj sposobne regeneracije in tvorbe novih kidlov po vplivih zmrzali. Če psevdosteblo zmrzne do tal, je običajno pričakovati popolno izgubo celotne rastline. Sicer pa so Muse bolj zaželene kot vrste Ensete, saj so vrste Musa veliko bolj sposobne regeneracije in tvorbe novih kidlov po vplivih zmrzali. **Naravni habitat**: Ensete glaucum izvira iz Nepala, Kitajske in Indonezije. Tam raste na nadmorski višini 800 - 2000 metrov. **Navodila za gojenje:** Gojenje semen v hiši je možno vse leto. Želo trda semena skrbno nahrapavite z brusnim papirjem, jih nato za 24 ur namočite v sobno topli vodi in nato posadite 1 cm globoko v vlažen rastni substrat. Pri temperaturi 22°-25° C kali po 3-6 tednih. **Najboljša lokacija:** Rastline banan ljubijo svetlobo do sončnih leg, ki so nekoliko zaščitene pred vetrom. **Optimalna nega:** Če snežno banano hranimo v loncu, naj bo ta precej velik, saj že 3-letna rastlina potrebuje 60-70 litrski lonec. Če banano sadimo zunaj, pred sajenjem izkopljemo veliko jamo in jo napolnimo s humusno zemljo. Dobava rastlinskih gnojil v posodah vsakih 10 dni od maja do konca septembra. Glede na odnos in rast lahko rastlina obrodi tudi neužitne plodove. **V zimskem času:** Rastlina lahko pozimi preživi zunaj. V ta namen pozno jeseni odrežemo vse liste. Lažno steblo trajnice z ravnim rezom odrežemo 20 cm nad tlemi in ga ovijemo z jutastim flisom ali kokosovo zastirko. Čezenj postavite plastični lonček in ga nasujte z zemljo. V rastlinjaku lahko banana prezimi pri 10°-12°C. Ločiti je treba le liste. Pozno spomladi bo snežna banana spet pognala ob preostalem deblu. Prezimovanje teh banan v tleh je priporočljivo le na območjih s posebej ugodnim podnebjem, kot je Ticino. Rastlino je najbolje izkopati jeseni in ji poreči liste, golo deblo prezimiti s podlago (prosimo, da debla ne režemo nazaj, ker sicer ni več sposoben regeneracije) brez zmrzali in suh pri okoli +5°C. Rastlino ponovno posadite spomladi, takrat bo spet pognala.



Falso plátano

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

De crecimiento rápido con impresionantes hojas de hasta 2 metros de altura

El falso plátano, de crecimiento rápido, no es tan conocido como muchas otras plantas de su especie. El falso plátano desarrolla un seudo tronco fuerte, ceroso y de color verde azulado. Sus largas hojas pueden alcanzar una altura de 2 a 2,5 metros y el tronco hasta 3 - 3,5 metros. Crece tan rápido que puede alcanzar una altura de un metro de altura en tan sólo 4 meses. Esta es la variante de Ensete más resistente. En los países de habla Inglés se llama Snow Banana (plátano nieve). Inicialmente se supuso que era tan duro como la Musa Basjoo. La semilla proviene de Yunnan, donde crece hasta una altura de 2.700 metros. Se asemeja al Ensete ventricosum que tiene un tallo grueso azulado y en exterior ligeramente blanco - pero se queda un poco más pequeño y tiene hojas grandes impresionantes. El área de extensión es Yunnan, Tíbet, noreste de la India, Tailandia a Guinea. La resistencia a heladas puede ser muy variable. Por eso es muy importante saber de dónde viene la semilla, para cultivarla con éxito. ¡Son preferibles las semillas de la región de Yunnan (a grandes altitudes en la montaña)! No tiene frutos comestibles y es poco probable que en nuestra región desarrolle frutos. Las especies de Ensete por lo general no forman hijuelos. Sólo en casos esporádicos - y cuando la yema está dañada Cuando el seudo tronco se hiela hasta el suelo se puede esperar que se pierda toda la planta. Por lo general las variedades Musa son preferibles antes que las variedades Ensete, ya que las especies de Musa son mucho más capaces de regeneración y después de heladas pueden desarrollar nuevos hijuelos. **Ubicación natural**: El lugar de origen de Ensete glaucum es Nepal, China e Indonesia. Donde crece a una altura de 800 - 2.000 metros. **Cultivo exitoso:** El cultivo de las semillas en interior es posible durante todo el año. Las semillas son muy duras y debe granearlas con papel de lijar y mantenerlas en agua a temperatura ambiente durante 24 horas, para hidratarlas. Después introdúzcalas a un centímetro de profundidad en sustrato húmedo. A una temperatura de 22 a 25 centígrados se produce la germinación a las tres a seis semanas. **La mejor ubicación:** Las plantas del falso plátano requieren un lugar entre luminoso y soleado y protegido del viento. **Cuidado óptimo:** Si el falso plátano es cultivado en maceta, ésta debe ser bastante grande, ya que teniendo la planta tres años necesita un macetero de 60 a 70 litros. Si cultiva el falso plátano plantado en exterior cave un agujero grande y llénelo con un suelo rico en humus antes de plantar la planta. Suminístrele de mayo a septiembre cada 10 días fertilizante para plantas en maceta. Dependiendo del cultivo de la planta puede desarrollar frutos no comestibles. **En el invierno:** La planta puede pasar el invierno al aire libre. Para ello solo es necesario cortar todas las hojas a finales de otoño. El seudo tronco del arbusto se corta con un corte recto a una altura de 20 centímetros por encima del suelo y luego se cubre con un paño grueso y suave de yute o esteras de coco. Puede ponerle un cubo de plástico al revés y cubrir con tierra. Si lo mantiene en invernadero puede mantenerlo a temperaturas de entre 10 y 12 grados. Simplemente debe retirar las hojas. A finales de primavera el falso plátano volverá a brotar junto a las unidades troncales. La planta puede pasar el invierno plantada en exterior sólo en las zonas climáticamente más óptimas, como en Tesino. Por lo que es mejor, retirar la planta en otoño del jardín, cortar las hojas y guardar la planta con sus raíces (por favor, no cortar el seudo tallo, sino no puede volver a regenerarse) en un lugar protegido de heladas, seco y a temperatura de 5 grados. En la primavera vuelve a plantar la planta en exterior y brotará de nuevo.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Velký sněhový banán

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

Rychle rostoucí s efektními listy až dva metry vysokými

Rychle rostoucí banánovník sněžný ještě není tak známý jako mnoho jiných druhů. Tvoří silný, voskový a zelenomodrý pseudokmen. Jeho dlouhé listy mohou dosahovat 2-2,5 metru a kmen až 3-3,5 metru. Roste tak rychle, že už po 4 měsících může být metr vysoký. Jedná se o nejtvrdší druh enseta. V anglicky mluvícím světě se nazývá Sněžný banán. Zpočátku se myslelo, že je stejně tvrdý jako Musa Basjoo. Semínko prý pochází z Yunnanu, kde roste až do nadmořské výšky 2700 metrů. Podobá se Ensete Ventricosum, má silný namodralý kmen, zvenčí lehce bílý - zůstává však o něco menší a má působivě velké listy. Oblast rozšíření sahá přes Yunnan, Tibet, severovýchodní Indii, Thajsko až po Novou Guineu, zimní odolnost může být velmi variabilní. Je proto velmi důležité vědět, odkud semena pocházejí, pokud je chcete úspěšně pěstovat. Je třeba upřednostňovat semena z oblasti Yunnan (vysoké hory)! Nevytváří žádné jedlé plody a je nepravděpodobné, že budeme plodit ani my. Druh Ensete obvykle netvoří děti. Jen ojediněle se objevují spontánně – při poškození vegetačního bodu. Pokud pseudokmen přimrzne k zemi, dá se obvykle očekávat totální ztráta celé rostliny. Jinak jsou Musy vhodnější než druhy Ensete, protože druhy Musa jsou mnohem schopnější regenerace a tvoří nové kidely po působení mrazu. Je třeba upřednostňovat semena z oblasti Yunnan (vysoké hory)! Nevytváří žádné jedlé plody a je nepravděpodobné, že budeme plodit ani my. Druh Ensete obvykle netvoří děti. Jen ojediněle se objevují spontánně – při poškození vegetačního bodu. Pokud pseudokmen přimrzne k zemi, dá se obvykle očekávat totální ztráta celé rostliny. Jinak jsou Musy vhodnější než druhy Ensete, protože druhy Musa jsou mnohem schopnější regenerace a tvoří nové kidely po působení mrazu. Je třeba upřednostňovat semena z oblasti Yunnan (vysoké hory)! Nevytváří žádné jedlé plody a je nepravděpodobné, že budeme plodit ani my. Druh Ensete obvykle netvoří děti. Jen ojediněle se objevují spontánně – při poškození vegetačního bodu. Pokud pseudokmen přimrzne k zemi, dá se obvykle očekávat totální ztráta celé rostliny. Jinak jsou Musy vhodnější než druhy Ensete, protože druhy Musa jsou mnohem schopnější regenerace a tvoří nové kidely po působení mrazu. Pokud pseudokmen přimrzne k zemi, dá se obvykle očekávat totální ztráta celé rostliny. Jinak jsou Musy vhodnější než druhy Ensete, protože druhy Musa jsou mnohem schopnější regenerace a tvoří nové kidely po působení mrazu. **Přirozená poloha**: Ensete glaucum pochází z Nepálu, Číny a Indonésie. Tam roste v nadmořských výškách 800 - 2000 metrů. **Úspěšné pěstování:** Pěstování semen v domě je možné po celý rok. Velmi tvrdá semena pečlivě zdrsněte smirkovým papírem, poté namočte na 24 hodin do pokojové vody a poté zasaďte 1 cm hluboko do vlhkého pěstebního substrátu. Při teplotě 22°-25° C dochází ke klíčení po 3-6 týdnech. **Nejlepší umístění:** Banánovníky milují světlo až slunná místa, která jsou poněkud chráněna před větrem. **Optimální péče:** Pokud se sněžný banán chová v květináči, měl by být poměrně velký, protože 3letá rostlina již potřebuje květináč o objemu 60-70 litrů. Pokud je banán vysazený, vykopejte velkou jámu a před výsadbou ji naplňte humózní půdou. Hnojivo pro kontejnerové rostliny dodávejte každých 10 dní od května do konce září. V závislosti na postoji a růstu může rostlina produkovat i nejedlé plody. **V zimě:** Rostlina může přežít venku v zimě. Za tímto účelem jsou všechny listy odříznuty na konci podzimu. Nepravý stonek trvalky seřízneme 20 cm nad zemí rovným řezem a následně obalíme jutovým rounem nebo kokosovou rohoží. Položte na něj plastový květináč a navršte ho zeminou. Ve skleníku může banán přezimovat při 10°-12°C. Je třeba oddělit pouze listy. Na konci jara sněžný banán znovu vyraší vedle zbývajícího kmene. Přezimování těchto banánů v zemi se doporučuje pouze v oblastech s obzvláště příznivým klimatem, jako je Ticino. Rostlinu je nejlépe vyrýt na podzim a odstřihnout listy, holý nepravý kmen zazimovat podnoží (nepravý kmen prosím neřezat, protože jinak již není schopen regenerace) nemrznoucí a suché při teplotě kolem +5°C. Na jaře rostlinu znovu zasaďte, pak znovu vyraší.



Büyük kar muz

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

İki metre yüksekliğe kadar etkileyici yapraklarla hızlı büyüyen

Hızla büyüyen kar muzu, henüz diğer birçok tür kadar iyi bilinmiyor. Güçlü, mumsu ve yeşil-mavi bir psödostem oluşturur. Uzun yaprakları 2-2,5 metreye, gövdesi 3-3,5 metreye kadar ulaşabilir. O kadar hızlı büyür ki 4 ay sonra bir metre yüksekliğe ulaşabilir. Bu en sert ensete türüdür. İngilizce konuşulan dünyada buna Kar Muzu denir. İlk başta Musa Basjoo kadar sert olduğu düşünülüyordu. Tohumun 2700 metre yüksekliğe kadar büyüdüğü Yunnan'dan geldiği söyleniyor. Ensete Ventricosum'a benzeyen kalın mavimsi bir gövdesi vardır, dışı hafif beyazdır - ancak biraz daha küçüktür ve etkileyici derecede büyük yaprakları vardır. Dağıtım alanı Yunnan, Tibet, Kuzeydoğu Hindistan, Tayland ve Yeni Gine'ye kadar uzanır. kışa dayanıklılık çok değişken olabilir. Bu nedenle, başarılı bir şekilde yetiştirmek istiyorsanız tohumların nereden geldiğini bilmek çok önemlidir. Yunnan bölgesinden (yüksek dağlar) gelen tohumlar tercih edilmelidir! Yenilebilir meyve oluşturmaz ve meyve vermemiz de olası değildir. Ensete türleri genellikle çocuk oluşturmaz. Sadece nadir durumlarda kendiliğinden ortaya çıkarlar - bitki örtüsü noktası hasar gördüğünde. Sahte gövde yere donarsa, genellikle tüm bitkinin tamamen kaybedilmesi beklenir. Aksi takdirde, Musa türleri, don etkilerinden sonra yenilenme ve yeni yavrular oluşturma konusunda çok daha yetenekli olduklarından, Ensete türlerine tercih edilir. Yunnan bölgesinden (yüksek dağlar) gelen tohumlar tercih edilmelidir! Yenilebilir meyve oluşturmaz ve meyve vermemiz de olası değildir. Ensete türleri genellikle çocuk oluşturmaz. Sadece nadir durumlarda kendiliğinden ortaya çıkarlar - bitki örtüsü noktası hasar gördüğünde. Sahte gövde yere donarsa, genellikle tüm bitkinin tamamen kaybedilmesi beklenir. Aksi takdirde, Musa türleri, don etkilerinden sonra yenilenme ve yeni yavrular oluşturma konusunda çok daha yetenekli olduklarından, Ensete türlerine tercih edilir. Yunnan bölgesinden (yüksek dağlar) gelen tohumlar tercih edilmelidir! Yenilebilir meyve oluşturmaz ve meyve vermemiz de olası değildir. Ensete türleri genellikle çocuk oluşturmaz. Sadece nadir durumlarda kendiliğinden ortaya çıkarlar - bitki örtüsü noktası hasar gördüğünde. Sahte gövde yere donarsa, genellikle tüm bitkinin tamamen kaybedilmesi beklenir. Aksi takdirde, Musa türleri, don etkilerinden sonra yenilenme ve yeni yavrular oluşturma konusunda çok daha yetenekli olduklarından, Ensete türlerine tercih edilir. Sahte gövde yere donarsa, genellikle tüm bitkinin tamamen kaybedilmesi beklenir. Aksi takdirde, Musa türleri, don etkilerinden sonra yenilenme ve yeni yavrular oluşturma konusunda çok daha yetenekli olduklarından, Ensete türlerine tercih edilir. Sahte gövde yere donarsa, genellikle tüm bitkinin tamamen kaybedilmesi beklenir. Aksi takdirde, Musa türleri, don etkilerinden sonra yenilenme ve yeni yavrular oluşturma konusunda çok daha yetenekli olduklarından, Ensete türlerine tercih edilir. **Doğal konum**: Ensete glaucum'un anavatanı Nepal, Çin ve Endonezya'dır. Orada 800 - 2000 metre rakımlarda yetişir. **Başarılı yetiştirme:** Evdeki tohumların ekimi tüm yıl boyunca mümkündür. Çok sert tohumlar dikkatlice zımpara kağıdı ile pürüzlendirilmeli, ardından 24 saat oda sıcaklığında suda bekletilmeli ve ardından nemli büyüyen alt tabakaya 1 cm derinlikte ekilmelidir. 22°-25°C sıcaklıkta 3-6 hafta sonra çimlenme gerçekleşir. **En iyi konum:** Muz bitkileri, rüzgardan biraz korunan, hafif ve güneşli yerleri sever. **Optimum bakım:** Kar muzu bir saksıda tutulursa oldukça büyük olmalıdır çünkü 3 yaşındaki bir bitkinin zaten 60-70 litrelik bir saksıya ihtiyacı vardır. Muz etkilirse, ekimden önce büyük bir çukur kazın ve humus açısından zengin toprakla doldurun. Mayıs ayından Eylül ayının sonuna kadar her 10 günde bir konteyner bitki gübresi verin. Tutum ve büyümeye bağlı olarak bitki yenmeyen meyveler de üretebilir. **Kışın:** Bitki kışın dışarıda yaşayabilir. Bu amaçla sonbaharın sonlarında tüm yapraklar kesilir. Çok yıllık bitkinin sahte gövdesi yerden 20 cm yukarıda düz bir şekilde kesilir ve ardından jüt yapağı veya hindistancevizi hasırına sarılır. Üzerine plastik bir kap koyun ve üzerini toprakla doldurun. Muz, serada 10°-12°C'de kışlayabilir. Sadece yapraklar ayrılmalıdır. İlkbaharın sonlarında, kar muzu kalan gövdenin yanında yeniden filizlenir. Bu muzları toprakta kışlamak sadece Ticino gibi özellikle elverişli bir iklime sahip bölgelerde tavsiye edilir. Bitkiyi sonbaharda kazmak ve yaprakları kesmek, çıplak sahte gövdeyi anaçla kışlamak en iyisidir (lütfen sahte gövdeyi kesmeyin, çünkü aksi takdirde artık yenilenemez) donmaz ve yaklaşık +5°C'de kurur. Bitkiyi ilkbaharda tekrar dikin, sonra tekrar filizlenecektir.



Nagy hóbanán

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

Gyors növekedésű, lenyűgöző levelekkel, akár két méter magas

A gyorsan növekvő hóbanán még nem olyan ismert, mint sok más faj. Erős, viaszos és zöldeskék áltörzset alkot. Hosszú levelei 2-2,5 métert, törzse 3-3,5 métert is elérhetnek. Olyan gyorsan nő, hogy 4 hónap után akár egy méter magas is lehet. Ez a legkeményebb ensete faj. Az angol nyelvterületen hóbanánnak hívják. Először azt hitték, hogy olyan kemény, mint a Musa Basjoo. A mag állítólag Yunnanból származik, ahol 2700 méteres magasságig nő fel. Az Ensete Ventricosumra hasonlít, vastag kékes törzse van, kívül kissé fehér - de kissé kisebb marad, és lenyűgözően nagy levelei vannak. Az elterjedési terület Jünnanon, Tibeten, Északkelet-Indián, Thaiföldön és Új-Guineáig terjed, a télállóság nagyon változó lehet. Ezért nagyon fontos tudni, honnan származnak a magok, ha sikeresen akarjuk termeszteni őket. A Yunnan régióból (magas hegyekből) származó magvakat részesítsük előnyben! Nem hoz létre ehető gyümölcsöt, és nem valószínű, hogy termésünk is lesz. Az Ensete fajok általában nem képeznek gyermeket. Csak ritka esetekben jelennek meg spontán módon - amikor a vegetációs pont megsérül. Ha a pszeudoszár a talajhoz fagy, általában az egész növény teljes elvesztésével kell számolni. Ellenkező esetben a musák előnyösebbek, mint az Ensete fajok, mivel a Musa fajok sokkal jobban képesek regenerálódni, és a fagy hatására új kideleket képeznek. A Yunnan régióból (magas hegyekből) származó magvakat részesítsük előnyben! Nem hoz létre ehető gyümölcsöt, és nem valószínű, hogy termésünk is lesz. Az Ensete fajok általában nem képeznek gyermeket. Csak ritka esetekben jelennek meg spontán módon - amikor a vegetációs pont megsérül. Ha a pszeudoszár a talajhoz fagy, általában az egész növény teljes elvesztésével kell számolni. Ellenkező esetben a musák előnyösebbek, mint az Ensete fajok, mivel a Musa fajok sokkal jobban képesek regenerálódni, és a fagy hatására új kideleket képeznek. A Yunnan régióból (magas hegyekből) származó magvakat részesítsük előnyben! Nem hoz létre ehető gyümölcsöt, és nem valószínű, hogy termésünk is lesz. Az Ensete fajok általában nem képeznek gyermeket. Csak ritka esetekben jelennek meg spontán módon - amikor a vegetációs pont megsérül. Ha a pszeudoszár a talajhoz fagy, általában az egész növény teljes elvesztésével kell számolni. Ellenkező esetben a musák előnyösebbek, mint az Ensete fajok, mivel a Musa fajok sokkal jobban képesek regenerálódni, és a fagy hatására új kideleket képeznek. Ha a pszeudoszár a talajhoz fagy, általában az egész növény teljes elvesztésével kell számolni. Ellenkező esetben a musák előnyösebbek, mint az Ensete fajok, mivel a Musa fajok sokkal jobban képesek regenerálódni, és a fagy hatására új kideleket képeznek. Ha a pszeudoszár a talajhoz fagy, általában az egész növény teljes elvesztésével kell számolni. Ellenkező esetben a musák előnyösebbek, mint az Ensete fajok, mivel a Musa fajok sokkal jobban képesek regenerálódni, és a fagy hatására új kideleket képeznek. **Természetes elhelyezkedés**: Az Ensete glaucum Nepálban, Kínában és Indonéziában őshonos. Ott 800-2000 méteres magasságban nő. **Sikeres termesztés:** A vetőmagok házon belüli termesztése egész évben lehetséges. A nagyon kemény magvakat csiszolópapírral óvatosan érdesíteni kell, majd 24 órára szobameleg vízbe áztatni, majd 1 cm mélyen nedves termesztőfelületbe ültetni. 22°-25°C hőmérsékleten a csírázás 3-6 hét múlva következik be. **A legjobb hely:** A banánnövények szeretik a világos vagy napos helyeket, amelyek kissé védettek a széltől. **Optimális gondozás:** Ha a hóbanánt cserépben tartjuk, akkor elég nagynak kell lennie, hiszen egy 3 éves növénynek már 60-70 literes cserép kell. Ha a banánt kiültetjük, ásunk egy nagy lyukat, és ültetés előtt töltsük meg humuszban gazdag talajjal. Májustól szeptember végéig 10 naponként adjon konténeres növényi műtrágyát. Attitűdtől és növekedéstől függően a növény nem ehető gyümölcsöket is teremhet. **Télen:** A növény túléli a szabadban télen. Ebből a célból késő ősszel minden levelet levágnak. Az évelő hamis szárát a talaj felett 20 cm-rel egyenes vágással levágjuk, majd jutagyapjúba vagy kókuszszőnyegbe tekerjük. Tegyünk rá egy műanyag edényt, és halmozzuk fel földdel. Az üvegházban a banán 10°-12°C-on áttelelhet. Csak a leveleket kell szétválasztani. Késő tavasszal a megmaradt törzs mellett ismét kihajt a hóbanán. Ezeknek a banánoknak a talajban történő áttelelése csak különösen kedvező éghajlatú területeken javasolt, például Ticinóban. A legjobb ősszel kiásni a növényt és levágni a leveleket, a csupasz áltörzset alanyal átteleltetni (az áltörzset ne vágd vissza, mivel egyébként már nem képes regenerálódni) fagymentes és +5°C körüli száraz. Tavasszal ültessük újra a növényt, akkor újra kihajt.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved

スノーバナナ

Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii

急成長と印象的な2mの長い葉

急成長するスノーバナナは、バショウ科の中で最も強い種ですが、他の種ほど有名ではありません。高さ3m～3.5mに達するワックス状で青緑色の頑丈な偽茎を形成するのに対して、葉は2m～2.5mの長さになります。4ヵ月で1mの高さまで急成長します。英語圏では、Ensete glaucumはスノーバナナと呼ばれ、当初はバショウと同じくらい強い種だと考えられていました。海抜2700mの高さで育つ雲南から種が広まった可能性が高いと考えられています。スノーバナナはエンセーテに似ており、表面がわずかに白く太い青い茎を持ちます。それは印象的な大きな葉を形成しながら成長します。分布地域は、雲南、チベット、北東インドからタイ、そして二ューギ二アまで広がりますが、耐寒性はそれぞれ異なります。したがって、種がどの地域のもかを知ることが大切です。雲南省の高山地域の種を選択するのが最良です！食べることのできる果物は実りません。たぶん果実を見ることはないでしょう。エンセーテ種は通常、層を形成しません；ごくまれにしか起こりませんが偽茎が凍結した場合、植物は確実に枯れるでしょう。しかし、バショウ属は霜の後に新たな層を生成し再生する可能性がより高いため、エンセーテ種よりお勧めです。

自然な場所: 生息地はネパール、中国、インドネシアで、そこでは、海抜800〜2000mの高さで成長します。

栽培成功:
種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を高める方法として、サンドペーパーなどで種の表面を粗面化し、温水に24時間浸します。その後、湿った培養土の1㎝の深さに種を植えます。22℃～25℃の場所に保管すると、3～6週間で発芽します。

最高のロケーション: 明るく暖かい防風された場所での保管が理想的です。

最適なケア:
植えて3年目で60～70ℓの鉢が必要になるので、早いうちから大きめの鉢を使用します。屋外に植える場合は腐植土を植える穴に入れます。5月から9月の終わりまでは、10日ごとに鉢植え植物用の肥料を与えます。栽培の仕方によっては、果物が実ることもあるかもしれませんが、食べるには適しません。

冬に:
屋外での冬越しが可能です。そのためには、秋の終わりにすべての葉を切ります。偽茎を地上20cmの高さでまっすぐに切り、保護のために麻またはむしろで覆い、その上にプラスチックポットを被せ、さらに土で覆います。10℃～12℃の温室内で冬越しできます；その場合、葉のみ切る必要があります。春の終わりに、残った茎の隣から再び発芽します。例えばテシーン地域などの特別な気候地域では、屋外での冬越しが可能です。最も安全に冬を越す方法として、葉を切り取り偽茎を気温5℃の乾燥した霜のつかない場所に保管します。茎を切ると再生しなくなります。春に植え付けると、
再び発芽します。

SKU: 13013 / Große Schneebanane

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved