SKU: 13002 Weißer Maulbeerbaum



© Luis Fernández García - c-by-sa-2.1-es

Morus alba

Tips

Български	BG	2		Malti	MT	5
Dansk	DK	2		Nederlands	NL	5
Deutsch	DE	2		Norsk	NO	6
English	UK	2		Polski	PL	6
Eesti	EE	3		Português	PT	6
Suomalainen	FI	3		Românesc	RO	6
Français	FR	3		Svenska	SE	7
Ελληνική	GR	3		Slovensky	SK	7
Gaeilge	IE	4		Slovenski	SI	7
íslenskur	IS	4		Español	ES	7
Italiano	IT	4		Česky	CZ	8
Hrvatski	HR	4		Türkçe	TR	8
Latviešu	LV	5		Magyar	HU	8
Lietuvių kalba	LT	5		日本語	JP	9

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Бяла черница
Morus alba
Захарно-сладки бели плодове - Издръжливи до -20° по Целзий

Листата на широколистната бяла черница служат като хранителни дървета за копринените буби в производството на коприна в Индия. Листата на едно и също дърво могат да варират от гладки до дълбоко пръстовидни и дълбоко разчленени. Дължи името си на белите си пъпки, които се появяват през май и юни, и белите плодове, които могат да станат червеникави при силно слънце. Дори младите дървета могат да дадат обилни количества от сочните, сладки като захар плодове. Дървото е издръжливо и лесно за отглеждане както на открито, така и в кофа и оформяне чрез резитба - възможни са дори върбовидни варианти с чадъровидни висящи клони. **Естествено местоположение**: Бялата черница първоначално е родом от Манджурия в Китай. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. Разпръснете семената върху влажен субстрат за отглеждане и ги покрийте само тънко със субстрата. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Покълването обикновено става след две до пет седмици. **Най-доброто местоположение:** Черничите обичат слънчеви и топли места, но обичат да бъдат защитени от вятъра. **Оптимална грижа:** Вашата черница е изключително лесна за грижи. През първите няколко години може да се съхранява и в кофа, но след това, особено през летните месеци, се нуждае от обилно поливане без преовлажняване и торене с течен тор за кофа между май и септември на интервали от четири седмици. Засадените дървета също могат да понасят периоди на суша - но е по-добре да ги поливате обилно два пъти седмично през топлия сезон. Подрязването не е от съществено значение, но може да се извършва ежегодно през март, за да се контролира размерът на короната и разклоняването. Черниците дават плод както на млада, така и на стара дървесина. **През зимата:** Смята се, че бялата черница е издръжлива до поне -20 °C и е известно, че дърветата, засадени на открито, са оцелели дори при по-ниски температури. Въпреки това дърветата, държани в саксии, се нуждаят от зимна защита или хладно място за презимуване, което може да бъде и тъмно, тъй като дървото хвърля листата си през зимата.



Hvidt morbærtræ
Morus alba
Sukkersøde hvide bær - Hårdføre til -20° Celsius

Bladene fra den løvfældende hvide morbær tjener som fødetræer for silkeormene i indisk silkeproduktion. Bladene på det samme træ kan variere fra glatkantede til dybt fingerformede og dybt dissekeret. Den skylder sit navn til sine hvide knopper, som dukker op i maj og juni, og de hvide frugter, som også kan blive rødlige i stærkt solskin. Selv unge træer kan bære rigelige mængder af den saftige, sukkersøde frugt.Træet er hårdfør og nemt at dyrke både udendørs og i spand og form ved beskæring - selv pilelignende varianter med paraplyformede hængende grene er mulige. **Naturlig beliggenhed**: Det hvide morbærtræ er oprindeligt hjemmehørende i Manchuriet i Kina. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. Spred frøene på fugtigt voksende substrat og dæk dem kun tyndt med substratet. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Spiring sker normalt efter to til fem uger. **Den bedste beliggenhed:** Morbærtræer elsker solrige og varme steder, men kan godt lide at blive beskyttet mod vinden. **Optimal pleje:** Dit morbærtræ er ekstremt nemt at passe. I de første år kan den også holdes i spand, men så skal den især i sommermånederne have rigeligt vanding uden vand og gødskning med flydende spandplantegødning mellem maj og september med fire ugers mellemrum. Træer, der er plantet, kan også tåle tørkeperioder – men det er bedre at vande dem meget to gange om ugen i den varme årstid. Beskæring er ikke afgørende, men kan udføres årligt i marts for at kontrollere kronestørrelse og forgrening. Morbær sætter frugt på både ungt og gammelt træ. **Om vinteren:** Den hvide morbær anses for at være hårdfør ned til mindst -20 °Celsius, og man ved, at udplantede træer har overlevet endnu lavere temperaturer. Træer holdt i krukker har dog brug for vinterbeskyttelse eller et køligt sted at overvintre, som også kan være mørkt, da træet fælder blade om vinteren.



Weißer Maulbeerbaum
Morus alba
Zuckersüße weiße Beeren - Winterhart bis -20° Celsius

Die Blätter der sommergrünen Weißen Maulbeere dienen den Seidenraupen in der indischen Seidenherstellung als Futterbäume. Die Blätter des selben Baums können von glattrandig bis hin zu tief fingerförmig und tief eingeschnittenen variieren. Ihren Namen verdankt sie ihren im Mai und Juni erscheinenden weißen Knospen und den weißen Früchten, die sich bei starker Sonne allerdings auch rötlich färben können. Schon junge Bäume können reichliche Mengen der saftigen, zuckersüßen Früchte tragen. Der Baum ist winterhart und lässt sich sowohl ausgepflanzt wie auch im Kübel einfach halten und durch Rückschnitt formen - sogar weidenartige Varianten mit schirmförmig herabhängenden Zweigen sind möglich. **Naturstandort**: Der Weiße Maulbeerbaum ist in der Mandschurei in China ursprünglich heimisch. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Streuen Sie die Samen auf feuchtes Anzuchtsubstrat und bedecken Sie sie nur dünn mit dem Substrat. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Die Keimung erfolgt zumeist nach zwei bis fünf Wochen. **Standort:** Maulbeerbäume lieben sonnige und warme Standorte, stehen aber gerne etwas windgeschützt. **Pflege:** Ihr Maulbeerbaum ist ausgesprochen pflegeleicht. In den ersten Jahren kann er auch gut im Kübel gehalten werden, verlangt dann aber gerade während der Sommermonate nach reichlicher Wässerung ohne Staunässe und einer Düngung mit flüssigem Kübelpflanzendünger zwischen Mai und September im Abstand von vier Wochen. Ausgepflanzte Bäume vertragen auch Trockenperioden - besser ist es aber, sie in der warmen Jahreszeit zweimal wöchentlich ausgiebig zu wässern. Rückschnitt ist nicht unbedingt nötig, kann aber jährlich im März erfolgen, um die Kronengröße und die Verzweigung zu steuern. Maulbeeren setzen sowohl am jungen als auch am alten Holz Früchte an. **Im Winter:** Die Weiße Maulbeere gilt als mindestens bis -20 °Celsius winterhart und es ist bekannt, dass ausgepflanzte Bäume auch noch tiefere Temperaturen überstanden haben. Im Kübel gehaltene Bäume benötigen aber einen Winterschutz oder einen kühlen Platz zum überwintern, der auch dunkel sein darf, da der Baum zum Winter das Laub abwirft.



White Mulberry
Morus alba
Sugar-sweet white berries – frost-resistant up to -20° Celsius

The leaves of the deciduous White Mulberry provide the food for the silkworms in the Indian silk making and come in various shapes, from clear-cut edged to deep-cut finger-shaped. Its name comes from the white buds and white fruits that the plant produces in May and June, although the fruits may take on a reddish colour with strong sunlight. Even young plants can grow copious amounts of the sweet and juicy fruits. The White Mulberry is frost-resistant and can either be planted outdoors or cultivated as a tub plant. You can easily prune the tree to your liking, even willow-like forms with umbrella-shaped hanging branches are possible. **Natural location**: The White Mulberry has its natural habitat in the Manchuria region of China. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. Spread the seeds onto moist potting compost and put just a little compost earth on top. Then, cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don’t forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20° and 25° Celsius and keep the earth moist, but not wet. Usually it takes two to six weeks until germination. **The best location:** The White Mulberry prefers sunny and warm places, ideally in a slightly wind-protected spot. **Optimal care:** The White Mulberry is rather carefree. It can be kept in a tub for the first years, where it needs especially during summer proper waterings without waterlogging, as well as fluid fertilizer for tub plants once a month from May until September. Outdoor plants can endure a dry period, but it is better to thoroughly water your plant twice a week in the hot season. Pruning is usually not necessary, but it can be done once a year in March to achieve the desired form and branching of the crown. The White Mulberry produces fruits on the new and the old branches. **In the winter:** The White Mulberry is frost-resistant at least up to -20 °Celsius, and there are known cases where outdoor plants endured even lower temperatures. Tub plants however, need some frost protection or a cool and even darker room for hibernation since the tree will cast the leaves in winter.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Valge mooruspuu
Morus alba
Suhkrumagusad valged marjad – vastupidavad kuni -20°C

Heitlehise valge mooruspuu lehed on India siiditootmises siidiusside toidupuud. Sama puu lehed võivad varieeruda sileda servaga kuni sügavalt sõrmekujuliste ja sügavalt tükeldatud. Oma nime võlgneb ta oma valgetele pungadele, mis ilmuvad mais ja juunis, ning valgetele viljadele, mis võivad ka tugeva päikesepaiste käes punakaks muutuda. Isegi noored puud võivad kanda suures koguses mahlaseid suhkrumagusaid puuvilju.Puu on vastupidav ja seda on lihtne kasvatada nii õues kui ämbris ning vormida pügamise teel - võimalikud on ka vihmavarjukujuliste rippuvate okstega pajutaolised variandid. **Looduslik asukoht**: Valge mooruspuu on algselt pärit Hiinas Mandžuuriast. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringselt. Puista seemned niiskele kasvusubstraadile ja kata need vaid õhukeselt substraadiga. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 ° C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Idanemine toimub tavaliselt kahe kuni viie nädala pärast. **Parim asukoht:** Mooruspuud armastavad päikeselist ja sooja kohta, kuid neile meeldib olla kaitstud tuule eest. **Optimaalne hooldus:** Teie mooruspuu eest on äärmiselt lihtne hoolitseda. Esimestel aastatel võib teda pidada ka ämbris, kuid siis, eriti suvekuudel, vajab ta rohkelt kastmist ilma vettimiseta ning maist septembrini neljanädalaste intervallidega väetamist vedela ämbritaimeväetisega. Istutatud puud taluvad ka põuaperioode – aga parem on neid soojal aastaajal kaks korda nädalas rohkelt kasta. Pügamine ei ole hädavajalik, kuid seda saab teha igal aastal märtsis, et kontrollida võra suurust ja hargnemist. Mooruspuumarjad annavad vilja nii noorel kui ka vanal puidul. **Talvel:** Valget mooruspuud peetakse külmakindlaks vähemalt -20 °C-ni ja teadaolevalt on välja istutatud puud üle elanud ka madalamaid temperatuure. Potis peetavad puud vajavad aga talvekaitset või jahedat talvitumiskohta, mis võib olla ka pime, kuna talvel ajab puu lehti maha.



Valkoinen mulperipuu
Morus alba
Sokerimakeat valkoiset marjat - Kestävät -20 astetta

Lehtipuun valkoisen mulperipuun lehdet toimivat intialaisen silkintuotannon silkkiäistoukkien ruokapuina. Saman puun lehdet voivat vaihdella sileäreunaisista syvän sormenmuotoisiin ja syvälle leikattuihin. Se johtuu nimensä valkoisista silmuistaan, jotka ilmestyvät toukokuussa ja kesäkuussa, sekä valkoisista hedelmistä, jotka voivat myös muuttua punertavaksi voimakkaassa auringonpaisteessa. Jopa nuoret puut voivat kantaa suuria määriä mehukkaita, sokerimakeita hedelmiä.Puu on kestävä ja helppo kasvattaa sekä ulkona että kauhassa ja muotoilla karsimalla - jopa pajumaiset variantit sateenvarjon muotoisilla roikkuvilla oksilla ovat mahdollisia. **Luonnollinen sijainti**: Valkoinen mulperipuu on alun perin kotoisin Kiinan Mantšuriasta. **Onnistunut viljely:** Kasvatus siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Sirottele siemenet kostealle kasvualustalle ja peitä ne vain ohuesti alustalla. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Itäminen tapahtuu yleensä kahden tai viiden viikon kuluttua. **Paras sijainti:** Mulperipuut rakastavat aurinkoisia ja lämpimiä paikkoja, mutta haluavat olla suojassa tuulelta. **Optimaalinen hoito:** Mulperipuusi on erittäin helppohoitoinen. Ensimmäisinä vuosina sitä voidaan pitää myös ämpärissä, mutta silloin, varsinkin kesäkuukausina, se tarvitsee runsaasti kastelua ilman kastelua ja lannoitusta nestemäisellä ämpärilannoitteella touko-syyskuussa neljän viikon välein. Istutetut puut kestävät myös kuivuutta, mutta lämpimänä vuodenaikana on parempi kastella niitä runsaasti kahdesti viikossa. Leikkaaminen ei ole välttämätöntä, mutta se voidaan tehdä vuosittain maaliskuussa kruunun koon ja haarautumisen hallitsemiseksi. Mulperimarjat kantavat hedelmää sekä nuorelle että vanhalle puulle. **Talvella:** Valkoisen mulperipuun katsotaan kestävän vähintään -20 °C:een asti ja tiedetään, että istutetut puut ovat selvinneet vielä alemmistakin lämpötiloista. Ruukuissa pidetyt puut tarvitsevat kuitenkin talvisuojaa tai viileää talvehtimispaikkaa, joka voi olla myös pimeää, koska puu pudottaa lehtiään talvella.



Mûrier blanc
Morus alba
Des baies blanches sucrées - Rustique jusqu'à -20° Celsius

Les feuilles du mûrier blanc sempervirent servent aux vers à soie d'aliment dans la fabrication de soie indienne. Les feuilles du même arbre peuvent varier de forme, elles peuvent être lisses, en forme de doigt et profondément entaillées. Il doit son nom aux bourgeons blancs qui apparaissent en mai et juin, et aux fruits blancs qui peuvent être rouges en plein soleil. Les jeunes plantes peuvent porter une grande quantité de fruits juteux et sucrés. L'arbre est rustique est peut être repiqué ou entretenu en pot en le taillant - même des variantes avec des branches suspendues et en forme de parapulie sont possibles. **Emplacement naturel**: Le mûrier blanc est originaire de la Mandchourie, en Chine. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Parsemez les graines sur du substrat humide et recouvrez-les légèrement avec le substrat. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. En général, la germination a lieu après deux à cinq semaines. **Le meilleur emplacement:** Les mûriers aiment des emplacements ensoleillés et chauds, mais assez protégés du vent. **Soins optimaux:** Votre mûrier est très peu exigeant. Il peut être bien entretenu en pot pendant les premières années, mais dans ce cas, il a besoin de beaucoup d'eau pendant les mois d'été, tout en évitant l'eau stagnante, ainsi qu'un engraissement toutes les quatre semaines entre mai et septembre avec de l'engrais liquide pour plantes en pot. Les arbres repiqués supportent aussi les périodes sèches, mais il est mieux de les arroser abondamment deux fois par semaine pendant la saison chaude. Il n'est pas nécessaire de tailler le mûrier, mais vous pouvez le faire tous les ans en mars, afin de contrôler la taille de la couronne et la ramification. Les mûriers jeunes et vieux poussent des fruits. **En hiver:** Le mûrier blanc est rustique jusqu'à -20° Celsius et on sait que des arbres repiqués ont aussi surmonté des températures encore plus basses. Par contre, les arbres entretenus en pot ont besoin d'une protection contre l'hiver ou un endroit froid, qui peut aussi être sombre, car l'arbre rejette ses feuilles pour l'hiver.



Λευκή μουριά
Morus alba
Λευκά μούρα με γλυκά ζάχαρη - Ανθεκτικά έως -20° Κελσίου

Τα φύλλα της φυλλοβόλας λευκής μουριάς χρησιμεύουν ως δέντρα τροφής για τους μεταξοσκώληκες στην ινδική παραγωγή μεταξιού. Τα φύλλα του ίδιου δέντρου μπορεί να ποικίλλουν από λείες άκρες έως βαθιά δακτυλόμορφα και βαθιά τεμαχισμένα. Οφείλει το όνομά του στους λευκούς οφθαλμούς του, που εμφανίζονται τον Μάιο και τον Ιούνιο, και στους λευκούς καρπούς, που μπορούν επίσης να κοκκινίσουν σε έντονη ηλιοφάνεια. Ακόμη και τα νεαρά δέντρα μπορούν να φέρουν άφθονες ποσότητες από ζουμερά, γλυκά φρούτα.Το δέντρο είναι ανθεκτικό και εύκολο να αναπτυχθεί τόσο σε εξωτερικούς χώρους όσο και σε κουβά και σχήμα με κλάδεμα - ακόμη και παραλλαγές που μοιάζουν με ιτιά με κρεμαστά κλαδιά σε σχήμα ομπρέλας είναι δυνατές. **Φυσική τοποθεσία**: Η λευκή μουριά είναι αρχικά εγγενής στη Μαντζουρία στην Κίνα. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Διασκορπίστε τους σπόρους σε υγρό υπόστρωμα ανάπτυξης και καλύψτε τους μόνο αραιά με το υπόστρωμα. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινόχαρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Η βλάστηση εμφανίζεται συνήθως μετά από δύο έως πέντε εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Οι μουριές αγαπούν τις ηλιόλουστες και ζεστές τοποθεσίες, αλλά τους αρέσει να προστατεύονται από τον άνεμο. **Βέλτιστη φροντίδα:** Η μουριά σας είναι εξαιρετικά εύκολη στη φροντίδα. Τα πρώτα χρόνια μπορεί να διατηρηθεί και σε κουβά, αλλά στη συνέχεια, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, χρειάζεται άφθονο πότισμα χωρίς να ξεχειλίζει και λίπανση με υγρό λίπασμα φυτού κάδου μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου σε διαστήματα τεσσάρων εβδομάδων. Τα δέντρα που έχουν φυτευτεί μπορούν επίσης να ανεχθούν περιόδους ξηρασίας - αλλά είναι καλύτερο να τα ποτίζετε εκτενώς δύο φορές την εβδομάδα τη ζεστή εποχή. Το κλάδεμα δεν είναι απαραίτητο, αλλά μπορεί να γίνει ετησίως τον Μάρτιο για τον έλεγχο του μεγέθους της κόμης και των διακλαδώσεων. Οι μουριές καρποφορούν τόσο σε νεαρό όσο και σε παλιό ξύλο. **Το χειμώνα:** Η λευκή μουριά θεωρείται ανθεκτική έως τουλάχιστον -20 °C και είναι γνωστό ότι τα δέντρα που φυτεύτηκαν έχουν επιβιώσει σε ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ωστόσο, τα δέντρα που διατηρούνται σε γλάστρες χρειάζονται χειμερινή προστασία ή ένα δροσερό μέρος για να ξεχειμωνιάσουν, το οποίο μπορεί επίσης να είναι σκοτεινό, αφού το δέντρο ρίχνει τα φύλλα του το χειμώνα.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Crann mulberry bán
Morus alba
Caora bána siúcra-milis - Hardy go -20 ° Celsius

Feidhmíonn duilleoga na móna bána duillsilteacha mar chrainn bhia do na péisteanna síoda i dtáirgeadh síoda Indiach. Is féidir le duilleoga an chrainn chéanna a bheith éagsúil ó imeall mín go méar-chruthach agus deighilte go domhain. Tá an t-ainm mar gheall ar a bachlóga bána, atá le feiceáil i mí na Bealtaine agus i mí an Mheithimh, agus na torthaí bána, ar féidir leo casadh dearg freisin i solas na gréine láidir. Is féidir fiú crainn óga a iompróidh méideanna go leor de na juicy, torthaí siúcra-milis.Tá an crann crua agus éasca le fás lasmuigh agus i mbuicéad agus cruth trí bhearradh - is féidir fiú leaganacha cosúil le saileach le craobhacha crochta scáth-chruthach. **Suíomh nádúrtha**: Tá an crann mulberry bán dúchasach do Mhanchuria sa tSín. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. Scaip na síolta ar fhoshraith tais atá ag fás agus gan ach iad a chlúdach go tanaí leis an tsubstráit. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnla a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ní fliuch. Tarlaíonn péacadh de ghnáth tar éis dhá go cúig seachtaine. **An suíomh is fearr:** Is breá le crainn Mulberry áiteanna grianmhara agus te, ach is maith leo a bheith cosanta ón ghaoth. **Cúram is fearr is féidir:** Tá sé thar a bheith éasca aire a thabhairt do do chrann mulch. Sna chéad chúpla bliain, is féidir é a choinneáil i buicéad freisin, ach ansin, go háirithe i rith an tsamhraidh, ní mór go leor uisce a bheith aige gan uisce agus toirchiú le leasachán plandaí buicéad leachtach idir Bealtaine agus Meán Fómhair ag eatraimh ceithre seachtaine. Is féidir le crainn atá curtha freisin tréimhsí triomach a fhulaingt - ach is fearr iad a uisce go forleathan dhá uair sa tseachtain sa séasúr te. Níl bearradh riachtanach ach is féidir é a dhéanamh go bliantúil i mí an Mhárta chun méid an choróin agus an brainseach a rialú. Leagann mulch torthaí ar adhmad óg agus aosta araon. **Sa gheimhreadh:** Meastar go bhfuil an mulberry bán crua síos go dtí -20 °Celsius ar a laghad agus is eol go bhfuil na crainn a cuireadh amach tar éis maireachtáil ar theocht níos ísle fós. Mar sin féin, teastaíonn cosaint geimhridh nó áit fhionnuar le haghaidh geimhreadh ó chrainn a choinnítear i bpotaí, rud a d'fhéadfadh a bheith dorcha freisin, ós rud é go gcailleann an crann a dhuilleoga sa gheimhreadh.



Hvítt mórberjatré
Morus alba
Sykursæt hvít ber - Harðgerð að -20° á Celsíus

Lauf laufahvíta mórberjans þjóna sem mattré fyrir silkiorma í indverskri silkiframleiðslu. Lauf sama trésins geta verið breytileg frá sléttum brúnum til djúpt fingurlaga og djúpt krufin. Nafnið á hún að þakka hvítum brum sem birtast í maí og júní og hvítum ávöxtum sem geta líka orðið rauðleitir í sterku sólskini. Jafnvel ung tré geta borið mikið magn af safaríkum, sykursætum ávöxtum.Tréð er harðgert og auðvelt að rækta það bæði utandyra og í fötu og móta það með því að klippa það - jafnvel víðilík afbrigði með regnhlífarlaga hangandi greinum eru möguleg. **Náttúruleg staðsetning**: Hvíta mórberjatréð er upprunalega ættað frá Mansjúríu í Kína. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyra er mögulegt allt árið um kring. Dreifið fræjunum á rakt vaxandi undirlag og hyljið þau aðeins þunnt með undirlaginu. Hyljið ræktunarílátið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25° Celsíus og haltu pottajarðveginum rökum en ekki blautum. Spírun á sér venjulega stað eftir tvær til fimm vikur. **Besta staðsetningin:** Mýrberjatré elska sólríka og hlýja staði, en vilja vera verndað fyrir vindi. **Besta umönnun:** Mýrberjatréð þitt er mjög auðvelt að sjá um. Fyrstu árin er líka hægt að geyma hann í fötu, en þá, sérstaklega yfir sumarmánuðina, þarf hann mikla vökvun án þess að vatnsföll og frjóvgun með fljótandi fötuplöntuáburði á tímabilinu maí til september með fjögurra vikna millibili. Trén sem hafa verið gróðursett þola líka þurrkatímabil - en það er betra að vökva þau mikið tvisvar í viku á hlýju tímabili. Snyrting er ekki nauðsynleg en hægt er að gera það árlega í mars til að stjórna krónustærð og greiningu. Mýrber setja ávöxt á bæði ungan og gamlan við. **Á veturna:** Hvíti mórberið er talið harðgert allt niður í að minnsta kosti -20 °Celsíus og vitað er að tré sem gróðursett hafa verið hafa lifað af enn lægri hitastig. Hins vegar þurfa tré sem geymd eru í pottum vetrarvernd eða svalan stað til að yfirvetra, sem getur líka verið dökkt þar sem tréð fellir lauf á veturna.



Moro bianco
Morus alba
More bianche dolci come lo zucchero - resistente al freddo fino a - 20° C

Le foglie del Gelso bianco sempreverde servono ai bachi da seta come alimento nella produzione indiana della seta. Le foglie dello stesso albero sono poliformi, variando da una forma a bordo liscio a una dattiliforme o con una profonda incisione. Il suo nome deriva dai germogli bianchi che compaiono in maggio e giugno e dai frutti bianchi, che possono colorarsi di rosso se esposti al sole forte. Già gli alberi giovani possono produrre grando quantità di frutti succosi e dolci come lo zucchero. L'albero è resistente al freddo e si può coltivare facilmente sia trapiantato che in vaso, può essere modellato potandolo, addirittura come variante del salice con rami pendenti a forma di ombrello. **Posizione naturale**: Il gelso bianco è endemico della regione cinese di Manciuria. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Distribuite i semi sulla terra di coltivo umida e copriteli solo un po' con il substrato. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura diurna fra i 20° e i 25° C e notturna fra i 5° e i 10° C, mantenete la terra umida, ma non bagnata. La germinazione avviene da due a cinque settimane dopo. **La posizione migliore:** Il Gelso bianco predilige gli ambienti soleggiati e caldi, ma al riparo dal vento. **Cura ottimale:** Il Gelso bianco è davvero facile da curare. Nei primi anni di vita può essere coltivato bene anche in vaso, ma nei mesi estivi ha bisogno di innaffiature più abbondanti senza ristagni idrici e, fra maggio e settembre, di una concimazione ogni quattro settimane con fertilizzante liquido per piante da vaso. Gli alberi trapiantati sopportano anche periodi di siccità, ma è preferibile comunque innaffiarli abbondantemente due volte alla settimana nei periodi caldi dell'anno. La potatura non è strettamente necessaria ma, se volete effettuarla, è meglio una volta all'anno in marzo, per regolare le dimensioni della chioma e la ramificazione. Il Gelso bianco produce frutti sia come pianta giovane che invecchiato. **In inverno:** Il Gelso bianco resiste a temperature fino a - 20° C ed è noto che gli alberi trapiantati possono sopravvivere anche a temperature più basse. Gli alberi coltivati in vaso hanno bisogno però di svernare al riparo dal vento e in un luogo fresco, che può essere anche scuro, poiché in inverno l'albero perde il suo fogliame.



Stablo bijelog duda
Morus alba
Bijele bobice slatke poput šećera - otporne na -20°C

Lišće listopadnog bijelog duda služi kao hrana za svilene bube u indijskoj proizvodnji svile. Listovi istog stabla mogu varirati od glatkih rubova do duboko prstastih i duboko rasječenih. Ime duguje bijelim pupoljcima koji se pojavljuju u svibnju i lipnju te bijelim plodovima koji na jakom suncu mogu pocrvenjeti. Čak i mlada stabla mogu roditi obilne količine sočnog voća slatkog poput šećera.Drvo je otporno i lako se uzgaja kako na otvorenom tako iu kanti i oblikuje orezivanjem - moguće su čak i vrbolike varijante s višobranastim visećim granama. **Zemlja porijekla**: Drvo bijelog duda porijeklom je iz Mandžurije u Kini. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Sjeme pospite po vlažnom supstratu za uzgoj i samo ga tanko prekrijte supstratom. Posudu s kulturom prekrijte prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Klijanje obično nastupa nakon dva do pet tjedana. **Najbolja lokacija:** Stabla murve vole sunčana i topla mjesta, ali vole biti zaštićena od vjetra. **Optimalna njega:** Vaše stablo murve iznimno je lako njegovati. Prvih nekoliko godina može se držati i u kanti, no tada, osobito tijekom ljetnih mjeseci, potrebno ju je obilno zalijevati bez nataloženja i prihranjivati tekućim gnojivom iz kante između svibnja i rujna u razmacima od četiri tjedna. Zasađena stabla također mogu podnijeti sušna razdoblja - ali bolje ih je obilno zalijevati dva puta tjedno u toploj sezoni. Rezidba nije neophodna, ali se može obavljati jednom godišnje u ožujku kako bi se kontrolirala veličina krošnje i grananje. Dudovi zasnuju plodove i na mladom i na starom drvetu. **U zimi:** Smatra se da je bijeli dud otporan do najmanje -20 °C, a poznato je da su stabla posađena izvana preživjela i niže temperature. Međutim, stabla koja se drže u posudama potrebna je zimska zaštita ili hladno mjesto za prezimljavanje, koje može biti i tamno, jer stablo zimi odbacuje lišće.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Baltais zīdkoks
Morus alba
Cukursaldās baltās ogas – izturīgas līdz -20°C

Lapkoku baltā zīdkoka lapas kalpo kā barības koki zīdtārpiņiem Indijas zīda ražošanā. Viena un tā paša koka lapas var atšķirties no gludām malām līdz dziļi pirkstveida un dziļi sadalītām. Savu nosaukumu tas ir parādā saviem baltajiem pumpuriem, kas parādās maijā un jūnijā, un baltajiem augļiem, kas spēcīgā saulē var arī kļūt sarkanīgi. Pat jauni koki var nest lielu daudzumu sulīgo, saldo augļu.Koks ir izturīgs un viegli audzējams gan ārā, gan spainī un veido apgriežot - iespējami pat vītolveidīgi varianti ar lietussarga formas nokareniem zariem. **Dabiska vieta**: Baltā zīdkoka dzimtene sākotnēji ir Mandžūrija Ķīnā. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām telpās ir iespējama visu gadu. Izkaisiet sēklas uz mitra augšanas substrāta un tikai plānā kārtā pārklājiet ar substrātu. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Dīgšana parasti notiek pēc divām līdz piecām nedēļām. **Labākā atrašanās vieta:** Zīdkokiem patīk saulainas un siltas vietas, taču viņiem patīk būt pasargātiem no vēja. **Optimāla aprūpe:** Jūsu zīdkoka kopšana ir ļoti vienkārša. Pirmajos gados to var turēt arī spainī, bet pēc tam, īpaši vasaras mēnešos, to vajag bagātīgi laistīt bez aizsērēšanas un mēslot ar šķidro spainveida augu mēslojumu no maija līdz septembrim ar četru nedēļu intervālu. Arī stādītie koki pacieš sausuma periodus – taču labāk tos siltajā sezonā divreiz nedēļā bagātīgi laistīt. Atzarošana nav būtiska, bet to var veikt katru gadu martā, lai kontrolētu vainaga izmēru un zarošanos. Zīdkoki nes augļus gan jaunai, gan vecai koksnei. **Ziemā:** Baltais zīdkoks tiek uzskatīts par izturīgu vismaz līdz -20 °C, un zināms, ka iestādītie koki ir izturējuši vēl zemāku temperatūru. Taču podos turētiem kokiem ir nepieciešama ziemas aizsardzība vai vēsa ziemošanas vieta, kas var būt arī tumša, jo koks ziemā nomet lapas.



Baltasis šilkmedis
Morus alba
Saldžios cukringos baltos uogos – atsparios iki -20°C

Lapuočių baltojo šilkmedžio lapai yra maisto medžiai šilkaverpiams Indijos šilko gamyboje. To paties medžio lapai gali skirtis nuo lygių kraštų iki giliai piršto formos ir giliai išpjaustytų. Savo vardą jis skolingas dėl baltų pumpurų, kurie pasirodo gegužę ir birželį, ir baltiems vaisiams, kurie ryškioje saulėje taip pat gali parausti. Netgi jauni medžiai gali duoti daug sultingų, cukrumi saldžių vaisių.Medis ištvermingas ir lengvai auginamas tiek lauke, tiek kibire ir formuojamas genint – galimi net gluosnį primenantys variantai su skėčio formos kabančiomis šakomis. **Natūrali vieta**: Baltasis šilkmedis iš pradžių kilęs iš Mandžiūrijos Kinijoje. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų patalpose galima ištisus metus. Išbarstykite sėklas ant drėgno auginimo substrato ir tik plonai uždenkite substratu. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Paprastai sudygsta po dviejų ar penkių savaičių. **Geriausia vieta:** Šilkmedžiai mėgsta saulėtas ir šiltas vietas, tačiau mėgsta būti apsaugoti nuo vėjo. **Optimali priežiūra:** Jūsų šilkmedžio priežiūra yra labai paprasta. Pirmuosius kelerius metus jį galima laikyti ir kibire, tačiau vėliau, ypač vasaros mėnesiais, reikia gausiai laistyti, neužmirkus, ir nuo gegužės iki rugsėjo kas keturias savaites tręšti skystomis kibiro augalų trąšomis. Pasodinti medžiai taip pat ištveria sausros periodus – tačiau šiltuoju metų laiku geriau juos gausiai laistyti du kartus per savaitę. Genėjimas nėra būtinas, tačiau jį galima atlikti kasmet kovo mėnesį, kad būtų galima kontroliuoti vainiko dydį ir šakotumą. Šilkmedžiai duoda vaisių tiek ant jaunos, tiek ant senos medienos. **Žiemą:** Baltasis šilkmedis laikomas ištvermingu iki -20 °C ir žinoma, kad išsodinti medžiai išgyveno ir žemesnę temperatūrą. Tačiau vazonuose laikomiems medžiams reikia žiemos apsaugos arba vėsios žiemojimo vietos, kuri taip pat gali būti tamsi, nes žiemą medis meta lapus.



Siġra taċ-ċawsli abjad
Morus alba
Berries bojod ħelu zokkor - Hardy sa -20 ° Celsius

Il-weraq taċ-ċawsli abjad jwaqqgħu l-weraq iservu bħala siġar tal-ikel għad-dud tal-ħarir fil-produzzjoni tal-ħarir Indjan. Il-weraq tal-istess siġra jistgħu jvarjaw minn defer lixx għal forma ta 'saba' fil-fond u mqassma fil-fond. Ismu għandu l-blanzuni bojod tiegħu, li jidhru f'Mejju u Ġunju, u l-frott abjad, li jista' wkoll isir ħamrani f'xemx qawwija. Anki siġar żgħar jistgħu jġorru ammonti kbar tal-frott mmerraq u ħelu biż-zokkor.Is-siġra hija reżistenti u faċli biex tikber kemm barra kif ukoll f'barmil u forma biż-żbir - anke varjanti bħal żafżafa b'fergħat imdendlin f'forma ta 'umbrella huma possibbli. **Post naturali**: Is-siġra taċ-ċawsli bajda hija oriġinarjament indiġena għall-Manchuria fiċ-Ċina. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żrieragħ ġewwa huwa possibbli s-sena kollha. Ferrex iż-żrieragħ fuq sottostrat ta 'tkabbir niedi u għattihom biss irqiq bis-sottostrat. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovdi b'toqob. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxef. Għandek tneħħi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post ħafif u sħun b'20 sa 25 ° Celsius u żomm il-ħamrija tal-qsari niedja iżda mhux imxarrba. Il-ġerminazzjoni ġeneralment isseħħ wara ġimagħtejn sa ħames ġimgħat. **L-aħjar post:** Is-siġar taċ-ċawsli jħobbu postijiet xemxija u sħan, iżda jixtiequ jkunu protetti mir-riħ. **Kura ottimali:** Is-siġra taċ-ċawsli tiegħek hija estremament faċli biex tieħu ħsiebha. Fl-ewwel ftit snin, jista 'jinżamm ukoll f'barmil, iżda mbagħad, speċjalment matul ix-xhur tas-sajf, jeħtieġ ħafna tisqija mingħajr ilma u fertilizzazzjoni b'fertilizzant likwidu tal-pjanti tal-barmil bejn Mejju u Settembru f'intervalli ta' erba 'ġimgħat. Siġar li tħawlu jistgħu wkoll jittolleraw perjodi ta 'nixfa - iżda huwa aħjar li tisqija b'mod estensiv darbtejn fil-ġimgħa fl-istaġun sħun. Iż-żbir mhuwiex essenzjali iżda jista' jsir kull sena f'Marzu biex jiġi kkontrollat id-daqs tal-kuruna u l-fergħat. Ċawsli jpoġġi frott kemm fuq injam żgħir kif ukoll anzjan. **Fix-xitwa:** Iċ-ċawsli abjad huwa meqjus li jifilħu sa mill-inqas -20 °Celsius u huwa magħruf li s-siġar imħawla baqgħu ħajjin f'temperaturi saħansitra aktar baxxi. Madankollu, is-siġar miżmuma fil-qsari jeħtieġu protezzjoni tax-xitwa jew post frisk għax-xitwa, li jista 'jkun ukoll skur, peress li s-siġra titfa' l-weraq tagħha fix-xitwa.



Witte Moerbeiboom
Morus alba
Suikerzoete witte bessen - winterhard tot -20 ° Celsius

De bladeren van de bladverliezende witte moerbei dienen als voederbomen voor de zijderupsen bij de Indiase zijdeproductie. De bladeren van dezelfde boom kunnen variëren van gladgerand tot diep vingervormig en diep ingesneden. Het dankt zijn naam aan zijn witte knoppen, die verschijnen in mei en juni, en de witte vruchten, die echter roodachtig kunnen worden in de felle zon. Zelfs jonge bomen kunnen overvloedige hoeveelheden van het sappige, suikerzoete fruit produceren. De boom is goed winterhard en kan gemakkelijk in een emmer worden geplant of bewaard en door snoei in vorm te worden gebracht - zelfs wilgachtige varianten met parapluvormige takken zijn mogelijk. **Natuurlijke locatie**: De witte moerbeiboom komt oorspronkelijk uit Mantsjoerije, China. **Succesvolle teelt:** Binnen kweken uit zaden is het hele jaar mogelijk. Strooi de zaden op een vochtig groeimedium en bedek ze slechts dun met het substraat. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet het kweekvat op een lichte en warme plaats met 20 tot 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Kieming vindt meestal plaats na twee tot vijf weken. **De beste locatie:** Moerbeibomen houden van zonnige en warme locaties, maar staan graag een beetje beschut tegen de wind. **Optimale verzorging:** Uw moerbeiboom is buitengewoon gemakkelijk te verzorgen. De eerste jaren kan hij ook goed in de emmer worden gehouden, maar dan, vooral tijdens de zomermaanden, heeft hij tussen mei en september elke vier weken veel water nodig zonder wateroverlast en bemesting met vloeibare emmerplantenbemesting. Ook geplante bomen kunnen droge periodes aan, maar in het warme seizoen is het beter om ze twee keer per week flink water te geven. Snoeien is niet absoluut noodzakelijk, maar kan jaarlijks in maart worden gedaan om de kroongrootte en vertakking te beheersen. Moerbeibomen verbouwen fruit op zowel jong als oud hout. **In de winter:** De witte moerbeiboom wordt beschouwd als winterhard tot minimaal -20 ° Celsius en het is bekend dat geplante bomen zelfs lagere temperaturen hebben overleefd. Bomen die in de emmer worden bewaard, hebben winterbescherming nodig of een koele plaats om te overwinteren, die ook donker kan zijn, aangezien de boom in de winter zijn bladeren laat vallen.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Hvitt morbærtre

Morus alba

Sukkersøte hvite bær - Hardføre til -20° Celsius

Bladene til den løvfellende hvite morbæren tjener som mattrær for silkeormene i indisk silkeproduksjon. Bladene til det samme treet kan variere fra glattkantet til dypt fingerformet og dypt dissekert. Navnet skylder den sine hvite knopper, som dukker opp i mai og juni, og de hvite fruktene, som også kan bli rødlige i sterkt solskinn. Selv unge trær kan bære store mengder av den saftige, sukkersøte frukten.Treet er hardfør og lett å dyrke både utendørs og i bøtte og form ved beskjæring - selv pillignende varianter med paraplyformede hengende greiner er mulig. **Naturlig beliggenhet**: Det hvite morbærtreet er opprinnelig hjemmehørende i Manchuria i Kina. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. Spred frøene på fuktig voksende substrat og dekk dem bare tynt med substratet. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Spiring skjer vanligvis etter to til fem uker. **Den beste beliggenheten:** Morbærtrær elsker solrike og varme steder, men liker å bli beskyttet mot vinden. **Optimal omsorg:** Morbærtreet ditt er ekstremt enkelt å ta vare på. De første årene kan den også oppbevares i bøtte, men da, spesielt i sommermånedene, trenger den rikelig med vanning uten vanning og gjødsling med flytende bøtteplantegjødsel mellom mai og september med fire ukers mellomrom. Trær som er plantet tåler også tørkeperioder – men det er bedre å vanne dem mye to ganger i uken i den varme årstiden. Beskjæring er ikke avgjørende, men kan gjøres årlig i mars for å kontrollere kronestørrelse og forgrening. Morbær setter frukt på både ung og gammel ved. **Om vinteren:** Den hvite morbæren anses å være hardfør ned til minst -20 °C, og det er kjent at trær plantet ut har overlevd enda lavere temperaturer. Imidlertid trenger trær som holdes i potter vinterbeskyttelse eller et kjølig sted å overvintre, som også kan være mørkt, siden treet feller bladene om vinteren.



Drzewo Morwy Białej

Morus alba

Jagody białe, słodkie jak cukier - wytrzymałe do -20 ° C

Liście morwy białej liściastej stanowią pożywienie dla jedwabników w indyjskiej produkcji jedwabiu i mają różne kształty, od wyraźnych krawędzi po głęboko wycięte w kształcie palców. Jej nazwa pochodzi od białych pąków i białych owoców, które roślina produkuje w maju i czerwcu, chociaż przy silnym nasłonecznieniu owoce mogą przybrać czerwonawy kolor. Nawet młode rośliny mogą wyhodować obfite ilości słodkich i soczystych owoców. Biała morwa jest odporna na mróz i może być sadzona na zewnątrz lub uprawiana jako roślina doniczkowa. Możesz łatwo przyciąć drzewo według własnych upodobań, możliwe są nawet formy przypominające wierzbę z wiszącymi gałęziami w kształcie parasola. **Naturalne położenie**: Morwa biała ma swoje naturalne siedlisko w regionie Mandżurii w Chinach. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Rozłóż nasiona na wilgotnym kompoście doniczkowym i umieść na nim niewielką ilość ziemi kompostowej. Następnie przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby ziemia nie wyschła. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmować ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° do 25 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Zwykle kiełkowanie trwa od dwóch do sześciu tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Morwa Biała preferuje miejsca słoneczne i ciepłe, najlepiej w miejscach lekko osłoniętych od wiatru. **Optymalna pielęgnacja:** Biała morwa jest raczej beztroska. W pierwszych latach może być trzymana w wannie, gdzie szczególnie latem potrzebuje odpowiedniego podlewania bez podlewania, a także nawozu płynnego dla roślin doniczkowych raz w miesiącu od maja do września. Rośliny zewnętrzne mogą wytrzymać okres suszy, ale w gorącym sezonie lepiej jest dokładnie podlewać roślinę dwa razy w tygodniu. Cięcie zwykle nie jest konieczne, ale można to zrobić raz w roku w marcu, aby uzyskać pożądany kształt i rozgałęzienie korony. Morwa Biała wydaje owoce na nowych i starych gałęziach. **W zimę:** Morwa biała jest odporna na mróz co najmniej do -20 ° Celsjusza, a znane są przypadki, w których rośliny zewnętrzne przetrwały jeszcze niższe temperatury. Rośliny doniczkowe wymagają jednak ochrony przed mrozem lub chłodnego i jeszcze ciemniejszego pomieszczenia do hibernacji, ponieważ drzewo będzie rzucać liście zimą.



Amoreira branca

Morus alba

Bagas brancas açucaradas - Resistente a -20° Celsius

As folhas da amoreira branca decídua servem como árvores de alimento para os bichos-da-seda na produção de seda indiana. As folhas da mesma árvore podem variar de bordas lisas a profundamente em forma de dedo e profundamente dissecadas. Deve seu nome aos botões brancos, que aparecem em maio e junho, e aos frutos brancos, que também podem ficar avermelhados sob o sol forte. Mesmo as árvores jovens podem produzir grandes quantidades da fruta suculenta e açucarada.A árvore é resistente e fácil de crescer ao ar livre e em um balde e poda - até mesmo variantes semelhantes a salgueiro com galhos pendurados em forma de guarda-chuva são possíveis. **Localização natural**: A amoreira branca é originalmente nativa da Manchúria, na China. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Espalhe as sementes no substrato de cultivo úmido e cubra-as apenas com o substrato. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 ° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. A germinação geralmente ocorre após duas a cinco semanas. **A melhor localização:** As amoreiras adoram locais ensolarados e quentes, mas gostam de ser protegidas do vento. **Cuidado ideal:** Sua amoreira é extremamente fácil de cuidar. Nos primeiros anos, também pode ser mantida em balde, mas depois, principalmente nos meses de verão, precisa de bastante rega sem encharcamento e fertilização com fertilizante líquido para plantas em balde entre maio e setembro em intervalos de quatro semanas. As árvores que foram plantadas também podem tolerar períodos de seca - mas é melhor regá-las abundantemente duas vezes por semana na estação quente. A poda não é essencial, mas pode ser feita anualmente em março para controlar o tamanho da copa e a ramificação. As amoras frutificam tanto em madeira nova como velha. **No inverno:** A amoreira branca é considerada resistente até pelo menos -20 °Celsius e sabe-se que as árvores plantadas sobreviveram a temperaturas ainda mais baixas. No entanto, as árvores mantidas em vasos precisam de proteção no inverno ou de um local fresco para hibernar, que também pode ser escuro, pois a árvore perde as folhas no inverno.



Dull Alb

Morus alba

Boabe albe dulci de zahăr - rezistente la -20 ° Celsius

Frunzele dudului alb de foioase servesc drept copaci furajeri pentru viermii de mătase din producția de mătase indiană. Frunzele aceluiași copac pot varia de la margini netede până la adânc în formă de deget și adânc incizate. Își datorează numele mugurilor săi albi, care apar în mai și iunie, și fructelor albe, care, totuși, pot deveni roșiatice la soare puternic. Chiar și copacii tineri pot produce cantități abundente de fructe suculente, dulci cu zahăr. Arborele este rezistent și poate fi plantat cu ușurință sau păstrat în găleată și modelat prin tăiere - sunt posibile chiar și variante în formă de salcie cu ramuri în formă de umbrelă. **Locație naturală**: Dullul alb este originar din Manchuria, China. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Împrăștiați semințele pe un mediu de creștere umed și acoperiți-le doar subțire cu substratul. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mucegaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Germinarea are loc de obicei după două până la cinci săptămâni. **Cea mai bună locație:** Dudii adoră locațiile însorite și calde, dar le place să fie puțin la adăpost de vânt. **Îngrijire optimă:** Arborele dvs. de dud este extrem de ușor de îngrijit. În primii câțiva ani poate fi păstrat și bine în găleată, dar apoi, mai ales în lunile de vară, necesită o udare abundentă fără îndesare și fertilizare cu îngrășământ pentru plante în containere lichide între mai și septembrie la fiecare patru săptămâni. Copacii care au fost plantați pot face față și perioadelor uscate - dar este mai bine să le udați de două ori pe săptămână în timpul sezonului cald. Tunderea nu este absolut necesară, dar se poate face anual în martie pentru a controla dimensiunea coroanei și ramificarea. Dudele cultivă fructe atât pe lemn tânăr, cât și pe lemn vechi. **În iarnă:** Dutul alb este considerat a fi rezistent la cel puțin -20 ° Celsius și se știe că copacii plantați au supraviețuit temperaturilor chiar mai scăzute. Copacii păstrați în găleată au nevoie de protecție pentru iarnă sau de un loc răcoros pentru a ierni, care poate fi și întunecat, deoarece copacul își varsă frunzele în timpul iernii.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Vitt Mullbärsträd

Morus alba

Sockersöta vita bär - hårda till -20 ° Celsius

Bladen av lövvita mullbärsträd fungerar som foderträd för silkesmaskarna i indisk sidenproduktion. Bladen av samma träd kan variera från slätkant till djupt fingerformad och djupt snittad. Det har sitt namn tack vare sina vita knoppar, som dyker upp i maj och juni, och de vita frukterna, som dock kan bli rödaktiga i stark sol. Även unga träd kan producera rikliga mängder av den saftiga, sockersöta frukten. Trädet är härdat och kan enkelt planteras ut eller förvaras i skopan och formas genom beskärning - även pilliknande varianter med paraplyformade grenar är möjliga. **Naturligt läge**: Det vita mullbärsträdet är ursprungligen infödd i Manchuria, Kina. **Framgångsrik odling:** Att odla från frön inomhus är möjligt året runt. Sprid fröna på ett fuktigt odlingsmedium och täck dem bara tunt med substratet. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en lätt och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Spiring tar vanligtvis två till fem veckor. **Den bästa platsen:** Mullbärsträd älskar soliga och varma platser, men gillar att vara lite skyddade från vinden. **Optimal vård:** Ditt mullbärsträd är extremt lätt att sköta. Under de första åren kan den också hållas bra i skopan, men då, speciellt under sommarmånaderna, kräver det mycket vattning utan vattendränkning och gödsling med flytande gödselmedel i vätskebehållare mellan maj och september var fjärde vecka. Träd som planteras ut kan också klara torra perioder - men det är bättre att vattna dem mycket två gånger i veckan under den varma årstiden. Beskärning är inte absolut nödvändigt, men kan göras årligen i mars för att kontrollera kronstorlek och förgrening. Mullbär odlar frukt på både ungt och gammalt trä. **På vintern:** Det vita mullbäret anses vara tåligt till minst -20 ° C och det är känt att planterade träd har överlevt ännu lägre temperaturer. Träd som hålls i skopan behöver vinterskydd eller en sval plats att övervintra, vilket också kan vara mörkt eftersom trädet tappar sina löv på vintern.



Biely strom moruše

Morus alba

Cukorovo-sladké biele bobule - mrazuvzdorné do -20° Celzia

Listy opadavej moruše bielej slúžia ako potravné stromy pre priadky morušovej pri výrobe hodvábu v Indii. Listy toho istého stromu sa môžu líšiť od hladkých až po hlboko v tvare prstov a hlboko rozrezané. Za svoj názov vďačí svojim bielym pukom, ktoré sa objavujú v máji a júni, a bielym plodom, ktoré sa pri silnom slnku môžu sfarbiť aj do červenka. Dokonca aj mladé stromy znesú veľké množstvo šťavnatého, sladkého ovocia.Strom je odolný a nenáročný na pestovanie vonku aj vo vedre a tvaruje sa rezom - možné sú aj varianty podobné vŕbe s dáždnikovými visiacimi konármi. **Prirodzená poloha**: Moruša biela pochádza pôvodne z Mandžuska v Číne. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Semená rozsypte na vlhký pestovateľský substrát a substrátom ich prikryte len tenko. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 °C a udržujte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrú. Klíčenie zvyčajne nastáva po dvoch až piatich týždňoch. **Najlepšie umiestnenie:** Moruše milujú slnečné a teplé polohy, ale radi sú chránené pred vetrom. **Optimálna starostlivosť:** Váš strom moruše je mimoriadne nenáročný na starostlivosť. V prvých rokoch sa dá chovať aj vo vedre, ale potom, najmä počas letných mesiacov, potrebuje výdatnú zálievku bez podmáčania a prihnojovanie tekutým vedrovým hnojivom na rastliny od mája do septembra v štvortýždňových intervaloch. Vysadené stromy znesú aj obdobia sucha – v teplom období je však lepšie dvakrát týždenne ich výdatne zalievať. Prerezávanie nie je nevyhnutné, ale môže sa vykonávať každoročne v marci, aby sa kontrolovala veľkosť koruny a vetvenie. Moruše prinášajú ovocie na mladom aj starom dreve. **V zime:** Moruša biela sa považuje za mrazuvzdornú do minimálne -20 °C a je známe, že vysadené stromy prežili aj nižšie teploty. Stromy chované v kvetináčoch však potrebujú zimnú ochranu alebo chladné miesto na prezimovanie, ktoré môže byť aj tmavé, keďže strom v zime zhadzuje listy.



Bela murva

Morus alba

Sladkorne bele jagode - Odporne na -20°C

Listi listopadne bele murve služijo kot hrana za sviloprejke v indijski proizvodnji svile. Listi istega drevesa se lahko razlikujejo od gladkih robov do globoko prstastih in globoko razrezanih. Ime ima zaradi belih popkov, ki se pojavijo maja in junija, ter belih plodov, ki se ob močnem soncu lahko obarvajo tudi rdečkasto. Celo mlada drevesa lahko obrodijo obilo sočnih, sladkorno sladkih sadežev.Drevo je trdoživo in ga je enostavno gojiti tako na prostem kot v vedru in oblikovati z obrezovanjem - možne so tudi vrbolike variante z dežnikasto visečimi vejami. **Naravni habitat**: Bela murva izvira iz Mandžurije na Kitajskem. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Semena raztresemo po vlažnem rastnem substratu in jih le na tanko prekrijemo s substratom. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 °C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Kaljenje običajno nastopi po dveh do petih tednih. **Najboljša lokacija:** Murve obožujejo sončne in tople lege, a rade zaščitene pred vetrom. **Optimalna nega:** Za vašo murvo je izjemno enostavno skrbeti. V prvih nekaj letih ga lahko hranimo tudi v vedru, potem pa, zlasti v poletnih mesecih, potrebujemo obilno zalivanje brez namakanja in gnojenje s tekočim gnojilom iz vedra med majem in septembrom v štiritedenskih presledkih. Posajena drevesa lahko prenesejo tudi sušna obdobja - vendar jih je v topli sezoni bolje obilno zalivati dvakrat na teden. Obrezovanje ni nujno, lahko pa ga opravite vsako leto marca, da nadzorujete velikost krošnje in razvejanost. Murve sadijo tako na mladem kot starem lesu. **V zimskem času:** Bela murva velja za odporno vsaj do -20 °C, znano pa je, da posajena drevesa preživijo tudi nižje temperature. Drevesa v loncih pa potrebujejo zimsko zaščito ali hladen prostor za prezimovanje, ki je lahko tudi temen, saj drevo pozimi odvrže liste.



Morera blanca

Morus alba

Bayas blancas dulces como miel - Resistente al invierno hasta -20 grados

Las hojas de la morera sirven a los gusanos de seda en la producción de seda india, como árboles forrajeros. Las hojas de este árbol pueden variar desde bordes totalmente planos, ondulados, hasta con incisiones profundas. Su nombre, morera blanca, la obtiene a raíz de sus capullos y frutos blancos que nacen en mayo y junio. Con mucho sol pueden cambiar de color a un rojizo. Incluso los árboles jóvenes pueden alcanzar buenas cantidades de esta fruta jugosa y dulce. Este árbol es resistente al invierno y puede ser plantado o cultivado en maceteros fácilmente. A través de la poda se pueden lograr unas ramas caídas en forma de paraguas. **Ubicación natural**: La morera blanca es originariamente de Manchuria en China. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Esparza las semillas sobre sustrato húmedo y cúbralas con un poco del mismo sustrato. Cubra el recipiente con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido con entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación se producirá después de dos a cinco semanas. **La mejor ubicación:** La morera ama lugares soleados y cálidos, y prefiere zonas protegidas del viento. **Cuidado óptimo:** Su morera es de fácil cuidado. Durante los primeros años puede permanecer perfectamente en una maceta, pero necesitará, sobre todo durante los meses de verano, abundante agua sin anegamiento y una nutrición con fertilizante líquido para plantas en maceta, desde mayo a septiembre, con intervalos de cuatro semanas. Los árboles plantados aguantan también periodos secos, pero es mejor regarlos con abundancia cada dos semanas durante la época del año más calurosa. No es necesaria la poda, pero se puede realizar anualmente en marzo para controlar el crecimiento de la corona y las ramas. La morera da frutos tanto en arboles jóvenes como maduros. **En el invierno:** La morera es tolerante al invierno hasta temperaturas de -20 grados, los árboles plantados incluso toleran temperaturas inferiores. Los árboles en maceta requieren de una protección contra el invierno o un sitio seco para invernar, que puede ser oscuro, ya que el árbol pierde su follaje en inverno.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Bílý strom moruše

Morus alba

Cukrově sladké bílé bobule - Mrazuvzdorné do -20° Celsia

Listy opadavé moruše bílé slouží jako potravní stromy pro bource morušového při výrobě indického hedvábí. Listy stejného stromu se mohou lišit od hladkých po hluboce prstovité a hluboce členité. Za svůj název vděčí svým bílým poupatům, která se objevují v květnu a červnu, a bílým plodům, které se při silném slunci mohou také zbarvit do červena. Dokonce i mladé stromy mohou nést velké množství šťavnatého, sladkého ovoce.Strom je odolný a nenáročný na pěstování venku i v kbelíku a tvarování řezem - možné jsou i vrbovité varianty s deštníkovitě visícími větvemi. **Přirozená poloha**: Morušovník bílý pochází původně z Mandžuska v Číně. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semínek v interiéru je možné po celý rok. Semena rozsypte na vlhký pěstební substrát a substrátem je pouze tence zakryjte. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Klíčení obvykle nastává po dvou až pěti týdnech. **Nejlepší umístění:** Moruše milují slunné a teplé polohy, ale rády jsou chráněny před větrem. **Optimální péče:** Péče o váš moruše je velmi snadná. V prvních letech se dá chovat i v kbelíku, ale pak, zejména v letních měsících, potřebuje vydatnou zálivku bez přemokření a přihnojování tekutým kbelíkovým rostlinným hnojivem mezi květnem a zářím ve čtyřtýdenních intervalech. Vysazené stromy snesou i období sucha – v teplém období je však lepší dvakrát týdně vydatně zalévat. Řez není nezbytný, ale lze jej provádět každý rok v březnu, aby se kontrolovala velikost koruny a větvení. Moruše plodí na mladém i starém dřevě. **V zimě:** Moruše bílá je považována za mrazuvzdornou minimálně do -20 °C a je známo, že vysazené stromy přežily i nižší teploty. Stromy chované v květináčích však potřebují zimní ochranu nebo chladné místo k přezimování, které může být i tmavé, protože strom v zimě shazuje listy.



Beyaz dut ağacı

Morus alba

Şeker-tatlı beyaz meyveler - -20°C'ye dayanıklı

Yaprak döken beyaz dutun yaprakları, Hint ipek üretiminde ipekböcekleri için besin ağacı görevi görür. Aynı ağacın yaprakları düz kenarlıdan derin parmak şekline ve derin disseke olabilir. Adını mayıs ve haziran aylarında açan beyaz tomurcukları ve kuvvetli güneş ışığında kırmızımsı renge dönüşebilen beyaz meyvelerinden alır. Genç ağaçlar bile bol miktarda sulu, şekerli meyve verebilir.Ağaç dayanıklıdır ve hem açık havada hem de bir kovada büyümesi ve budayarak şekil vermesi kolaydır - şemsiye şeklinde asılı dalları olan söğüt benzeri varyantlar bile mümkündür. **Doğal konum**: Beyaz dut ağacı aslen Çin'deki Mançurya'ya özgüdür. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyümek tüm yıl boyunca mümkündür. Tohumları nemli büyüyen alt tabakaya dağıtın ve alt tabaka ile sadece ince bir şekilde örtün. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum saksısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Çimlenme genellikle iki ila beş hafta sonra gerçekleşir. **En iyi konum:** Dut ağaçları güneşli ve sıcak yerleri sever ama rüzgardan korunmayı da severler. **Optimum bakım:** Dut ağacınızın bakımı son derece kolaydır. İlk birkaç yıl kovada da tutulabilir ancak daha sonra özellikle yaz aylarında su bastırmadan bol sulamaya ve Mayıs-Eylül ayları arasında dört haftalık aralıklarla sıvı kova bitki gübresi ile gübrelemeye ihtiyaç duyar. Dikilen ağaçlar kuraklık dönemlerini de tolere edebilir - ancak ılık mevsimde haftada iki kez yoğun bir şekilde sulamak daha iyidir. Budama zorunlu değildir ancak taç boyutunu ve dallanmayı kontrol etmek için her yıl Mart ayında yapılabilir. Dutlar hem genç hem de yaşlı ahşaba meyve verir. **Kışın:** Beyaz dutun en az -20 °C'ye kadar dayanıklı olduğu kabul edilir ve dikilen ağaçların daha düşük sıcaklıklara bile dayandığı bilinmektedir. Bununla birlikte, saksılarda tutulan ağaçların kış korumasına veya kışın yapraklarını döktüğü için karanlık da olabilen serin bir yere ihtiyacı vardır.



Fehér eperfa

Morus alba

Cukorédes fehér bogyós gyümölcsök - -20°C-ig ellenálló

A lombhullató fehér eperfa levelei a selyemhernyók táplálékfáiként szolgálnak az indiai selyemtermelésben. Ugyanannak a fának a levelei a sima szélűtől a mélyen ujj alakúakig és mélyen boncoltakig változhatnak. Nevét a májusban és júniusban megjelenő fehér bimbóinak, valamint a fehér terméseknek köszönheti, amelyek erős napsütésben is vörösesek lehetnek. Még a fiatal fák is bőséges mennyiségű lédús, cukorédes gyümölcsöt hozhatnak.A fa strapabíró és könnyen termeszthető mind a szabadban, mind a vödörben, és metszéssel formázható - akár fűzszerű változatok is lehetségesek esernyő alakú függőágakkal. **Természetes elhelyezkedés**: A fehér eperfa eredetileg Kínában, Mandzsúriában őshonos. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. Szórja ki a magokat a nedves termesztőfelületre, és csak vékonyan takarja be őket az aljzattal. Fedje le a tenyészedényt ragasztófóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. A csírázás általában két-öt hét után következik be. **A legjobb hely:** Az eperfák szeretik a napos és meleg helyeket, de szeretik, ha megvédik őket a széltől. **Optimális gondozás:** Az eperfa gondozása rendkívül egyszerű. Az első években vödörben is tartható, de ekkor, főleg a nyári hónapokban, bőséges öntözésre van szüksége vizesedés nélkül, és május és szeptember között négyhetes időközönként folyékony vödör növényi műtrágyával trágyázni. Az elültetett fák a száraz időszakokat is elviselik – de jobb, ha a meleg évszakban hetente kétszer bőven öntözi őket. A metszés nem elengedhetetlen, de évente márciusban elvégezhető a korona méretének és elágazásának szabályozása érdekében. Az eperfa fiatal és öreg fán egyaránt termést hoz. **Télen:** A fehér eperfa legalább -20 °C-ig szívósnak számít, és ismert, hogy a kiültetett fák még alacsonyabb hőmérsékletet is túléltek. A cserépben tartott fáknak azonban téli védelemre vagy hűvös áttelelésre van szükségük, ami sötét is lehet, hiszen a fa télen lehullatja a leveleit.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved

クワ

Morus alba

白く甘いベリー　-　マイナス20℃の耐寒性

落葉樹のこの葉は、インドシルクの製造において蚕の食糧となります。また葉は端からくっきり深く切れみが入り手の指のような形をしています。名称は5月と6月に形成する白い芽と果実に由来します。また果実は強い日差しで赤みを帯びることがあります。若い樹木でさえ、甘くてジューシーな果実をたくさん実らせます。耐寒性のあるこの樹木は、屋外で鉢植えとして栽培できます。樹木は好みの形に剪定できます。ぶら下がった枝を持つ柳のような傘型にもできます。

自然な場所: 中国の満州地域が生息地です。

栽培成功:
種子繁殖は室内で年間を通して可能です。湿った用土に種を広げ、その上に少量の用土を被せます。用土の乾燥を防ぐため、鉢をサランラップなどの透明なフィルムでカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2～3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20℃～25℃の明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常は約2～6週間で発芽します。

最高のロケーション: 日当たりのよい暖かい場所を好み、やや防風された場所での保管が理想的です。

最適なケア:
手間のかからない樹木です。最初は鉢で栽培し、夏の間はたっぷりと水を与えます。しかし水浸しにならないように注意します。5月～9月の間は、鉢植え植物用の液体肥料を毎月与えます。屋外で保管の場合、乾期にも耐えますが暑い季節には週に2回は水を与える必要があります。通常、剪定は必要ではありませんが、3月に1度剪定することにより、樹冠を整えることができます。新しい枝と古い枝の両方に果実が生ります。

冬に:
少なくともマイナス20℃までの耐霜性があり、屋外の樹木はさらに強い耐寒性を備えていることが知られています。しかし、鉢植えの場合、冬に葉を落としてからは、霜枯れしないように保護し涼しく暗い場所で冬越しさせます。

SKU: 13002 / Weißer Maulbeerbaum

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved