SAFLAX®

Tips

SKU: 14138 Rotahorn



© Bon Yu Chu - About © : Contact SAFLAX

Acer rubrum

Български	BG	2	
Dansk	DK	2	
Deutsch	DE	2	
English	UK	2	
Eesti	EE	3	
Suomalainen	FI	3	
Français	FR	3	
Ελληνική	GR	3	
Gaeilge	IE	4	
íslenskur	IS	4	
Italiano	IT	4	
Hrvatski	HR	4	
Latviešu	LV	5	
Lietuvių kalba	LT	5	
Malti	MT	5	
Nederlands	NL	5	
Norsk	NO	6	
Polski	PL	6	
Português	PT	6	
Românesc	RO	6	
Svenska	SE	7	
Slovensky	SK	7	
Slovenski	SI	7	
Español	ES	7	
Česky	CZ	8	
Türkçe	TR	8	
Magyar	HU	8	
日本語	JP	9	

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Червен клен
Acer rubrum
Издръжлив бонсай на открито с наситено червени есенни цветове

Червеният клен е истински блясък на цвят и развива красива овална корона. С ранното си начало на огненочервени есенни цветове, той внася частица индийско лято във вашата градина и апартамент. Неговите малки листа с бронзов цвят обикновено са петделни. Дори много млади дървета цъфтят, преди да поникнат листата. След това червените цветя стоят на тънките стъбла в гъсти съцветия и излъчват леко подобен на мед аромат. Между другото, червеният клен е част от канадското знаме. **Естествено местоположение**: Домът на червения клен е главно в източната част на Северна Америка, от атлантическото крайбрежие до Апалачите до края на прерията. **Успешно отглеждане:** Отглеждането е възможно целогодишно. За да увеличите кълняемостта на семената, първо трябва да ги поставите във фризер за три седмици. След това ги оставете да киснат във вода със стайна температура за още 24 часа. Натиснете леко семената във влажна почва за саксии и само леко ги покрийте с почвата за саксии. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с около 20° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Първите разсад се появяват след четири до осем седмици. **Най-доброто местоположение:** Вашият червен клен ще оцени светло, слънчево място. Възможно е и място с лека сянка - но несравнимите есенни цветове се изразяват най-добре на място, осветено от пълно слънце. **Оптимална грижа:** Кореновата система на червения клен се справя добре с различни почвени условия и понася както суха, така и прясно влажна почва. Снабдявайте своя бонсай с течен тор за бонсай на всеки две до три седмици от май до август. Резитбата трябва да започне чак на втората година. За да се постигне стабилно формиране на ствола, клоните трябва да се съкращават само веднъж или два пъти годишно. На останалите клони новите леторасти се съкращават на две двойки пъпки, тъй като при клена винаги има две срещуположни пъпки и следващите двойки са изместени на 90°. Ако пъпките се скъсят до две двойки, остава една двойка, насочена надясно, и една наляво и листата не си пречат. **През зимата:** Ярките есенни листа се окапват много късно. Дървото понася безпроблемно и най-тежките студове до -30° по Целзий. Въпреки това, когато е млад, той е застрашен от късна слана и следователно трябва да бъде защитен донякъде чрез натрупване на листа.



Rød ahorn
Acer rubrum
Hårdfør udendørs bonsai med dybe røde efterårsfarver

Den røde ahorn er en sand farvestråle og udvikler en smuk oval krone.Med sin tidlige start af flammerøde efterårsfarver bringer den lidt indianersommer ind i din egen have og lejlighed. Dens små, bronzefarvede blade er generelt fem-fligede. Selv meget unge træer blomstrer, før bladene spirer. De røde blomster står så på de slanke stængler i tætte blomsterstande og udstråler en let honningagtig duft. Den røde ahorn er i øvrigt en del af det canadiske flag. **Naturlig beliggenhed**: Hjemmet for den røde ahorn er hovedsageligt i det østlige Nordamerika, fra Atlanterhavskysten til Appalacherne til kanten af prærien. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning er mulig hele året rundt. For at øge frøens spiring skal du først placere dem i en fryser i tre uger. Lad dem derefter trække i vand ved stuetemperatur i yderligere 24 timer. Tryk frøene let ned i fugtig pottejord og dæk dem kun let med pottejorden. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med omkring 20° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. De første frøplanter vises efter fire til otte uger. **Den bedste beliggenhed:** Din røde ahorn vil sætte pris på et lyst, solrigt sted. En placering med let skygge er også mulig - dog kommer de uforlignelige efterårsfarver bedst til udtryk på en placering i fuld sol. **Optimal pleje:** Den røde ahorns rodsystem klarer forskellige jordbundsforhold godt og tåler både tør og frisk fugtig jord. Forsyn din bonsai med flydende bonsai-gødning hver anden til tredje uge fra maj til august. Du bør ikke begynde at beskære før det andet år. For at opnå en solid stammedannelse bør grenene kun afkortes en eller to gange om året. På de resterende grene forkortes de nye skud til to par knopper, fordi der på ahornen altid er to knopper, der vender mod hinanden og hvernæste par er forskudt med 90°. Hvis knopperne forkortes til to par, forbliver et par, der peger til højre og et til venstre, og bladene forstyrrer ikke hinanden. **Om vinteren:** De lyse efterårsblade fældes meget sent. Træet tåler selv de hårdeste frostforhold ned til -30° Celsius uden problemer. Den er dog truet af sen frost som ung og bør derfor beskyttes noget ved at hobe blade op.



Rotahorn
Acer rubrum
Winterharter Freiland-Bonsai mit tiefroter Herbstfärbung

Der Rotahorn ist eine wahre Farbenpracht und entwickelt eine schöne ovale Krone. Durch seine früheinsetzende flammenrote Herbstfärbung bringt er ein Stück Indian Summer in den eigenen Garten und die Wohnung. Seine kleinen, beim Austrieb bronzefarbenen Blätter sind im Allgemeinen fünflappig. Schon sehr junge Bäume blühen noch vor dem Blattaustrieb. Die roten Blüten stehen dann an den schlanken Stielen in dichten Blütenständen und verströmen einen leicht honigartigen Duft. Der Rotahorn ist übrigens Bestandteil der kanadischen Flagge. **Naturstandort**: Die Heimat des Rotahorn liegt vor allem im östlichen Nordamerika, von der Atlantikküste über die Appalachen bis an den Rand der Prärie. **Anzucht:** Die Anzucht ist das ganze Jahr über möglich. Um die Keimfähigkeit der Samen zu erhöhen, sollten Sie sie zunächst für drei Wochen in ein Gefrierfach legen. Dann lassen Sie sie bitte noch 24 Stunden in Wasser bei Raumtemperatur vorquellen. Drücken Sie die Samen etwas in feuchte Anzuchterde und bedecken Sie sie nur leicht mit dem Anzuchtsubstrat. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit etwa 20° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Nach vier bis acht Wochen erscheinen dann die ersten Sämlinge. **Standort:** Ihr Rotahorn ist für einen hellen, sonnigen Platz dankbar. Ein Standort mit lichtem Schatten ist ebenfalls möglich - allerdings prägt sich die unvergleichbare Herbstfärbung am besten an einem vollsonnigen Standort aus. **Pflege:** Das Wurzelsystem des Rotahorn kommt gut mit unterschiedlichen Bodenbedingungen zurecht und toleriert sowohl Trockenheit wie auch frisch-feuchte Erde. Versorgen Sie Ihren Bonsai von Mai bis August im Abstand von zwei bis drei Wochen mit flüssigem Bonsaidünger. Mit dem Beschnitt sollten Sie erst im zweiten Jahr beginnen. Um eine solide Stammbildung zu erzielen, sollten die Äste nur ein- bis zweimal im Jahr eingekürzt werden. Bei den verbleibenden Zweigen kürzt man die neuen Austriebe auf zwei Knospenpaare, denn beim Ahorn stehen sich immer zwei Knospen gegenüber und die jeweils nächsten Paare sind um 90° versetzt. Bei einer Einkürzung auf zwei Knospenpaare bleiben jeweils ein nach rechts und ein nach links weisendes Paar und die Blätter behindern sich so nicht. **Im Winter:** Das leuchtende Herbstlaub wird erst sehr spät abgeworfen. Der Baum toleriert selbst härteste Frostbedingungen bis -30° Celsius ohne Probleme. Allerdings ist er im Jugendstadium spätfrostgefährdet und solltedaher etwas durch Anhäufeln von Laub geschützt werden.



Bonsai - Red Maple
Acer rubrum
Frost-hard Outdoor Bonsai with deep red autumn colouring

The Red Maple has indeed a magnificent colouring and grows a gorgeous oval-shaped crown. With its fiery red colouring during autumn, the Red Maple brings a piece of Indian Summer into your garden and your home. Its small and initially bronze-coloured leaves are basically five-lobed. Even young trees bloom early before the leaf formation, with red blossoms that come with thick inflorenscences on slim stalks and exhale a light honey-like scent. By the way, the Red Maple leave is shown on the Canadian banner. **Natural location**: The Red Maple has its natural habitat mainly in eastern North America, from the Atlantic Coast to the Appalachian Mountains until close to the Plains. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase the germinability, you should keep the seeds initially for about three weeks in the freezer and place them afterwards for another 24 hours in warm water for priming. Press the seeds gently into moist potting compost, put just a little compost earth on top and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature about 20°Celsius and keep the earth moist, but not wet. The first seedlings will come up after four to eight weeks. **The best location:** The Red Maple prefers a bright and sunny spot. A light shaded place is also possible - however, the magnificent colouring in autumn comes out best in full sunny places. **Optimal care:** The rooting of the Red Maple can cope easily with most soils and tolerates dryness as well as fresh-moisty earth. From May until August you may give fluid fertilizer for bonsai plants every two to three weeks. You should start pruning only from the second year on. To achieve a solid trunk formation, the branches should not be cut more than once or twice a year. In the rest of the twigs, you can cut the new sprouts to two pairs of buds since in the maple tree develops always two buds opposite of each other with the next pair of buds shifted by 90 degrees. When pruning to two pairs of buds, you always keep one pair pointing to the left and one pair pointing to the right – that way, the leaves don't interfere with each other. **In the winter:** The shiny autumn leaves are being cast off rather late. The tree is completely frost-resistant even up to -30° Celsius. However, in its first years it can be sensitive to late frosts, and should therefore be protected by earthing up some foliage.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Punane vaher

Acer rubrum

Sügavpunaste sügisvärvidega vastupidav välibonsai

Punane vaher on tõeline värvilõng ja sellel on ilus ovaalne kroon.Leekpunaste sügisvärvide varajase algusega toob see teie aeda ja korterisse veidi India suve. Selle väikesed pronksivärvi lehed on tavaliselt viieharulised. Isegi väga noored puud õitsevad enne lehtede tärkamist. Seejärel seisavad punased õied peenikestel vartel tihedates õisikutes ja eritavad kergelt meelaadset lõhna. Muide, punane vaher on osa Kanada lipust. **Looduslik asukoht**: Punase vahtra kodu on peamiselt Põhja-Ameerika idaosas, Atlandi ookeani rannikust Appalachi mägedeni kuni preeria servani. **Edukas kasvatamine:** Kasvatamine on võimalik aastaringselt. Seemnete idanemise suurendamiseks tuleks need kõigepealt kolmeks nädalaks sügavkülma panna. Seejärel laske neil veel 24 tundi toatemperatuuril vees liguneda. Suruge seemned kergelt niiskesse potimulda ja katke need ainult kergelt poimullaga. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage seemnepott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on umbes 20 ° C, ning hoidke istutusmuld niiske, kuid mitte märjana. Esimesed seemikud ilmuvad nelja kuni kaheksa nädala pärast. **Parim asukoht:** Teie punane vaher hindab heledat ja päikeselist kohta. Võimalik on ka heleda varjundiga asukoht – võrreldamatud sügisvärvid väljenduvad aga kõige paremini lauspäikese käes. **Optimaalne hooldus:** Punase vahtra juurestik tuleb hästi toime erinevate mullatingimustega ning talub nii kuiva kui värskelt niisket mulda. Varustage oma bonsai vedela bonsai väetisega iga kahe kuni kolme nädala tagant maist augustini. Lõikamist ei tohiks alustada enne teist aastat. Tugeva tüve moodustumise saavutamiseks tuleks oksi lühendada vaid üks-kaks korda aastas. Ülejäänud okstel lühendatakse uued võrsed kaheks pungadeks, sest vahtral on alati kaks punga vastamisi ja kumbkijärgmised paarid on nihutatud 90° võrra. Kui pungad lühendada kaheks paariks, jääb üks paremale ja teine vasakule suunatud paar alles ning lehed ei sega üksteist. **Talvel:** Säravad sügislehed langevad väga hilja. Puu talub probleemideta ka kõige karmimaid külmatingimusi kuni -30°C. Küll aga ohustab teda noorena hiline külm ja seetõttu tuleks teda lehtede kuhjamisega mõnevõrra kaitsta.



Punainen vaahtera

Acer rubrum

Kestävä ulkobonsai syvän punaisilla syysväreillä

Punainen vaahtera on todellinen väriloiste ja kehittää kauniin soikean kruunun.Varhain alkava liekinpunainen syysväri tuo intialaista kesää omaan puutarhaasi ja asuntoosi. Sen pienet, pronssinväriset lehdet ovat yleensä viisiliuskaisia. Jopa hyvin nuoret puut kukkivat ennen lehtien itämistä. Punaiset kukat seisovat sitten ohuilla varrella tiiviissä kukinnoissa ja tihkuvat hieman hunajaista tuoksua. Muuten, punainen vaahtera on osa Kanadan lippua. **Luonnollinen sijainti**: Punavaahteran kotipaikka on pääasiassa Pohjois-Amerikan itäosassa Atlantin rannikolta Appalakkien vuoristoon ja preeriaan. **Onnistunut viljely:** Viljely on mahdollista ympäri vuoden. Siementen itävyyden lisäämiseksi sinun tulee ensin laittaa ne pakastimeen kolmeksi viikoksi. Anna niiden sitten liota vedessä huoneenlämmössä vielä 24 tuntia. Paina siemenet kevyesti kosteaan istutusmaahan ja peitä ne vain kevyesti istutusmultalla. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on noin 20 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Ensimmäiset taimet ilmestyvät neljästä kahdeksaan viikon kuluttua. **Paras sijainti:** Punainen vaahterasi arvostaa valoisaa, aurinkoista paikkaa. Myös vaalean sävyinen sijainti on mahdollinen - vertaansa vailla olevat syysvärit ilmenevät kuitenkin parhaiten täydessä auringonpaisteessa. **Optimaalinen hoito:** Punavaahteran juuristo kestää hyvin erilaisia maaperän olosuhteita ja sietää sekä kuivaa että vastakosteaa maaperää. Anna bonsaillesi nestemäistä bonsai-lannoitetta kahden tai kolmen viikon välein toukokuusta elokuuhun. Älä aloita karsimista ennen toista vuotta. Kiinteän rungonmuodostuksen saavuttamiseksi oksia tulee lyhentää vain kerran tai kahdesti vuodessa. Jäljellä olevilla oksilla uudet versot lyhennetään kahdeksi silmupariksi, koska vaahteralla on aina kaksi silmua vastakkain ja kumpikinseuraavat parit on siirretty 90°. Jos silmut lyhennetään kahdeksi pariksi, yksi oikealle ja toinen vasemmalle osoittava pari jää jäljelle eivätkä lehdet häiritse toisiaan. **Talvella:** Syksyn kirkkaat lehdet irtoavat hyvin myöhään. Puu sietää vaikeimmatkin pakkasolosuhteet -30°C asti ilman ongelmia. Myöhäinen pakkanen uhkaa sitä kuitenkin nuorena, ja siksi sitä on suojeltava jonkin verran kasaamalla lehtiä.



Erable rouge

Acer rubrum

Bonsaï de jardin rustique avec une coloration rouge profond en automne

L'érable rouge présente de magnifiques couleurs et développe une belle couronne ovale. L'érable rouge donne un morceau d'été indien dans le jardin et à la maison avec sa couleur rouge feu en automne. Ses petites feuilles bronzes lors de la poussée des feuilles ont cinq lobes en général. Même les très jeunes arbres fleurissent avant l'apparition des feuilles. Les fleurs rouges se trouvent ensuite sur les tiges minces dans des inflorescences denses et exhalent un parfum légèrement mielleux. L'érable rouge est un composant du drapeau canadien. **Emplacement naturel**: L'habitation de l'érable rouge se trouve surtout à l'est de l'Amérique du Nord, de la côte atlantique et les Appalaches jusqu'au bord de la Prairie. **Culture réussie:** La culture des graines est possible tout au long de l'année. Pour améliorer la faculté germinative des graines, vous devez d'abord les mettre dans un congélateur pendant trois semaines. Ensuite, laissez-les dans de l'eau à température ambiante pendant 24 heures. Mettez les graines dans du terreau humide et recouvrez-les légèrement avec le substrat. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud à environ 20° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. Les premiers semis apparaissent après quatre à huit semaines. **Le meilleur emplacement:** Votre érable rouge apprécie un emplacement lumineux et ensoleillé. Il est aussi possible de le mettre dans un endroit avec de l'ombre lumineux. Cependant, la coloration d'automne incomparable se forme le mieux dans un endroit en plein soleil. **Soins optimaux:** Le système racinaire de l'érable rouge s'en sort avec des conditions de terre différentes et supporte la sécheresse, ainsi que des emplacements frais et humides. Engraissez votre bonsaï toutes les deux à trois semaines de mai à août avec de l'engrais liquide pour bonsaï. Vous ne devez commencer la taille qu'à partir de la deuxième année. Pour obtenir un développement solide du tronc, les branches doivent être raccourcies une ou deux fois dans l'année. Coupez deux paires de bourgeons sur les branches restantes, car il y a toujours deux bourgeons sur l'érable rouge, et la prochaine paire est décalée à 90°. Lorsque vous coupez deux paires de bourgeons, une paire à droite et une paire à gauche restent, et les feuilles ne les entravent pas. **En hiver:** Les feuilles d'automne vives sont rejetées tard. L'arbre supporte les conditions de gel jusqu'à -30° Celsius tout seul sans problème. Cependant, les jeunes arbres n'aiment pas les gels printaniers et doivent donc être un peu protégés par des buttages de feuilles.



Κόκκινο σφενδάμι

Acer rubrum

Ανθεκτικό μπονσάι εξωτερικού χώρου με βαθυκόκκινα φθινοπωρινά χρώματα

Το κόκκινο σφενδάμι είναι μια πραγματική λάμψη χρώματος και αναπτύσσει ένα όμορφο οβάλ στέμμα.Με την πρώιμη έναρξη των κόκκινων χρωμάτων του φθινοπώρου, φέρνει λίγο Ινδικό Καλοκαίρι στον κήπο και το διαμέρισμά σας. Τα μικρά, χάλκινα φύλλα του είναι γενικά πεντάλοβα. Ακόμη και πολύ νεαρά δέντρα ανθίζουν πριν φυτρώσουν τα φύλλα. Τα κόκκινα λουλούδια στη συνέχεια στέκονται στους λεπτούς μίσχους σε πυκνές ταξιανθίες και αποπνέουν ένα ελαφρώς άρωμα σαν μέλι. Παρεμπιπτόντως, ο κόκκινος σφένδαμος είναι μέρος της καναδικής σημαίας. **Φυσική τοποθεσία**: Η πατρίδα του κόκκινου σφενδάμου βρίσκεται κυρίως στην ανατολική Βόρεια Αμερική, από την ακτή του Ατλαντικού μέχρι τα Απαλάχια Όρη μέχρι την άκρη του λιβάδι. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια είναι δυνατή όλο το χρόνο. Για να αυξήσετε τη βλάστηση των σπόρων, θα πρέπει πρώτα να τους τοποθετήσετε στην κατάψυξη για τρεις εβδομάδες. Στη συνέχεια, αφήστε τα να μουλιάσουν σε νερό σε θερμοκρασία δωματίου για άλλες 24 ώρες. Πιέστε ελαφρά τους σπόρους σε υγρό χώμα γλάστρας και σκεπάστε τους μόνο ελαφρά με το χώμα της γλάστρας. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινόχαρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία περίπου 20° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Τα πρώτα σπορόφυτα εμφανίζονται μετά από τέσσερις έως οκτώ εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Το κόκκινο σφενδάμι σας θα εκτιμήσει ένα φωτεινό, ηλιόλουστο σημείο. Μια τοποθεσία με ανοιχτόχρωμη απόχρωση είναι επίσης δυνατή - ωστόσο, τα ασύγκριτα χρώματα του φθινοπώρου εκφράζονται καλύτερα σε μια τοποθεσία με πλήρη ηλιοφάνεια. **Βέλτιστη φροντίδα:** Το ριζικό σύστημα του κόκκινου σφενδάμου αντιμετωπίζει καλά τις διαφορετικές συνθήκες του εδάφους και ανέχεται τόσο το ξηρό όσο και το φρέσκο υγρό έδαφος. Προμηθεύετε το μπονσάι σας με υγρό λίπασμα μπονσάι κάθε δύο με τρεις εβδομάδες από τον Μάιο έως τον Αύγουστο. Δεν πρέπει να ξεκινήσετε το κλάδεμα μέχρι το δεύτερο έτος. Προκειμένου να επιτευχθεί ένας συμπαγής σχηματισμός κορμού, τα κλαδιά πρέπει να βραχύνονται μόνο μία ή δύο φορές το χρόνο. Στα υπόλοιπα κλαδιά, οι νέοι βλαστοί συντομεύονται σε δύο ζεύγη μπουμπουκιών, επειδή στο σφενδάμι υπάρχουν πάντα δύο μπουμπούκια απέναντι και το καθένατα επόμενα ζεύγη μετατοπίζονται κατά 90°. Εάν τα μπουμπούκια κοντύνουν σε δύο ζεύγη, ένα ζευγάρι δείχνει προς τα δεξιά και ένα προς τα αριστερά παραμένει και τα φύλλα δεν παρεμβαίνουν μεταξύ τους. **Το χειμώνα:** Τα λαμπερά φύλλα του φθινοπώρου ρίχνονται πολύ αργά. Το δέντρο ανέχεται ακόμη και τις πιο σκληρές συνθήκες παγετού έως και -30° Κελσίου χωρίς κανένα πρόβλημα. Ωστόσο, κινδυνεύει από τον όψιμο παγετό όταν είναι νέος και επομένως θα πρέπει να προστατεύεται κάπως με τη συσσώρευση φύλλων.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Maple dearg
Acer rubrum
Bonsai crua amuigh faoin aer le dathanna domhain dearg an fhómhair

Is fíor-bhlas dath é an mhailpín dearg agus forbraíonn sé coróin ubhchruthach álainn.Agus dathanna an fhómhair dearg ar lasadh ag tosú go luath, tugann sé beagán Samhradh Indiach isteach i do ghairdín agus d'árasán féin. Go ginearálta bíonn cúig lobed ar a dhuilleoga beaga daite cré-umha. Bíonn fiú crainn an-óg faoi bhláth sula bhfágann na duilleoga. Seasann na bláthanna dearga ansin ar na gais caola in inflorescences dlúth agus feiceann siad boladh beagán cosúil le mil. Teagmhasach, tá an maple dearg mar chuid de bhratach Cheanada. **Suíomh nádúrtha**: Is in oirthear Mheiriceá Thuaidh den chuid is mó atá baile an mhapail dhearg, ó chósta an Atlantaigh go dtí na Sléibhte Appalachian go dtí imeall na pairce. **Saothrú rathúil:** Is féidir saothrú ar feadh na bliana. Chun péacadh na síolta a mhéadú, ba chóir duit iad a chur ar dtús i reoiteoir ar feadh trí seachtaine. Ansin lig dóibh soak in uisce ag teocht an tseomra ar feadh 24 uair an chloig eile. Brúigh na síolta beagán isteach in ithir potaithe tais agus gan ach iad a chlúdach go héadrom leis an ithir potaithe. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnla a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te thart ar 20° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ná bíodh sé fliuch. Tá na chéad síológa le feiceáil tar éis ceithre nó ocht seachtaine. **An suíomh is fearr:** Beidh meas ag do mhailpe dearg ar láthair geal, grianmhar. Is féidir suíomh le scáth solais freisin - áfach, is fearr dathanna neamh-inchomparáide an fhómhair a chur in iúl i suíomh faoi ghrian iomlán. **Cúram is fearr is féidir:** Déileálann córas fréimhe an mhapail rua go maith le coinníollacha éagsúla ithreach agus glacann sé le hithreach tirim agus le hithreach úr tais araon. Tabhair leasachán bonsai leachtach ar do bonsai gach dhá nó trí seachtaine ó Bhealtaine go Lúnasa. Níor cheart duit bearradh a thosú go dtí an dara bliain. Chun foirmiú trunk soladach a bhaint amach, níor chóir na brainsí a ghiorrú ach uair nó dhó sa bhliain. Ar na brainsí atá fágtha, déantar na shoots nua a ghiorrú go dhá phéire bachlóga, mar gheall ar an maple tá dhá bachlóga i gcónaí os comhair a chéile agus gach ceann acu.déantar na chéad péirí eile a fhrithláireamh faoi 90°. Má dhéantar na bachlóga a ghiorrú go dhá phéire, fanann péire amháin atá dírithe ar dheis agus ceann ar chlé agus ní chuireann na duilleoga isteach ar a chéile. **Sa gheimhreadh:** Cailltear duilleoga geal an fhómhair an-déanach. Fulaingíonn an crann fiú na coinníollacha is gairbhe sioc síos go -30 ° Celsius gan aon fhadhbanna. Mar sin féin, tá sé i mbaol sioc déanach nuair a bhíonn sé óg agus ba chóir é a chosaint beagán mar sin trí dhuilleoga a charnadh.



Rauður hlynur
Acer rubrum
Harðgert útibonsai með djúprauðum haustlitum

Rauði hlynurinn er sannkallaður litaljómi og þróar með sér fallega sporöskjulaga kórónu.Með því að eldrauður haustlitir byrja snemma, færir það smá indverskt sumar inn í þinn eigin garð og íbúð. Lítil, bronslituð blöð hennar eru yfirleitt fimmflipuð. Jafnvel mjög ung tré blómstra áður en laufin spretta. Rauðu blómin standa svo á mjóum stönglunum í þéttum blómablómum og gefa frá sér örlítið hunangskenndan ilm. Tilviljun, rauði hlynurinn er hluti af kanadíska fánanum. **Náttúruleg staðsetning**: Heimili rauða hlynsins er aðallega í austurhluta Norður-Ameríku, frá Atlantshafsströndinni til Appalachian-fjallanna að jaðri sléttunnar. **Árangursrík ræktun:** Ræktun er möguleg allt árið um kring. Til að auka spírun fræanna ættir þú fyrst að setja þau í frysti í þrjár vikur. Látið þær síðan liggja í bleyti í vatni við stofuhita í 24 klukkustundir í viðbót. Þrýstu fræjunum örlítið ofan í rakan pottamold og hyldu þau aðeins með pottamoldinni. Hyljið ræktunarílátið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með um 20°C og haltu pottajarðveginum rökum en ekki blautum. Fyrstu plönturnar birtast eftir fjórar til átta vikur. **Besta staðsetningin:** Rauði hlynurinn þinn kann að meta bjartan, sólríkan stað. Staðsetning með ljósum skugga er líka möguleg - hins vegar koma hinir óviðjafnanlegu haustlitir best fram á stað í fullri sól. **Besta umönnun:** Rótarkerfi rauða hlynsins ræður vel við mismunandi jarðvegsaðstæður og þolir bæði þurran og ferskan rakan jarðveg. Gefðu Bonsai þínum fljótandi Bonsai áburði á tveggja til þriggja vikna fresti frá maí til ágúst. Þú ættir ekki að byrja að klippa fyrr en á öðru ári. Til að ná traustri stofnmyndun ætti aðeins að stytta greinarnar einu sinni til tvisvar á ári. Á greinunum sem eftir eru eru nýju sprotarnir styttir í tvö pör af brum, því á hlynnum eru alltaf tveir brum sem snúa hvor að öðrum og hvernæstu pör eru á móti 90°. Ef brumarnir eru styttir í tvö pör eru eitt par sem vísar til hægri og eitt til vinstri eftir og blöðin trufla ekki hvort annað. **Á veturna:** Björt haustlaufin falla mjög seint. Tréð þolir jafnvel erfiðustu frostskilyrði niður í -30° Celsíus án vandræða. Henni stafar þó hætta af síðfrosti þegar hann er ungur og ætti því að verjast nokkuð með því að hlaða upp laufblöðum.



Acero rosso
Acer rubrum
Bonsai da esterno resistente al freddo, in autunno dsi tinge di rosso acceso

L'Acero rosso è un vero spettacolo di colori e sviluppa una bella chioma ovale. Con la tipica colorazione autunnale precoce porterà un tocco di estate indiana nel vostro giardino. Le piccole foglie sono color bronzo appena sbocciate, generalmente pentalobate. Già gli alberi molto giovani fioriscono prima dello spuntare del fogliame. I fiori rossi compaiono sugli steli sottili, raggruppati in infiorescenze fitte, emanando un profumo che ricorda leggermente il miele. L'Acero rosso è protagonista della bandiera canadese. **Posizione naturale**: L'areale dell'Acero rosso si trova soprattutto nel Nord America orientale, dalla costa atlantica sui Monti Appalachi fino ai confini della prateria. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Per aumentare la germinabilità dei semi, conservateli per tre settimane nel congelatore. Poi lasciateli immersi per 24 ore in un recipiente con acqua a temperatura ambiente affinché si gonfino. Collocate i semi nella terra di coltivo umida e copriteli leggermente con il substrato. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura di circa 20° C e mantenete la terra umida, ma non bagnata. Le prime piantine spuntano di norma da quattro a otto settimane dopo. **La posizione migliore:** Il vostro Acero rosso predilige un ambiente luminoso e soleggiato. E' anche possibile collocarlo in un punto leggermente all'ombra, ma in generale l'inconfondibile colorazione autunnale si sviluppa meglio se esposto al sole. **Cura ottimale:** Il sistema radicale dell'Acero rosso si adatta bene a svariate condizioni del terreno e tollera persino la siccità, così come luoghi freschi-umidi o bagnati. Da maggio ad agosto, concimate il vostro bonsai ogni due o tre settimane con fertilizzante liquido per bonsai. Cominciate a potare solo dal secondo anno di età. Per costruire un tronco solido, accorciate i rami solo una - massimo due volte all'anno. Sui rami rimanenti accorciate i nuovi getti di due coppie di boccioli, poiché nell'acero si trovano sempre due boccioli uno di fronte all'altro, con la coppia successiva a 90° C di inclinazione. Tagliando due coppie di boccioli rimarranno una verso destra e una verso sinistra, senza intralciare le foglie. **In inverno:** Il vivace fogliame autunnale cade solo molto tardi. L'albero tollera senza problemi anche temperature molto gelide, fino a - 30° C. In età giovane teme le gelate tardive, per questo dovrebbe essere protetto rincalzandolo con fogliame.



Crveni javor
Acer rubrum
Izdržljiv vanjski bonsai tamnocrvenih jesenskih boja

Crveni javor je pravog sjaja boje i razvija prekrasnu ovalnu krošnju.Sa svojim ranim početkom plamenocrvenih jesenskih boja, unosi malo indijskog ljeta u vaš vlastiti vrt i stan. Njegovi mali listovi bronČane boje uglavnom su peterokraki. Čak i vrlo mlada stabla cvjetaju prije nego lišće nikne. Crveni cvjetovi tada stoje na tankim stapkama u gustim cvatovima i odišu blago mednim mirisom. Uzgred, crveni javor dio je kanadske zastave. **Zemlja porijekla**: Postojbina crvenog javora je uglavnom u istočnoj Sjevernoj Americi, od atlantske obale do Appalachian planina do ruba prerije. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj je moguć tijekom cijele godine. Da biste povećali klijavost sjemena, najprije ih stavite u zamrzivač na tri tjedna. Zatim ih ostavite da se namaču u vodi sobne temperature još 24 sata. Lagano utisnite sjeme u vlažnu zemlju za posude i samo ih lagano prekrijte zemljom za posude. Posudu s kulturom prekrijte prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s oko 20° Celzija i održavajte tlo u posudi vlažnim, ali ne mokrim. Prve sadnice pojavljuju se nakon četiri do osam tjedana. **Najbolja lokacija:** Vaš crveni javor će cijeniti svijetlo, sunčano mjesto. Moguća je i lokacija s laganom sjenom - međutim, neusporedive jesenske boje najbolje dolaze do izražaja na lokaciji na punom suncu. **Optimalna njega:** Korijenov sustav crvenog javora dobro se nosi s različitim uvjetima tla i podnosi i suho i svježe vlažno tlo. Opskrbite svoj bonsai tekućim gnojivom za bonsai svaka dva do tri tjedna od svibnja do kolovoza. S rezidbom ne smijete početi prije druge godine. Da bi se postigla čvrsta formacija debla, grane treba skraćivati samo jednom do dva puta godišnje. Na preostalim granama nove se mladice skraćuju na dva para pupova, jer su na javoru uvijek dva pupa okrenuta jedan prema drugome i svakisljedeći parovi su pomaknuti za 90°. Ako se pupoljci skrate na dva para, ostaje jedan par okrenut udesno, a jedan ulijevo, a listovi ne smetaju jedni drugima. **U zimi:** Svijetlo jesensko lišće opada vrlo kasno. Stablo bez problema podnosi i najteže mrazeve do -30°C. No, u mladosti joj prijeti kasni mraz pa je treba donekle zaštititi nagomilavanjem lišća.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Sarkanā kļava
Acer rubrum
Izturīgs āra pundurkociņš ar tumši sarkanām rudens krāsām

Sarkanā kļava ir īsts krāsu mirdzums un attīsta skaistu ovālu vainagu.Ar savu liesmu sarkano rudens krāsu agrīno sākumu tas ienes jūsu dārzā un dzīvoklī mazliet Indijas vasaras. Tās mazās, bronzas krāsas lapas parasti ir piecu daivu. Pat ļoti jauni koki uzzied pirms lapu dīgšanas. Pēc tam sarkanie ziedi stāv uz slaidajiem kātiem blīvās ziedkopās un izdala nedaudz medum līdzīgu smaržu. Starp citu, sarkanā kļava ir daļa no Kanādas karoga. **Dabiska vieta**: Sarkanās kļavas mājvieta galvenokārt atrodas Ziemeļamerikas austrumos, no Atlantijas okeāna piekrastes līdz Apalaču kalniem līdz prērijas malai. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana iespējama visu gadu. Lai palielinātu sēklu dīgtspēju, vispirms tās jāievieto saldētavā uz trim nedēļām. Pēc tam ļaujiet tiem vēl 24 stundas mērcēt ūdenī istabas temperatūrā. Nedaudz iespiediet sēklas mitrā augsnē un tikai viegli pārklājiet tās ar augsni. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar aptuveni 20°C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Pirmie stādi parādās pēc četrām līdz astoņām nedēļām. **Labākā atrašanās vieta:** Jūsu sarkanā kļava novērtēs gaišu, saulainu vietu. Iespējama arī vieta ar gaišu nokrāsu – tomēr nepārspējamās rudens krāsas vislabāk izpauž vietā pilnā saulē. **Optimāla aprūpe:** Sarkanās kļavas sakņu sistēma labi tiek galā ar dažādiem augsnes apstākļiem un pacieš gan sausu, gan tikko mitru augsni. No maija līdz augustam ik pēc divām līdz trim nedēļām piegādājiet pundurkociņam šķidro pundurkociņa mēslojumu. Jums nevajadzētu sākt apgriešanu līdz otrajam gadam. Lai panāktu stingru stumbra veidošanos, zarus vajadzētu saīsināt tikai vienu vai divas reizes gadā. Uz atlikušajiem zariem jaunie dzinumi tiek saīsināti līdz diviem pumpuru pāriem, jo uz kļavas vienmēr ir divi pumpuri viens pret otru un katrsnākamie pāri ir nobīdīti par 90°. Ja pumpurus saīsina līdz diviem pāriem, paliek viens pāris, kas vērsts pa labi un viens pa kreisi, un lapas netraucē viena otrai. **Ziemā:** Spilgtās rudens lapas nobirst ļoti vēlu. Koks bez problēmām pacieš pat vissmagākos sala apstākļus līdz -30°C. Tomēr jaunībā to apdraud vēlās sals, tāpēc to vajadzētu nedaudz aizsargāt, sakrājot lapas.



Raudonasis klevas
Acer rubrum
Tvirtas lauko bonsas su sodriai raudonomis rudens spalvomis

Raudonasis klevas yra tikra spalva ir sukuria gražią ovalią karūną.Anksti pasirodžius liepsnai raudonoms rudens spalvoms, jis įneš į jūsų sodą ir butą šiek tiek Indijos vasaros. Jo maži, bronzinės spalvos lapai paprastai yra penkių skilčių. Netgi labai jauni medžiai pražysta prieš išdygstant lapams. Tada raudoni žiedai stovi ant plonų stiebų tankiuose žiedynuose ir skleidžia šiek tiek medaus kvapą. Beje, raudonasis klevas yra Kanados vėliavos dalis. **Natūrali vieta**: Raudonojo klevo buveinė daugiausia yra rytinėje Šiaurės Amerikos dalyje, nuo Atlanto vandenyno pakrantės iki Apalačų kalnų iki prerijos pakraščio. **Sėkmingas auginimas:** Galima auginti ištisus metus. Norėdami padidinti sėklų daigumą, pirmiausia turėtumėte jas įdėti į šaldiklį trims savaitėms. Tada leiskite jiems mirkyti kambario temperatūros vandenyje dar 24 valandas. Sėklas šiek tiek įspauskite į drėgną vazoninę žemę ir tik lengvai užberkite jas vazonine žeme. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną padėkite į šviesią ir šiltą vietą, kurios temperatūra yra apie 20 °C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Pirmieji daigai pasirodo po keturių – aštuonių savaičių. **Geriausia vieta:** Jūsų raudonasis klevas įvertins šviesią, saulėtą vietą. Galima ir šviesaus atspalvio vieta – tačiau neprilygstamos rudens spalvos geriausiai išryškėja saulėtoje vietoje. **Optimali priežiūra:** Raudonojo klevo šaknų sistema puikiai susidoroja su įvairiomis dirvožemio sąlygomis ir toleruoja tiek sausą, tiek šviežiai drėgną dirvą. Kas dvi ar tris savaites nuo gegužės iki rugpjūčio kas dvi ar tris savaites bonsą patepkite skystomis bonsai trąšomis. Pradėti genėti nereikėtų iki antrųjų metų. Norint pasiekti tvirtą kamieno formavimą, šakas reikėtų trumpinti tik kartą ar du per metus. Ant likusių šakų nauji ūgliai sutrumpinami iki dviejų pumpurų porų, nes ant klevo visada yra du pumpurai vienas prieš kitą ir kiekvienaskitos poros paslinktos 90°. Jei pumpurai sutrumpinami iki dviejų porų, lieka viena pora, nukreipta į dešinę ir viena į kairę, o lapai vienas kitam netrukdo. **Žiemą:** Ryškūs rudens lapai metasi labai vėlai. Medis be problemų toleruoja net atšiauriausias šalčio sąlygas iki -30°C. Tačiau jaunai jai gresia vėlyvas šalnas, todėl reikėtų šiek tiek apsaugoti, kaupiant lapus.



Aġġru aħmar
Acer rubrum
Bonsai ta 'barra li jifilħu b'kuluri aħmar skur tal-ħarifa

L-aġġru aħmar huwa blaze veru ta 'kulur u jiżviluppa kuruna ovali sabiħa.Bil-bidu bikri tiegħu ta 'kuluri tal-ħarifa aħmar tal-fjamma, iġib daqsxejn ta' Sajf Indjan fil-ġnien u l-appartament tiegħek stess. Il-weraq żgħar tiegħu kulur il-bronż huma ġeneralment b'ħames lobi. Anke siġar żgħar ħafna jiffjorixxu qabel ma jinbet il-weraq. Il-fjuri ħomor imbagħad joqogħdu fuq iz-zkuk irqaq fi fjorituri densi u joħorġu riħa kemmxejn qisha għasel. Inċidentalment, l-aġġru aħmar huwa parti mill-bandiera Kanadiża. **Post naturali**: Id-dar tal-aġġru aħmar tinsab prinċipalment fil-Lvant tal-Amerika ta 'Fuq, mill-kosta tal-Atlantiku sal-Muntanji Appalachian sat-tarf tal-prairie. **Kultivazzjoni b'suċċess:** Il-kultivazzjoni hija possibbli s-sena kollha. Biex iżżid il-ġerminazzjoni taż-żrieragħ, l-ewwel għandek tpoġġihom fil-friża għal tliet ġimgħat. Imbagħad ħallihom jixxarrbu fl-ilma f'temperatura tal-kamra għal 24 siegħa oħra. Agħfas iż-żrieragħ ftit fil-ħamrija tal-qsari niedja u għattihom biss ħafif bil-ħamrija tal-qsari. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovdi b'toqob. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxef. Għandek tneħħi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post ħafif u sħun b'madwar 20° Celsius u żomm il-ħamrija tal-qsari niedja iżda mhux imxarrba. L-ewwel nebbieta jidhru wara erba 'sa tmien ġimgħat. **L-aħjar post:** L-aġġru aħmar tiegħek se japprezza post qawwi u xemxi. Post bi dell ħafif huwa wkoll possibbli - madankollu, il-kuluri inkomparabbli tal-ħarifa huma l-aħjar espressi f'post fix-xemx sħiħ. **Kura ottimali:** Is-sistema ta 'l-għeruq ta' l-aġġru aħmar tlaħħaq tajjeb ma 'kundizzjonijiet differenti tal-ħamrija u tittollera kemm ħamrija niexfa kif ukoll niedja friska. Ipprovdi lill-bonsai tiegħek b'fertilizzant likwidu tal-bonsai kull ġimgħatejn jew tliet ġimgħat minn Mejju sa Awwissu. M'għandekx tibda żbir sat-tieni sena. Sabiex tinkiseb formazzjoni solida ta 'tronk, il-fergħat għandhom jitqassru biss darba jew darbtejn fis-sena. Fuq il-fergħat li fadal, ir-rimjiet il-ġodda jitqassru għal żewġ pari blanzuni, minħabba li fuq l-aġġru dejjem hemm żewġ blanzuni iħarsu lejn xulxin u kull wieħed.il-pari li jmiss huma kkumpensati b'90°. Jekk il-blanzuni jitqassru għal żewġ pari, par wieħed li jipponta lejn il-lemin u wieħed lejn ix-xellug jibqa 'u l-weraq ma jinterferixxux ma' xulxin. **Fix-xitwa:** Il-weraq qawwi tal-ħarifa jintrema tard ħafna. Is-siġra tittollera anki l-aktar kundizzjonijiet ħorox tal-ġlata sa -30 ° Celsius mingħajr problemi. Madankollu, hija pperikolata mill-ġlata tard meta tkun żgħira u għalhekk għandha tkun protetta kemmxejn billi jingħabru weraq.



Bonsai - Rode Esdoorn
Acer rubrum
Winterharde buitenbonsai met dieprode herfstkleuren

De rode esdoorn is een echte kleurenpracht en ontwikkelt een prachtige ovale kroon. Met zijn vlammend rode herfstkleur die vroeg intrekt, brengt hij een stukje nazomer in je eigen tuin en appartement. De kleine, bronskleurige bladeren zijn bij het schieten over het algemeen vijflobbig. Zelfs heel jonge bomen bloeien voordat de bladeren schieten. De rode bloemen staan dan op de slanke stelen in dichte bloeiwijzen en geven een licht honingachtige geur af. Overigens maakt de rode esdoorn deel uit van de Canadese vlag. **Natuurlijke locatie**: Het huis van de rode esdoorn bevindt zich voornamelijk in het oosten van Noord-Amerika, van de Atlantische kust over de Appalachen tot aan de rand van de prairie. **Succesvolle teelt:** Teelt is het hele jaar mogelijk. Om de kiemkracht van de zaden te vergroten, moet je ze eerst drie weken in de vriezer leggen. Laat ze vervolgens nog eens 24 uur in water van kamertemperatuur weken. Druk de zaden een beetje in vochtige potgrond en bedek ze slechts licht met het groeisubstraat. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met circa 20 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. De eerste zaailingen verschijnen na vier tot acht weken. **De beste locatie:** Je rode esdoorn zal je dankbaar zijn voor een heldere, zonnige plek. Een standplaats met lichte schaduw is ook mogelijk, maar de onvergelijkbare herfstkleur komt het best tot uiting op een volledig zonnige standplaats. **Optimale verzorging:** Het wortelsysteem van de rode esdoorn kan goed omgaan met verschillende bodemgesteldheden en verdraagt zowel droogte als vers vochtige grond. Voorzie uw bonsai van mei tot augustus elke twee tot drie weken van vloeibare bonsai-meststof. Begin pas in het tweede jaar met trimmen. Om een stevige stamvorming te bekomen, mogen de takken slechts één à twee keer per jaar worden ingekort. Op de overgebleven takken worden de nieuwe scheuten ingekort tot twee paar knoppen, omdat er bij de esdoorn altijd twee knoppen naar elkaar gericht zijn en de volgende paren 90 ° worden verschoven. Bij het inkorten tot twee paar knoppen, blijft er een naar rechts en een naar links wijzend paar over en hinderen de bladeren elkaar niet. **In de winter:** De gloeiende herfstbladeren worden pas laat afgeworpen. De boom verdraagt zelfs de meest extreme vorst tot -30 ° Celsius zonder problemen. Het wordt echter bedreigd door late vorst in de jeugdfase en moet daarom een beetje worden beschermd door ophoping van bladeren.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Rød lønn

Acer rubrum

Hardfør utendørs bonsai med dype røde høstfarger

Den røde lønnen er en ekte fargestråle og utvikler en vakker oval krone.Med sin tidlige begynnelse av flammerøde høstfarger, bringer den litt indisk sommer inn i din egen hage og leilighet. De små, bronsefargede bladene er vanligvis femfligede. Selv svært unge trær blomstrer før bladene spirer. De røde blomstene står da på de slanke stilkene i tette blomsterstander og utstråler en litt honningaktig duft. Den røde lønnen er forøvrig en del av det kanadiske flagget. **Naturlig beliggenhet**: Hjemmet til den røde lønnen er hovedsakelig i det østlige Nord-Amerika, fra Atlanterhavskysten til Appalachian-fjellene til kanten av prærien. **Vellykket dyrking:** Dyrking er mulig hele året. For å øke spireevnen til frøene bør du først legge dem i fryseren i tre uker. La dem så trekke i vann i romtemperatur i ytterligere 24 timer. Press frøene litt ned i fuktig pottejord og dekk dem bare lett med pottejorda. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Sett frøpotten på et lett og varmt sted med rundt 20° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. De første frøplantene vises etter fire til åtte uker. **Den beste beliggenheten:** Den røde lønnen din vil sette pris på et lyst, solrikt sted. En plassering med lett skygge er også mulig - men de uforlignelige høstfargene kommer best til uttrykk på en plassering i full sol. **Optimal omsorg:** Rotsystemet til den røde lønnen takler forskjellige jordforhold og tåler både tørr og nyfuktig jord. Forsyn bonsaien din med flytende bonsaigjødsel annenhver til tredje uke fra mai til august. Du bør ikke begynne å beskjære før det andre året. For å oppnå en solid stammedannelse bør grenene kun kortes ned en eller to ganger i året. På de resterende grenene er de nye skuddene forkortet til to par knopper, fordi på lønnen er det alltid to knopper som vender mot hverandre og hverneste par er forskjøvet med 90°. Hvis knoppene er forkortet til to par, forblir ett par som peker til høyre og ett til venstre, og bladene forstyrrer ikke hverandre. **Om vinteren:** De lyse høstløvet feller veldig sent. Treet tåler selv de hardeste frostforholdene ned til -30° Celsius uten problemer. Den er imidlertid truet av sen frost som ung og bør derfor beskyttes noe ved å hope seg opp løv.



Bonsai - Klon Czerwony

Acer rubrum

Zimowe bonsai na zewnątrz w głębokich, czerwonych jesiennych kolorach

Czerwony klon ma naprawdę wspaniałe zabarwienie i wyrasta na wspaniałą owalną koronę. Dzięki ognistej czerwieni jesienią, czerwony klon wnosi kawałek indyjskiego lata do Twojego ogrodu i domu. Jego małe i początkowo brązowe liście są zasadniczo pięciopłatkowe. Nawet młode drzewa kwitną wcześnie, zanim uformują się liście, z czerwonymi kwiatami, które tworzą grube kwiatostany na cienkich łodygach i wydychają lekki miodowy zapach. Nawiasem mówiąc, urlop z czerwonego klonu jest pokazany na kanadyjskim banerze. **Naturalne położenie**: Klon czerwony występuje głównie we wschodniej Ameryce Północnej, od wybrzeża Atlantyku po Appalachy, aż po równiny. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, należy początkowo przechowywać nasiona przez około trzy tygodnie w zamrażarce, a następnie umieścić je na kolejne 24 godziny w ciepłej wodzie w celu zaprawy. Delikatnie wciśnij nasiona do wilgotnego kompostu doniczkowego, nałóż niewielką ilość ziemi kompostowej i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze około 20 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Pierwsze sadzonki pojawią się po czterech do ośmiu tygodniach. **Najlepsza lokalizacja:** Klon czerwony preferuje jasne i słoneczne miejsce. Możliwe jest również miejsce lekko zacienione - jednak wspaniała kolorystyka jesienią najlepiej prezentuje się w miejscach w pełni nasłonecznionych. **Optymalna pielęgnacja:** Ukorzenienie klonu czerwonego z łatwością radzi sobie z większością gleb i toleruje zarówno suchość, jak i świeżo wilgotną ziemię. Od maja do sierpnia możesz co dwa do trzech tygodni podawać płynny nawóz do roślin bonsai. Przycinanie należy rozpoczynać dopiero od drugiego roku. Aby uzyskać solidny kształt pnia, gałęzi nie należy ciąć częściej niż raz lub dwa razy w roku. W pozostałych gałązkach nowe kiełki można pociąć na dwie pary pąków, ponieważ w drzewie klonowym powstają zawsze dwa pąki naprzeciw siebie, a następna para pąków jest przesunięta o 90 stopni. Podczas przycinania do dwóch par pąków zawsze trzymasz jedną parę skierowaną w lewo, a drugą w prawo - w ten sposób liście nie kolidują ze sobą. **W zimę:** Lśniące jesienne liście wypadają dość późno. Drzewo jest całkowicie mrozoodporne nawet do -30 ° Celsjusza. Jednak w pierwszych latach życia może być wrażliwy na późne przymrozki, dlatego należy go chronić, uziemiając część liści.



Bordo vermelho

Acer rubrum

Hardy bonsai ao ar livre com cores de outono vermelhas profundas

O bordo vermelho é uma verdadeira explosão de cores e desenvolve uma bela coroa oval.Com o início precoce das cores vermelhas do outono, traz um pouco do verão indiano para o seu próprio jardim e apartamento. Suas pequenas folhas cor de bronze são geralmente de cinco lóbulos. Mesmo as árvores muito jovens florescem antes que as folhas brotem. As flores vermelhas ficam então nas hastes delgadas em inflorescências densas e exalam um aroma ligeiramente semelhante ao mel. Aliás, o red maple faz parte da bandeira canadense. **Localização natural**: A casa do bordo vermelho é principalmente no leste da América do Norte, desde a costa atlântica até as montanhas Apalaches até a borda da pradaria. **Cultivo bem sucedido:** O cultivo é possível durante todo o ano. Para aumentar a germinação das sementes, você deve primeiro colocá-las no freezer por três semanas. Em seguida, deixe-os de molho em água em temperatura ambiente por mais 24 horas. Pressione as sementes levemente no solo úmido e cubra-as apenas levemente com o solo. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com cerca de 20° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. As primeiras mudas aparecem após quatro a oito semanas. **A melhor localização:** Seu bordo vermelho apreciará um local claro e ensolarado. Um local com sombra clara também é possível - no entanto, as incomparáveis cores do outono são melhor expressas em um local com sol pleno. **Cuidado ideal:** O sistema radicular do bordo vermelho lida bem com diferentes condições de solo e tolera solo seco e úmido. Forneça ao seu bonsai fertilizante líquido para bonsai a cada duas ou três semanas, de maio a agosto. Você não deve começar a podar até o segundo ano. Para obter uma formação sólida do tronco, os ramos devem ser encurtados apenas uma ou duas vezes por ano. Nos ramos restantes, os novos brotos são encurtados para dois pares de botões, porque no bordo sempre há dois botões voltados um para o outro e cada umos próximos pares são deslocados em 90°. Se os botões forem encurtados para dois pares, um par apontando para a direita e outro para a esquerda permanecem e as folhas não interferem umas nas outras. **No inverno:** As folhas brilhantes do outono caem muito tarde. A árvore tolera até mesmo as condições de geada mais severas até -30° Celsius sem problemas. No entanto, está em perigo de geada tardia quando jovem e, portanto, deve ser protegido um pouco pelo acúmulo de folhas.



Bonsai - Arțar Roșu

Acer rubrum

Bonsai în aer liber rezistent la iarnă, cu culori roșii de toamnă

Arțarul roșu este un adevărat foc de culori și dezvoltă o frumoasă coroană ovală. Cu culoarea roșie aprinsă de toamnă, care se instalează devreme, aduce o bucată de vară indiană în propria grădină și apartament. Frunzele sale mici, de culoare bronz, atunci când trag, sunt în general cu cinci lobi. Chiar și copacii foarte tineri înfloresc înainte ca frunzele să tragă. Florile roșii sunt apoi pe tulpini subțiri în inflorescențe dense și emană un miros ușor asemănător mierii. De altfel, arțarul roșu face parte din steagul canadian. **Locație naturală**: Locuința arțarului roșu se află în principal în estul Americii de Nord, de la coasta Atlanticului peste Apalahi până la marginea preriei. **Cultivare de succes:** Cultivarea este posibilă pe tot parcursul anului. Pentru a crește germinabilitatea semințelor, ar trebui să le puneți mai întâi într-un congelator timp de trei săptămâni. Apoi lăsați-i să se înmoaie în apă la temperatura camerei încă 24 de ore. Apăsați puțin semințele în sol umed de ghiveci și acoperiți-le doar ușor cu mediul de creștere. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mucegaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu aproximativ 20 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Primele răsaduri apar după patru până la opt săptămâni. **Cea mai bună locație:** Arțarul roșu vă va fi recunoscător pentru un loc luminos și însorit. Este posibilă și o locație cu umbră deschisă - totuși, culoarea toamnei incomparabilă este exprimată cel mai bine într-o locație complet însorită. **Îngrijire optimă:** Sistemul de rădăcină al arțarului roșu se descurcă bine cu diferite condiții ale solului și tolerează atât seceta, cât și solul proaspăt umed. Furnizați bonsaiului cu îngrășământ lichid pentru bonsai la fiecare două până la trei săptămâni din mai până în august. Ar trebui să începeți tăierea doar în al doilea an. Pentru a obține o formare solidă a trunchiului, ramurile trebuie scurtate doar o dată sau de două ori pe an. Pe ramurile rămase, lăstarii noi sunt scurtați la două perechi de muguri, deoarece cu arțarul există întotdeauna doi muguri orientați unul către celălalt, iar următoarele perechi sunt compensate cu 90 °. Când se scurtează la două perechi de muguri, rămân câte o pereche îndreptată spre dreapta și una spre stânga, iar frunzele nu se împiedică reciproc. **În iarnă:** Frunzele strălucitoare de toamnă sunt aruncate doar foarte târziu. Arborele tolerează chiar și cele mai dure condiții de îngheț până la -30 ° Celsius fără probleme. Cu toate acestea, este pus în pericol de înghețul târziu în etapa de tineret și, prin urmare, ar trebui protejat puțin prin îngrămădirea frunzelor.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Bonsai - Röd Lönn

Acer rubrum

Vinterhärdig utomhusbonsai med djupröda höstfärger

Den röda lönnen är en riktig flammande färg och utvecklar en vacker oval krona. Med sin flammande röda höstfärg som börjar tidigt ger den en bit indisk sommar till din egen trädgård och lägenhet. De små, bronsfärgade bladen när de skjuter är i allmänhet fem flikiga. Även mycket unga träd blommar innan bladen skjuter. De röda blommorna är sedan på de smala stjälkarna i täta blomställningar och ger en lite honungsliknande doft. Förresten är den röda lönnen en del av den kanadensiska flaggan. **Naturligt läge**: Hemmet för den röda lönnen är främst i östra Nordamerika, från Atlantkusten över Appalachians till kanten av prärien. **Framgångsrik odling:** Odling är möjlig året runt. För att öka fröns grobarhet bör du först lägga dem i en frys i tre veckor. Låt dem sedan suga i vatten vid rumstemperatur i ytterligare 24 timmar. Pressa fröna lite i fuktig krukväxt och täck dem bara lätt med odlingsmediet. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med cirka 20 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. De första plantorna dyker upp efter fyra till åtta veckor. **Den bästa platsen:** Din röda lönn kommer att vara tacksam för en ljus, solig plats. En plats med ljus nyans är också möjlig - den ojämförliga höstfärgen uttrycks dock bäst i ett helt soligt läge. **Optimal vård:** Rotsystemet på den röda lönnen klarar olika markförhållanden och tål både torka och ny fuktig jord. Förse din bonsai med flytande bonsai-gödselmedel varannan till var tredje vecka från maj till augusti. Du bör börja trimma under det andra året. För att uppnå en solid stambildning bör grenarna endast förkortas en eller två gånger om året. På de återstående grenarna förkortas de nya skotten till två par knoppar, för med lönnen finns det alltid två knoppar som vetter mot varandra och nästa par kompenseras med 90 °. Vid förkortning till två knoppar förblir ett par som pekar åt höger och ett som pekar åt vänster och bladen hindrar inte varandra. **På vintern:** De glödande höstbladen kastas först mycket sent. Trädet tål även de hårdaste frostförhållandena ner till -30 ° C utan problem. Det är dock hotat av sen frost i ungdomsskedet och bör därför skyddas lite genom att stapla upp löv.



Červený javor

Acer rubrum

Odolný vonkajší bonsaj v sýtočervených jesenných farbách

Červený javor má skutočnú farbu a vytvára krásnu oválnu korunu.Svojím skorým nástupom plameňovočervených jesenných farieb prináša trochu babieho leta do vašej vlastnej záhrady a bytu. Jeho malé, bronzovo sfarbené listy sú zvyčajne päťlaločné. Dokonca aj veľmi mladé stromy kvitnú skôr, ako vyrašia listy. Červené kvety potom stoja na štíhlych stonkách v hustých súkvetiach a vyžarujú jemne medovú vôňu. Mimochodom, červený javor je súčasťou kanadskej vlajky. **Prirodzená poloha**: Domov javora červeného je najmä vo východnej časti Severnej Ameriky, od pobrežia Atlantiku cez Apalačské pohorie až po okraj prérie. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie je možné počas celého roka. Aby ste zvýšili klíčivosť semien, mali by ste ich najskôr umiestniť na tri týždne do mrazničky. Potom ich nechajte namočiť vo vode pri izbovej teplote ďalších 24 hodín. Semená mierne zatlačte do vlhkej zeminy a len zľahka ich zasypte zeminou. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou okolo 20° Celzia a zeminu udržujte vlhkú, ale nie mokrú. Prvé sadenice sa objavia po štyroch až ôsmich týždňoch. **Najlepšie umiestnenie:** Váš červený javor ocení svetlé slnečné miesto. Možné je aj stanovište so svetlým tieňom - neporovnateľné jesenné farby však najlepšie vystihne lokalita na plnom slnku. **Optimálna starostlivosť:** Koreňový systém javora červeného sa dobre vyrovnáva s rôznymi pôdnymi podmienkami a znáša suchú aj čerstvo vlhkú pôdu. Zásobujte svoje bonsaje tekutým hnojivom na bonsaje každé dva až tri týždne od mája do augusta. So strihaním by ste mali začať až v druhom roku. Aby ste dosiahli pevnú formáciu kmeňa, mali by sa konáre skracovať len raz alebo dvakrát do roka. Na zvyšných konároch sa nové výhonky skrátia na dva páry púčikov, pretože na javore sú vždy dva púčiky oproti sebe a každýďalšie páry sú posunuté o 90°. Ak sa puky skrátia na dva páry, zostane jeden pár smerujúci doprava a jeden doľava a listy si navzájom neprekážajú. **V zime:** Svetlé jesenné lístie opadáva veľmi neskoro. Strom bez problémov znáša aj najtvrdšie mrazy do -30° Celzia. V mladosti ju však ohrozujú neskoré mrazy, a preto ju treba trochu chrániť hromadením listov.



Rdeči javor

Acer rubrum

Odporen zunanji bonsaj temno rdečih jesenskih barv

Rdeči javor je prave barve in razvije čudovito ovalno krošnjo.S svojim zgodnjim nastopom ognjeno rdečih jesenskih barv prinese delček indijskega poletja v vaš vrt in stanovanje. Njegovi majhni, bronasto obarvani listi so običajno petkrpati. Tudi zelo mlada drevesa zacvetijo, preden poženejo listi. Rdeči cvetovi takrat stojijo na vitkih steblih v gostih socvetjih in oddajajo rahlo meden vonj. Mimogrede, rdeči javor je del kanadske zastave. **Naravni habitat**: Dom rdečega javorja je predvsem v vzhodni Severni Ameriki, od atlantske obale do Apalaškega gorovja do roba prerije. **Navodila za gojenje:** Gojenje je možno vse leto. Da bi povečali kalivost semen, jih najprej za tri tedne postavite v zamrzovalnik. Nato jih pustimo še 24 ur namakati v vodi pri sobni temperaturi. Semena rahlo potisnite v vlažno zemljo za lončke in jih le rahlo prekrijte z zemljo za lončke. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s približno 20 °C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, a ne mokra. Prve sadike se pojavijo po štirih do osmih tednih. **Najboljša lokacija:** Vaš rdeči javor bo cenil svetlo, sončno mesto. Možna je tudi lega s svetlo senco - vendar pa neprimerljive jesenske barve najbolje pridejo do izraza na legi na polnem soncu. **Optimalna nega:** Koreninski sistem rdečega javorja se dobro spopada z različnimi talnimi razmerami in prenaša tako suha kot sveže vlažna tla. Vsake dva do tri tedne od maja do avgusta oskrbujte svoj bonsaj s tekočim gnojilom za bonsaj. Z obrezovanjem začnete šele v drugem letu. Da bi dosegli trdno oblikovanje debla, je treba veje skrajšati le enkrat ali dvakrat letno. Na preostalih vejah nove poganjke skrajšamo na dva para brstov, saj sta pri javorju vedno dva brsta obrnjena drug proti drugemu in vsaknaslednji pari so zamaknjeni za 90°. Če popke skrajšamo na dva para, ostane en par, ki je obrnjen v desno, drugi pa v levo, listi pa se med seboj ne motijo. **V zimskem času:** Svetlo jesensko listje odpade zelo pozno. Drevo brez težav prenaša tudi najhujšo zmrzal do -30°C. Vendar jo v mladosti ogroža pozna pozeba, zato jo je treba nekoliko zaščititi z nabiranjem listov.



Arce rojo

Acer rubrum

Bonsái de exterior resistente a heladas, de color rojo en otoño

El arce rojo ofrece una verdadera riqueza de colorido y desarrolla una bonita corona ovalada. El cambio de colorido de las hojas a rojo vivo a comienzos de otoño, trae un poco de veranillo al jardín. Cuando Las hojas brotan son de color bronce y generalmente son de cinco lóbulos y unos 10 centímetros de tamaño. Incluso los árboles jóvenes florecen antes que las hojas broten. Las flores rojas brotan en los tallos delgados en densas inflorescencias y emiten una fragancia ligeramente similar a miel. El arce rojo forma parte de la bandera canadiense. **Ubicación natural**: El origen del arce rojo es principalmente el este de América del Norte, desde la costa atlántica a través de los Apalaches, hasta el borde de la pradera. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Mantenga las semillas durante 3 semanas en el congelador y después durante 24 horas en agua a temperatura ambiente, para hidratarlas y aumentar la germinación de las mismas. Presione las semillas un poco sobre sustrato húmedo y cúbralas ligeramente con el mismo sustrato. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido a 20 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación tardará entre cuatro y ocho semanas. **La mejor ubicación:** El arce rojo agradece un lugar luminoso y soleado. También es posible un sitio con un poco de sombra. Sin embargo, los colores incomparables en otoño se forman especialmente en lugares a pleno sol. **Cuidado óptimo:** El sistema radicular del arce rojo se forma bien con diferentes condiciones de suelo, tolera la sequía, así como lugares húmedos. Desde abril a agosto, cada dos a tres semanas, puede suministrarle fertilizante líquido para bonsái. Puede comenzar con la poda a partir del segundo año. Para obtener un crecimiento sólido del tallo, debe podar las ramas de una a dos veces al año. En las ramas restantes se cortan los brotes nuevos dejando dos pares, porque el arce siembre crece con dos brotes enfrentados y el siguiente par desplazado a 90 grados. Después de la poda se quedan dos pares de brotes, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda y así las hojas no se entorpecerán. **En el invierno:** La caída del follaje brillante se produce muy tarde. El árbol tolera incluso las más duras condiciones de frío, hasta -30 grados sin problemas. Sin embargo, como planta joven es sensible a heladas tardías y debe ser protegido ante las mismas con follaje apilado.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Červený javor
Acer rubrum
Odolná venkovní bonsai s tmavě červenými podzimními barvami

Červený javor je věrný nádech barvy a má krásnou oválnou korunu.Se svým brzkým nástupem plamenně červených podzimních barev přináší trochu babího léta do vaší vlastní zahrady a bytu. Jeho malé, bronzově zbarvené listy jsou obvykle pětilaločné. I velmi mladé stromy kvetou dříve, než vyraší listy. Červené květy pak stojí na štíhlých stoncích v hustých květenstvích a vydávají lehce medovou vůni. Červený javor je mimochodem součástí kanadské vlajky. **Přirozená poloha**: Domov javoru červeného je především na východě Severní Ameriky, od pobřeží Atlantiku přes Apalačské pohoří až po okraj prérie. **Úspěšné pěstování:** Pěstování je možné celoročně. Chcete-li zvýšit klíčivost semen, měli byste je nejprve umístit do mrazáku na tři týdny. Poté je nechte dalších 24 hodin máčet ve vodě pokojové teploty. Semínka mírně zatlačte do vlhké zeminy a jen lehce je zasypte zeminou. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou kolem 20 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. První sazenice se objevují po čtyřech až osmi týdnech. **Nejlepší umístění:** Váš červený javor ocení světlé, slunné místo. Možné je i stanoviště se světlým stínem - nesrovnatelné podzimní barvy však nejlépe vystihují stanoviště na plném slunci. **Optimální péče:** Kořenový systém javoru červeného se dobře vyrovnává s různými půdními podmínkami a snáší suchou i čerstvě vlhkou půdu. Zásobujte své bonsaje tekutým hnojivem pro bonsaje každé dva až tři týdny od května do srpna. Se stříháním byste měli začít až ve druhém roce. Aby bylo dosaženo pevné formace kmene, měly by být větve zkracovány pouze jednou nebo dvakrát ročně. Na zbývajících větvích se nové výhony zkrátí na dva páry pupenů, protože na javoru jsou vždy dva pupeny proti sobě a každýdalší páry jsou posunuty o 90°. Pokud se poupata zkrátí na dva páry, zůstane jeden pár směřující doprava a jeden doleva a listy si navzájem nepřekáží. **V zimě:** Jasné podzimní listí opadává velmi pozdě. Strom bez problémů snáší i ty nejtvrdší mrazy do -30° Celsia. V mládí ji však ohrožuje pozdní mráz, a proto je třeba ji trochu chránit kupením listů.



Kırmızı akçaağaç
Acer rubrum
Koyu kırmızı sonbahar renkleri ile dayanıklı dış mekan bonsai

Kırmızı akçaağaç gerçek bir renk parıltısıdır ve güzel bir oval taç geliştirir.Erken başlayan alev kırmızısı sonbahar renkleri ile kendi bahçenize ve dairenize biraz Kızılderili yazını getirir. Küçük, bronz renkli yaprakları genellikle beş lobludur. Çok genç ağaçlar bile yapraklar filizlenmeden çiçek açar. Kırmızı çiçekler daha sonra yoğun çiçek salkımlarında ince sapların üzerinde durur ve hafif bal benzeri bir koku yayar. Bu arada, kırmızı akçaağaç Kanada bayrağının bir parçasıdır. **Doğal konum**: Kırmızı akçaağacın anavatanı, Atlantik kıyılarından Appalachian Dağları'na ve bozkırların kenarına kadar, esas olarak Kuzey Amerika'nın doğusundadır. **Başarılı yetiştirme:** Yetiştirme tüm yıl boyunca mümkündür. Tohumların çimlenmesini artırmak için önce üç hafta boyunca dondurucuya koymalısınız. Daha sonra 24 saat daha oda sıcaklığında suda bekletin. Tohumları nemli saksı toprağına hafifçe bastırın ve saksı toprağı ile üzerlerini sadece hafifçe örtün. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum saksısını yaklaşık 20° Santigrat ile hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak tutmayın. İlk fideler dört ila sekiz hafta sonra ortaya çıkar. **En iyi konum:** Kırmızı akçaağacınız parlak, güneşli bir yeri takdir edecektir. Açık gölgeli bir konum da mümkündür - ancak, eşsiz sonbahar renkleri en iyi şekilde tam güneş alan bir konumda ifade edilir. **Optimum bakım:** Kırmızı akçaağacın kök sistemi, farklı toprak koşullarıyla iyi başa çıkar ve hem kuru hem de taze nemli toprağı tolere eder. Bonsai'nize Mayıs'tan Ağustos'a kadar her iki ila üç haftada bir sıvı bonsai gübresi verin. İkinci yıla kadar budamaya başlamamalısınız. Sağlam bir gövde oluşumu elde etmek için dallar yılda sadece bir veya iki kez kısaltılmalıdır. Kalan dallarda, yeni sürgünler iki çift tomurcuk olarak kısaltılır, çünkü akçaağaçta her zaman birbirine bakan iki tomurcuk vardır ve her birisonraki çiftler 90° kaydırılır. Tomurcuklar iki çift olacak şekilde kısaltılırsa sağı ve solu gösteren bir çift kalır ve yapraklar birbirini engellemez. **Kışın:** Parlak sonbahar yaprakları çok geç dökülür. Ağaç, -30°C'ye kadar olan en sert don koşullarını bile sorunsuz bir şekilde tolere eder. Bununla birlikte, gençken geç don nedeniyle tehlike altındadır ve bu nedenle yaprakların üst üste yığılmasıyla bir şekilde korunmalıdır.



Vörös juhar
Acer rubrum
Hardy kültéri bonsai mélyvörös őszi színekkel

A vörös juhar igazi színfolt, és gyönyörű ovális koronát fejleszt.Korán megjelenő lángvörös őszi színeivel egy kis indiai nyarat visz saját kertjébe és lakásába. Kicsi, bronz színű levelei általában ötkaréjosak. Még a nagyon fiatal fák is virágoznak, mielőtt a levelek kihajtanak. A vörös virágok ezután a karcsú száron sűrű virágzatban állnak, és enyhén mézszerű illatot árasztanak. A vörös juhar egyébként a kanadai zászló része. **Természetes elhelyezkedés**: A vörös juhar főként Észak-Amerika keleti részén található, az Atlanti-óceán partjától az Appalache-hegységen át a préri széléig. **Sikeres termesztés:** Termesztése egész évben lehetséges. A magvak csírázásának fokozása érdekében először három hétre fagyasztóba kell helyezni. Ezután hagyja őket szobahőmérsékleten vízben ázni további 24 órán át. Enyhén nyomja a magokat a nedves virágföldbe, és csak enyhén takarja be őket a virágfölddel. Fedje le a tenyészedényt ragasztófóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg, körülbelül 20 °C-os helyre, és tartsa a virágföldet nedvesen, de ne nedvesen. Az első palánták négy-nyolc hét után jelennek meg. **A legjobb hely:** A vörös juhar értékelni fogja a világos, napos helyet. Világos árnyalatú helyszín is lehetséges – azonban a páratlan őszi színek legjobban a teljes napsütéses helyen jelennek meg. **Optimális gondozás:** A vörös juhar gyökérrendszere jól megbirkózik a különböző talajviszonyokkal, és elviseli a száraz és frissen nedves talajt egyaránt. Májustól augusztusig két-három hetente lássa el bonsait folyékony bonsai műtrágyával. **Télen:** A fényes őszi levelek nagyon későn hullanak le. A fa a legkeményebb fagyot is gond nélkül tolerálja -30°C-ig. Fiatalon azonban veszélyezteti a késői fagy, ezért némileg védeni kell levelek felhalmozásával.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved

ベニカエデ

Acer rubrum

深紅の紅葉と耐寒性のある屋外盆栽

ベニカエデは素晴らしく華麗な色彩で華やかな楕円形の樹幹を形成します。秋には素晴らしい紅葉で、あなたの庭に小春日和のような雰囲気を与えてくれます。初期の小さなブロンズ色の葉は基本的に5つの裂片があります。若い苗木でも細い茎についた太い花序に蜂蜜のような香りを持つ赤い花を咲かせます。ベニカエデはカナダの旗印でもあります。

自然な場所: 生息地は大西洋沿岸からアパラチア山脈平野に至るまで、北アメリカ東部を中心に分布しています。

栽培成功:
種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を高めるために、最初に種を冷凍庫で3週間保管し、その後、温水に24時間浸します。湿った用土に種を軽く押し込み、その上から少量の用土をかぶせます。乾燥を防ぐためサランラップなどの透明フィルムでカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2～3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20℃くらいの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常は約4〜8週間後に発芽します。

最高のロケーション:
明るく日当たりの良い場所を好みます。少々の日陰でも保管できます；日当たりの良い場所に置くことで、素晴らしい紅葉が可能になります。

最適なケア:
ほとんどのタイプの土壌に簡単に対応し、乾燥した土壌または新鮮な湿った土壌にも対処します。5月～8月の間に盆栽用の液体肥料を2～3週間ごとに与えることもできます。
剪定は2年目以降から行うべきです。しっかりとした幹を形成するために、枝は1年に1～2回以上は剪定しないでください。残りの小枝については、2組の芽を残して新芽を摘芯できます。これは、ベニカエデが常に2つの芽を向かい合わせ次の1対の芽が90度シフトするためです。2組の芽を残して剪定する場合は、1対の芽は左方向にもう1対は右方向に向くようにします - つまり、葉はお互いに邪魔をすることなく成長します。

冬に:
かなり遅くに光沢のある紅葉した葉を散らします。マイナス30℃までの完全な耐寒性を備えていますが、最初の年は遅霜に備えて、土壌を枝葉などで保護する必要があります。

SKU: 14138 / Rotahorn

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved