SKU: 13311 Mähnengerste



© Matt Lavin - CC-BY-SA-2.0

Tips

Hordeum jubatum

Български	BG	2	
Dansk	DK	2	
Deutsch	DE	2	
English	UK	2	
Eesti	EE	3	
Suomalainen	FI	3	
Français	FR	3	
Ελληνική	GR	3	
Gaeilge	IE	4	
íslenskur	IS	4	
Italiano	IT	4	
Hrvatski	HR	4	
Latviešu	LV	5	
Lietuvių kalba	LT	5	
Malti	MT	5	
Nederlands	NL	5	
Norsk	NO	6	
Polski	PL	6	
Português	PT	6	
Românesc	RO	6	
Svenska	SE	7	
Slovensky	SK	7	
Slovenski	SI	7	
Español	ES	7	
Česky	CZ	8	
Türkçe	TR	8	
Magyar	HU	8	
日本語	JP	9	

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Грива ечемик
Hordeum jubatum
Сребърни шипове с червеникав есенен цвят

Гривистият ечемик е многогодишен вид ечемик, който достига до 60 сантиметра височина, но обикновено се отглежда като едногодишен поради ниската му устойчивост на замръзване. Листата му са зелени и меко надвиснали през лятото, а сребристите му шипове с дълги остриета, които цъфтят от юни до август, стават бежови и често с лек червен оттенък в края на лятото. Тревата работи особено добре, когато е засадена на групи. Декоративните съцветия могат да се използват и за сухи букети. **Естествено местоположение**: Произходът на ечемика е в Аляска и Канада - но се среща и в Източна Азия. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена е възможно на закрито през цялата година. Въпреки това, за едногодишно отношение се препоръчва култивиране в началото на пролетта. Просто натиснете семената върху влажен субстрат за отглеждане, който предварително сте смесили с 25% перлит за подобряване. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията на светло и топло място с температура между 20° и 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра, като я навлажнявате с водна пулверизатор, в идеалния случай всеки ден. Обикновено са необходими две до три седмици, за да покълнат. **Най-доброто местоположение:** Гривистият ечемик предпочита слънчево и топло място. **Оптимална грижа:** Гривата предпочита богата на хранителни вещества почва, която дори може да бъде леко солена поради толерантността на растението към сол. През лятото тревата трябва да е твърде суха, а не прекалено влажна, тъй като не може да се справи добре с преовлажняването. През вегетационния период трябва да наторявате редовно от май до късна есен. **През зимата:** В топли места с мека зима гривата може да се отглежда няколко години с подходяща зимна защита. Обикновено се съхранява като едногодишно.



Mankebyg
Hordeum jubatum
Sølvpigge med rødlig efterårsfarve

Manebyg er en flerårig bygtype, der bliver op til 60 centimeter høj, men som normalt dyrkes som enårig på grund af dens lave frostbestandighed. Dens blade er grønne og blødt udhængende om sommeren, og dens sølvpigge med lange markiser, som blomstrer fra juni til august, bliver beige og ofte med et let rødt skær sidst på sommeren. Græsset fungerer særligt godt, når det plantes i grupper. De dekorative blomsterstande kan også bruges til tørrede buketter. **Naturlig beliggenhed**: Oprindelsen af mankebyg er i Alaska og Canada – men den forekommer også i Østasien. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø er mulig indendørs hele året rundt. Men for en etårig holdning anbefales dyrkning i det tidlige forår. Tryk blot frøene på fugtigt vækstsubstrat, som du tidligere har blandet med 25 % perlit for at forbedre. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil potten et lyst og varmt sted med en temperatur mellem 20° og 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd, ved at fugte den med en vandforstøver, helst hver dag. Det tager normalt to til tre uger at spire. **Den bedste beliggenhed:** Den manede byg foretrækker et solrigt og varmt sted. **Optimal pleje:** Manegræs foretrækker en næringsrig jord, som endda kan være let saltholdig på grund af plantens salttolerance. Om sommeren skal græsset hellere være for tørt end for fugtigt, da det ikke kan klare vandladning godt. I vegetationsperioden bør du gøde regelmæssigt fra maj til sent på efteråret. **Om vinteren:** På varme steder med milde vintre kan mankegræs dyrkes i flere år med passende vinterbeskyttelse. Det holdes normalt som et årligt.



Mähnengerste
Hordeum jubatum
Silberne Ährenbüschel mit rötlicher Herbstfärbung

Die Mähnengerste ist eine bis zu 60 Zentimeter hoch wachsende, mehrjährige Gerstenart, die aufgrund ihrer geringen Frostresistenz zumeist allerdings einjährig gezogen wird. Ihre Laubblätter sind im Sommer grün und weich überhängend und ihre silbernen Ährenbüschel mit den langen Grannen, die von Juni bis August erblühen, färben sich zum Ende des Sommers beige und oft mit einem leichten Rotstich. Das Gras wirkt besonders gut wenn es Gruppen gepflanzt wird. Die dekorativen Blütenstände können auch gut für Trockensträuße verwendet werden. **Naturstandort**: Der Ursprung der Mähnengerste liegt in Alaska und Kanada - es kommt aber auch in Ostasien vor. **Anzucht:** Die Anzucht aus Samen ist im Haus das ganze Jahr über möglich. Allerdings empfiehlt sich für eine einjährige Haltung die Anzucht im zeitigen Frühjahr. Drücken Sie die Samen einfach auf feuchtes Anzuchtsubstrat, dass Sie vorher zur Verbesserung mit 25% Perlite vermischen. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit einer Temperatur zwischen 20° und 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass, indem Sie sie am besten täglich etwas mit einem Wassersprüher nachfeuchten. Bis zur Keimung vergehen in der Regel zwei bis drei Wochen. Im Mai kann es dann ins Freiland umgesetzt werden, muss aber anfangs noch vor späten Nachtfrösten geschützt werden. **Standort:** Die Mähnengerste bevorzugt einen sonnigen und warmen Standort. **Pflege:** Mähnengras bevorzugt einen nährstoffreichen Boden, der aufgrund der Salztoleranz der Pflanze sogar leicht salzhaltig sein kann. Im Sommer sollte das Gras eher zu trocken als zu feucht stehen, da es mit Staunässe nicht gut umgehen kann. Während der Vegetationsperiode sollten Sie ab Mai bis in den Spätherbst regelmäßig etwas düngen. **Im Winter:** In warmen Lagen mit milden Wintern kann das Mähnengras mit einem entsprechenden Winterschutz mehrjährig kultiviert werden. Normalerweise wird es aber einjährig gehalten.



Foxtail Barley / Squirrel Tail
Hordeum jubatum
Silvery grass seed heads with reddish autumn coloration

The Foxtail Barley is an up to 60 cm tall, perennial barley variety that is due to its limited frost resistance often be cultivated as an annual plant. Its soft, overhanging foliage leaves have a green coloration during summer, while the from June until August blooming, aristate silvery grass seed heads change their colouring with the end of summer to beige with a reddish touch. The weed shows best to advantage, when planted in a group. The decorative inflorescences are suited for dry flower bouquets as well. **Natural location**: The Foxtail Barley has its natural habitat in Alaska and Canada, but it can also be found in East Asia. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. However, for the annual cultivation it is recommended starting the propagation in early spring. Gently press the seeds into moist potting compost that ideally contains about 25% of perlite for a better permeation. Cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out, but don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20° and 25° Celsius and keep the earth moist, but not wet. The best way to do so, is by daily using the water sprayer to moisten the soil. Usually it takes about two to three weeks until germination. In May, the Foxtail Barley can be planted out, but it has to be protected against possible late night-frosts. **The best location:** The Foxtail Barley prefers a warm and sunny place to be kept. **Optimal care:** The Foxtail Barley prefers a nutritious soil and even tolerates a slightly salty earth. In the summer, it should be kept rather dry than moist since it doesn't do well with waterlogging. From May until late autumn, during the growth period, you should provide the plant regularly with some fertilizer. **In the winter:** In temperate regions with a mild winter, the Foxtail Barley can be cultivated with a proper protection as perennial plant, but usually it is annual.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Lakk oder
Hordeum jubatum
Hõbedased punaka sügisvärviga naelu

Maned oder on mitmeaastane odratüüp, mis kasvab kuni 60 sentimeetri kõrguseks, kuid mida kasvatatakse madala külmakindluse tõttu tavaliselt üheaastasena. Selle lehed on rohelised ja suviti pehmelt üle ulatuvad ning juunist augustini õitsevad pikkade aasidega hõbedased ogad, mis muutuvad suve lõpus beežiks ja sageli kergelt punase varjundiga. Eriti hästi mõjub muru rühmadena istutatuna. Dekoratiivseid õisikuid saab kasutada ka kuivatatud kimpude jaoks. **Looduslik asukoht**: Laki odra päritolu on Alaskal ja Kanadas – kuid seda esineb ka Ida-Aasias. **Edukas kasvatamine:** Seemnest kasvatamine on võimalik siseruumides aastaringselt. Kuid üheaastase suhtumise jaoks on soovitatav kasvatada varakevadel. Lihtsalt suruge seemned niiskele kasvupinnale, mille olete eelnevalt parandamiseks seganud 25% perliidiga. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage pott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur jääb vahemikku 20–25 °C, ning hoidke potimuld niiske, kuid mitte märjana, niisutades seda veepihustiga, ideaalis iga päev. Tavaliselt kulub idanemiseks kaks kuni kolm nädalat. **Parim asukoht:** Lakk-oder eelistab päikeselist ja sooja kasvukohta. **Optimaalne hooldus:** Lakkhein eelistab toitaineterikast mulda, mis võib taime soolataluvuse tõttu olla isegi kergelt soolane. Suvel peaks muru olema pigem liiga kuiv kui liiga niiske, kuna see ei talu vettimist hästi. Vegetatsiooniperioodil tuleks regulaarselt väetada maist hilissügiseni. **Talvel:** Pehme talvega soojades kasvukohtades võib sobiva talvekaitsega lakkheina kasvatada mitu aastat. Tavaliselt peetakse seda iga-aastaseks.



Harja ohra
Hordeum jubatum
Hopeiset piikit punertavan syysvärin kanssa

Harjaohra on monivuotinen ohralaji, joka kasvaa jopa 60 senttimetriä korkeaksi, mutta sitä viljellään yleensä yksivuotisena sen alhaisen pakkaskestävyyden vuoksi. Sen lehdet ovat vihreitä ja pehmeästi ulkonevia kesällä ja sen hopeiset piikit, joissa on pitkät awns, jotka kukkivat kesäkuusta elokuuhun, muuttuvat beigeiksi ja usein hieman punaisiksi kesän lopussa. Ruoho toimii erityisen hyvin ryhmissä istutettuna. Koristeellisia kukintoja voidaan käyttää myös kuivattuihin kukkakimppuihin. **Luonnollinen sijainti**: Harjaohran alkuperä on Alaskassa ja Kanadassa - mutta sitä esiintyy myös Itä-Aasiassa. **Onnistunut viljely:** Siemenestä viljely on mahdollista sisätiloissa ympäri vuoden. Yhden vuoden asenteelle suositellaan kuitenkin viljelyä aikaisin keväällä. Yksinkertaisesti paina siemenet kostealle kasvualustalle, johon olet aiemmin sekoittanut 25 % perliittiä parantaaksesi. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta ruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä ruukkumulta kosteana, mutta ei märkänä kostuttamalla sitä vesisumuttimella, mieluiten joka päivä. Itäminen kestää yleensä kahdesta kolmeen viikkoa. **Paras sijainti:** Harjaohra suosii aurinkoista ja lämmintä paikkaa. **Optimaalinen hoito:** Harjaruoho suosii ravinteikasta maaperää, joka voi olla jopa hieman suolaista kasvin suolansietokyvyn vuoksi. Kesällä ruohon tulee olla mieluummin liian kuivaa kuin liian kosteaa, koska se ei kestä kastumista hyvin. Kasvukauden aikana sinun tulee lannoittaa säännöllisesti toukokuusta myöhään syksyyn. **Talvella:** Lämpimissä paikoissa, joissa talvi on leuto, harjanurmikkaa voidaan viljellä useiden vuosien ajan sopivalla talvisuojauksella. Se pidetään yleensä vuosittaisena.



Orge à crinière
Hordeum jubatum
Des épis argentés avec une coloration rouge en automne

L'orge à crinière est une orge vivace qui atteint une hauteur de 60 centimètres qui est souvent considérée comme une orge annuelle en raison de sa faible rusticité. Ses feuilles sont vertes en été et douces en surplomb, et ses bottillons argentés, avec les longs poils qui fleurissent de juin à août, se colorent en beige en fin d'été et souvent avec un reflet rouge. L'herbe est belle lorsqu'elle est plantée en groupe. Les inflorescences décoratives peuvent aussi être utilisées pour des bouquets de fleurs séchées. **Emplacement naturel**: L'orge à crinière vient de l'Alaska et du Canada, mais se trouve aussi en Asie de l'Est. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Cependant, il est conseillé de commencer la culture en début de printemps pour un entretien annuel. Apuuyez les graines sur du substrat humide que vous mélangez avec 25% de perlite pour améliorer la culture. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé en humidifiant de préférence tous les jours avec de l'eau pulvérisée. La germination a lieu après deux à trois semaines en général. En mai, la plante peut être mise dans le jardin, mais elle doit encore être protégée des gels de nuit tardifs au départ. **Le meilleur emplacement:** L'orge à crinière préfère un emplacement ensoleillé et chaud. **Soins optimaux:** L'orge à crinière a besoin de terres nutritives qui peuvent être légèrement salines en raison de la tolérance de la salinité de la plante. En été, l'orge doit être plutôt trop sèche que trop humide, car elle ne supporte pas l'eau stagnante. Vous devez régulièrement engraisser la plante un peu pendant la période de végétation de mai jusqu'en fin d'automne. **En hiver:** L'orge à crinière peut être cultivée en vivace dans des endroits chauds avec des hivers doux avec une protection hivernale correspondante. Par contre, elle est normalement entretenue comme plante annuelle.



Κριθάρι χαίτης
Hordeum jubatum
Ασημί καρφιά με κοκκινωπό φθινοπωρινό χρώμα

Το κριθάρι με χαίτη είναι ένα πολυετές είδος κριθαριού που αναπτύσσεται έως και 60 εκατοστά σε ύψος, αλλά συνήθως καλλιεργείται ως ετήσιο λόγω της χαμηλής αντοχής του στον παγετό. Τα φύλλα του είναι πράσινα και απαλά προεξέχουν το καλοκαίρι και οι ασημένιες αιχμές του με μακριές τέντες, που ανθίζουν από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο, γίνονται μπεζ και συχνά με μια ελαφριά κόκκινη απόχρωση στο τέλος του καλοκαιριού. Το γρασίδι λειτουργεί ιδιαίτερα καλά όταν φυτεύεται σε ομάδες. Οι διακοσμητικές ταξιανθίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για αποξηραμένα μπουκέτα. **Φυσική τοποθεσία**: Η προέλευση του κριθαριού χαίτης είναι στην Αλάσκα και τον Καναδά - αλλά εμφανίζεται και στην Ανατολική Ασία. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους είναι δυνατή σε εσωτερικούς χώρους όλο το χρόνο. Ωστόσο, για μια στάση ενός έτους, συνιστάται καλλιέργεια στις αρχές της άνοιξης. Απλώς πιέστε τους σπόρους σε υγρό υπόστρωμα ανάπτυξης που έχετε αναμείξει προηγουμένως με περλίτη 25% για βελτίωση. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινόχαρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα φωτεινό και ζεστό μέρος με θερμοκρασία μεταξύ 20° και 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό, βρέχοντάς το με έναν ψεκαστήρα νερού, ιδανικά κάθε μέρα. Συνήθως χρειάζονται δύο έως τρεις εβδομάδες για να βλαστήσει. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Το κριθάρι με χαίτη προτιμά μια ηλιόλουστη και ζεστή τοποθεσία. **Βέλτιστη φροντίδα:** Το χόρτο χαίτης προτιμά ένα έδαφος πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, το οποίο μπορεί να είναι ακόμη και ελαφρώς αλατούχο λόγω της ανοχής του φυτού στο αλάτι. Το καλοκαίρι, το γρασίδι πρέπει να είναι πολύ στεγνό και όχι πολύ υγρό, καθώς δεν μπορεί να διαχειριστεί καλά την υπερχείλιση. Κατά την περίοδο της βλάστησης, θα πρέπει να λιπάνετε τακτικά από τον Μάιο μέχρι τα τέλη του φθινοπώρου. **Το χειμώνα:** Σε ζεστές τοποθεσίες με ήπιους χειμώνες, το γρασίδι χαίτης μπορεί να καλλιεργηθεί για αρκετά χρόνια με κατάλληλη χειμερινή προστασία. Συνήθως διατηρείται ως ετήσιο.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Mane eorna
Hordeum jubatum
Spící airgid le dath an fhómhair reddish

Is cineál eorna ilbhliantúil é eorna maned a fhásann suas le 60 ceintiméadar ar airde, ach is gnách go bhfástar é mar bhliain bhliantúil mar gheall ar a fhriotaíocht íseal sioc. Tá a dhuilleoga glas agus bog ar crochadh sa samhradh agus a spící airgid le ruainne fada, a bhláth ó Mheitheamh go Lúnasa, cas beige agus go minic le tinge beag dearg ag deireadh an tsamhraidh. Oibríonn an féar go háirithe go maith nuair a chuirtear i ngrúpaí é. Is féidir na inflorescences maisiúla a úsáid freisin le haghaidh bouquets triomaithe. **Suíomh nádúrtha**: Tá bunús eorna mane in Alasca agus i gCeanada - ach tá sé le fáil in Oirthear na hÁise freisin. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ón síol taobh istigh ar feadh na bliana. Mar sin féin, le haghaidh dearcadh bliana, moltar saothrú go luath san earrach. Níl le déanamh ach na síolta a bhrú ar an tsubstráit atá ag fás tais a mheasc tú roimhe seo le 25% perlite chun feabhas a chur air. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnla a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota in áit gheal agus te le teocht idir 20 ° agus 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ná bíodh sé fliuch trí é a thaisiú le spraeire uisce, go hidéalach gach lá. De ghnáth tógann sé dhá nó trí seachtaine chun péacadh. **An suíomh is fearr:** Is fearr leis an eorna maned suíomh grianmhar agus te. **Cúram is fearr is féidir:** Is fearr le féar mane ithir cothaitheach-saibhir, is féidir a bheith fiú beagán saline mar gheall ar chaoinfhulaingt salann an phlanda. Sa samhradh, ba chóir go mbeadh an féar ró-thirim seachas ró-thaise, mar ní féidir leis an uisce faoi uisce a láimhseáil go maith. Le linn na tréimhse fásra, ba chóir duit toirchiú go rialta ó Bhealtaine go dtí deireadh an fhómhair. **Sa gheimhreadh:** In áiteanna te le geimhreadh éadrom, is féidir féar mane a chothú ar feadh roinnt blianta le cosaint geimhridh chuí. De ghnáth coimeádtar é mar bhliantúil.



Faxi bygg
Hordeum jubatum
Silfurbrodda með rauðleitum haustlit

Maned bygg er ævarandi byggtegund sem verður allt að 60 sentimetrar á hæð, en er venjulega ræktað árlegt vegna lítillar frostþols. Blöðin eru græn og liggja mjúklega yfir á sumrin og silfurbrodda með löngum tjöldum, sem blómgast frá júní til ágúst, verða drapplituð og oft með smá rauðum blæ í lok sumars. Grasið virkar sérstaklega vel þegar það er gróðursett í hópum. Einnig er hægt að nota skrautblómin í þurrkaða kransa. **Náttúruleg staðsetning**: Uppruni faxabyggsins er í Alaska og Kanada - en það kemur einnig fyrir í Austur-Asíu. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræi er möguleg innandyra allt árið um kring. Hins vegar, fyrir eins árs viðhorf, er mælt með ræktun snemma á vorin. Þrýstið fræjunum einfaldlega á rakt vaxandi undirlag sem þú hefur áður blandað saman við 25% perlít til að bæta. Hyljið ræktunarílátið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu pottinn á björtum og hlýjum stað með hita á milli 20° og 25° á Celsíus og haltu pottajarðveginum rökum en ekki blautum með því að væta hann með vatnsúða, helst á hverjum degi. Það tekur venjulega tvær til þrjár vikur að spíra. **Besta staðsetningin:** The maned bygg kýs sólríka og hlýja stað. **Besta umönnun:** Mane gras vill helst næringarríkan jarðveg, sem getur jafnvel verið örlítið saltlaus vegna saltþols plöntunnar. Á sumrin ætti grasið að vera of þurrt frekar en of rakt þar sem það þolir ekki vatnsrennsli. Á gróðurtímabilinu ættir þú að frjóvga reglulega frá maí til síðla hausts. **Á veturna:** Á hlýjum stöðum með mildum vetrum er hægt að rækta makagras í nokkur ár með viðeigandi vetrarvernd. Það er venjulega haldið sem árlegt.



Orzo crinito
Hordeum jubatum
Spighe argentee che si colorano di rosso in autunno

L'Orzo crinito è una specie di orzo che cresce fino a 60 centimetri di altezza, è pluriennale, ma a causa della scarsa resistenza al freddo molto spesso risulta annuale. Il fogliame è verde in estate, leggermente sporgente, mentre alla fine dell'estate le spighe argentee dalle lunghe ariste, che fioriscono da giugno ad agosto, si tingono di beige e rossastro. Questa pianta riesce particolarmente bene se piantata in gruppetti. Le decorative infiorescenze vengono utilizzate anche per composizioni di fiori secchi. **Posizione naturale**: L'areale dell'Orzo crinito si trova in Alaska e Canada, ma anche in Asia orientale. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Per una coltivazione annuale si consiglia di seminare all'inizio della primavera. Distribuite i semi sulla terra di coltivo umida, che avrete migliorato mischiandola con perlite al 25%. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura tra i 20° e i 25° C, mantenete la terra umida ma non bagnata, preferibilmente usando quotidianamente uno spruzzino per inumidirla. La germinazione avviene di norma da due a tre settimane dopo. In maggio può essere trapiantato all'aperto, con un'adeguata protezione per eventuali gelate notturne tardive. **La posizione migliore:** L'Orzo crinito predilige un ambiente soleggiato e caldo. **Cura ottimale:** L'Orzo crinito ha bisogno di un terreno ricco di sostanze nutritive e con un basso contenuto di sale, poiché la pianta tollera poco questa sostanza. In estate predilige la siccità alla terra troppo umida, perché teme i ristagni idrici. Durante il periodo vegetativo, a partire da maggio fino al tardo autunno, è consigliabile concimare poco e regolarmente. **In inverno:** In zone calde dagli inverni miti l'Orzo crinito può essere coltivato come pianta pluriennale, con un'adeguata protezione per l'inverno. Normalmente, tuttavia, viene mantenuto come pianta annuale.



Grivasti ječam
Hordeum jubatum
Srebrni šiljci s crvenkastom jesenskom bojom

Grivasti ječam je višegodišnja vrsta ječma koja naraste do 60 centimetara u visinu, ali se najčešće uzgaja kao jednogodišnja biljka zbog niske otpornosti na mraz. Listovi su mu zeleni i nježno se nadvijaju ljeti, a srebrni klasovi s dugim osama, koji cvjetaju od lipnja do kolovoza, na kraju ljeta poprimaju bež boju i često s blagom crvenom nijansom. Trava posebno dobro djeluje kada se sadi u skupinama. Ukrasni cvatovi mogu se koristiti i za suhe bukete. **Zemlja porijekla**: Podrijetlo grivastog ječma je na Aljasci i u Kanadi - ali također se pojavljuje u istočnoj Aziji. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena moguć je u zatvorenom tijekom cijele godine. Međutim, za jednogodišnji stav preporuča se uzgoj u rano proljeće. Jednostavno pritisnite sjeme na vlažnu podlogu za uzgoj koju ste prethodno pomiješali s 25% perlita za poboljšanje. Posudu s kulturom prekrijte prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite lonac na svijetlo i toplo mjesto s temperaturom između 20° i 25° Celzija i održavajte tlo za lonce vlažnim, ali ne mokrim tako da ga navlažite raspršivačem vode, idealno svaki dan. Obično je potrebno dva do tri tjedna da proklija. **Najbolja lokacija:** Grivasti ječam voli sunčano i toplo mjesto. **Optimalna njega:** Grivasta trava preferira tlo bogato hranjivim tvarima, koje čak može biti blago slano zbog tolerancije biljke na sol. Ljeti bi trava trebala biti presuha, a ne prevlažna, jer ne može dobro podnijeti vlaženje. Tijekom vegetacije potrebno je redovito gnojiti od svibnja do kasne jeseni. **U zimi:** U toplim područjima s blagim zimama, grivasta trava može se uzgajati nekoliko godina uz odgovarajuću zimsku zaštitu. Obično se čuva kao jednogodišnja biljka.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Krēpes mieži
Hordeum jubatum
Sudraba tapas ar sarkanīgu rudens krāsu

Krēpējmieži ir daudzgadīgs miežu veids, kas izaug līdz 60 centimetriem augsti, bet zemās salizturības dēļ parasti tiek audzēti kā viengadīgi. Vasarā tās lapas ir zaļas un maigi nokarenas, un sudrabainās smailes ar garām aunām, kas zied no jūnija līdz augustam, vasaras beigās kļūst smilškrāsas un bieži vien ar vieglu sarkanu nokrāsu. Īpaši labi zāle darbojas, ja to stāda grupās. Dekoratīvās ziedkopas var izmantot arī kaltētiem pušķiem. **Dabiska vieta**: Krēpes miežu izcelsme ir Aļaskā un Kanādā, bet tā sastopama arī Austrumāzijā. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām ir iespējama telpās visu gadu. Tomēr viena gada attieksmei ieteicams kultivēt agrā pavasarī. Vienkārši uzspiediet sēklas uz mitras augšanas substrāta, kuru iepriekš esat sajaucis ar 25% perlītu, lai uzlabotu. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru no 20° līdz 25° pēc Celsija un saglabājiet podiņu zemi mitru, bet ne mitru, mitrinot to ar ūdens smidzinātāju, ideālā gadījumā katru dienu. Parasti dīgšanai nepieciešamas divas līdz trīs nedēļas. **Labākā atrašanās vieta:** Krēpes mieži dod priekšroku saulainai un siltai vietai. **Optimāla aprūpe:** Krēpes zāle dod priekšroku barības vielām bagātai augsnei, kas var būt pat nedaudz sāļaina, jo augs ir izturīgs pret sāli. Vasarā zālei jābūt pārāk sausai, nevis pārāk mitrai, jo tā nevar labi izturēt ūdens aizsērēšanu. Veģetācijas periodā regulāri jāmēslo no maija līdz vēlam rudenim. **Ziemā:** Siltās vietās ar maigām ziemām krēpju zāli var kultivēt vairākus gadus ar atbilstošu ziemas aizsardzību. Tas parasti tiek turēts kā ikgadējs.



Mähnengerste
Hordeum jubatum
Silberne Ährenbüschel mit rötlicher Herbstfärbung

Maned miežiai – daugiametė miežių rūšis, užauganti iki 60 centimetrų aukščio, tačiau dėl mažo atsparumo šalčiui dažniausiai auginama kaip vienmečiai. Vasarą jo lapai yra žali ir švelniai išsikišę, o sidabriniai spygliai su ilgomis aknemis, kurios žydi nuo birželio iki rugpjūčio, vasaros pabaigoje pasidaro smėlio spalvos ir dažnai su šiek tiek raudonu atspalviu. Žolė ypač gerai veikia sodinant grupėmis. Dekoratyviniai žiedynai gali būti naudojami ir džiovintoms puokštėms. **Natūrali vieta**: Karčių miežių kilmė yra Aliaskoje ir Kanadoje, tačiau jų pasitaiko ir Rytų Azijoje. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų galima ištisus metus. Tačiau vienerių metų požiūriui rekomenduojama auginti anksti pavasarį. Tiesiog prispauskite sėklas ant drėgno auginimo substrato, kurį anksčiau sumaišėte su 25% perlitu, kad pagerintumėte. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Padėkite vazoną šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra nuo 20° iki 25° Celsijaus, o vazono žemę laikykite drėgną, bet ne šlapią, drėkindami ją vandens purkštuvu, geriausia kiekvieną dieną. Paprastai sudygsta nuo dviejų iki trijų savaičių. **Geriausia vieta:** Karštieji miežiai mėgsta saulėtą ir šiltą vietą. **Optimali priežiūra:** Karčios žolė mėgsta maistinių medžiagų turtingą dirvą, kuri dėl augalo druskų toleravimo gali būti net šiek tiek druskinga. Vasarą žolė turėtų būti per sausa, o ne per drėgna, nes ji negali gerai susidoroti su užmirkimu. Vegetacijos laikotarpiu reikia reguliariai tręšti nuo gegužės iki vėlyvo rudens. **Žiemą:** Šiltose vietose su švelniomis žiemomis karčių žolė gali būti auginama keletą metų su tinkama žiemos apsauga. Paprastai jis laikomas metiniu.



Xgħir tal-mane
Hordeum jubatum
Spikes tal-fidda b'kulur ħamrani tal-ħarifa

Ix-xgħir tal-maned huwa tip ta 'xgħir perenni li jikber sa 60 ċentimetru għoli, iżda ġeneralment jitkabbar bħala annwali minħabba r-reżistenza baxxa tiegħu għall-ġlata. Il-weraq tiegħu huma ħodor u mdendlin ippronunzjati fis-sajf u spikes tal-fidda tiegħu bi awns twal, li jiffjorixxu minn Ġunju sa Awwissu, isiru beige u ħafna drabi b'lewn aħmar ħafif fl-aħħar tas-sajf. Il-ħaxix jaħdem tajjeb speċjalment meta jitħawlu fi gruppi. Il-fjorituri dekorattivi jistgħu jintużaw ukoll għal bukketti mnixxfa. **Post naturali**: L-oriġini tax-xgħir tal-mane tinsab fl-Alaska u l-Kanada - iżda jseħħ ukoll fl-Asja tal-Lvant. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żerriegħa huwa possibbli ġewwa s-sena kollha. Madankollu, għal attitudni ta 'sena, il-kultivazzjoni fil-bidu tar-rebbiegħa hija rakkomandata. Sempliċement agħfas iż-żrieragħ fuq sottostrat ta 'tkabbir niedi li qabel ħallat ma' 25% perlit biex ittejjeb. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovdi b'toqob. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxef. Għandek tneħħi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma f'post qawwi u sħun b'temperatura ta' bejn 20° u 25° Celsius u żomm il-ħamrija tal-qsari niedja iżda mhux imxarrba billi xarrabha bi sprejer tal-ilma, idealment kuljum. Normalment tieħu ġimagħtejn sa tliet ġimgħat biex tiġġermina. **L-aħjar post:** Ix-xgħir tal-maned jippreferi sit xemxi u sħun. **Kura ottimali:** Il-ħaxix tal-mane jippreferi ħamrija b'ħafna nutrijenti, li tista 'saħansitra tkun kemmxejn salina minħabba t-tolleranza tal-melħ tal-pjanta. Fis-sajf, il-ħaxix għandu jkun niexef wisq aktar milli niedja wisq, peress li ma jistax jimmaniġġja l-ilma tajjeb. Matul il-perjodu tal-veġetazzjoni, għandek tiffertilizza regolarment minn Mejju sal-aħħar tal-ħarifa. **Fix-xitwa:** F'postijiet sħan bi xtiewi ħfief, il-ħaxix tal-mane jista 'jiġi kkultivat għal diversi snin bi protezzjoni xierqa tax-xitwa. Normalment jinżamm bħala annwali.



Gras Bamboe Manen Gerst
Hordeum jubatum
Zilveren plukjes oren met roodachtige herfstkleuren

Manengerst is een meerjarige gerstsoort die tot 60 centimeter hoog wordt, maar vanwege de lage vorstbestendigheid meestal als eenjarige wordt geteeld. De bladeren zijn groen en lichtjes overhangend in de zomer en hun zilveren plukjes oren met lange luifels, die bloeien van juni tot augustus, worden tegen het einde van de zomer beige, vaak met een licht roodachtige tint. Het gras doet het vooral goed als het in groepen wordt geplant. De decoratieve bloeiwijzen kunnen ook worden gebruikt voor droogboeketten. **Natuurlijke locatie**: Manengerst komt oorspronkelijk uit Alaska en Canada, maar komt ook voor in Oost-Azië. **Succesvolle teelt:** Het kan het hele jaar door binnen uit zaden worden gekweekt. Het wordt echter aanbevolen om in het vroege voorjaar te telen voor jaarlijkse houdbaarheid. Druk de zaden gewoon op een vochtig groeimedium dat je vooraf mengt met 25% perliet om te verbeteren. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met een temperatuur tussen de 20 ° en 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat, door deze dagelijks een beetje te bevochtigen met een waterspuiter. Het duurt meestal twee tot drie weken voordat het ontkiemt. **De beste locatie:** De manengerst staat het liefst op een zonnige en warme plek. **Optimale verzorging:** Manegras geeft de voorkeur aan een voedselrijke grond, die door de zouttolerantie van de plant zelfs licht zoute kan zijn. In de zomer moet het gras te droog zijn in plaats van te vochtig, omdat het niet goed tegen wateroverlast kan. Tijdens het groeiseizoen moet u regelmatig bemesten van mei tot laat in de herfst. **In de winter:** Op warme locaties met milde winters kan het manengras meerdere jaren worden geteeld met de juiste winterbescherming. Meestal wordt het een jaar bewaard.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Mankebygg
Hordeum jubatum
Sølvpigger med rødlig høstfarge

Manebygg er en flerårig byggtype som blir opptil 60 centimeter høy, men dyrkes vanligvis som ettårig på grunn av lav frostmotstand. Bladene er grønne og mykt overhengende om sommeren, og sølvpiggene med lange markiser, som blomstrer fra juni til august, blir beige og ofte med et svakt rødt skjær på slutten av sommeren. Gresset fungerer spesielt godt når det plantes i grupper. De dekorative blomsterstandene kan også brukes til tørkede buketter. **Naturlig beliggenhet**: Opprinnelsen til mankebygg er i Alaska og Canada - men det forekommer også i Øst-Asia. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø er mulig innendørs hele året. Men for en ettårig holdning anbefales dyrking tidlig på våren. Bare press frøene på fuktig voksende substrat som du tidligere har blandet med 25 % perlitt for å forbedre. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser potten på et lyst og varmt sted med en temperatur mellom 20° og 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt, ved å fukte den med en vannsprøyte, helst hver dag. Det tar vanligvis to til tre uker å spire. **Den beste beliggenheten:** Den manede byggen foretrekker et solrikt og varmt sted. **Optimal omsorg:** Manegress foretrekker en næringsrik jord, som til og med kan være litt saltholdig på grunn av plantens salttoleranse. Om sommeren bør gresset heller være for tørt enn for fuktig, da det ikke tåler vannlogging godt. I vegetasjonsperioden bør du gjødsle regelmessig fra mai til sen høst. **Om vinteren:** På varme steder med milde vintre kan manegress dyrkes i flere år med passende vinterbeskyttelse. Den holdes vanligvis som en årlig.



Kasza Jęczmienna Z Bambusa
Hordeum jubatum
Srebrne kępki uszu w czerwonawych kolorach jesieni

Kasza jęczmienna to wieloletnia odmiana jęczmienia do 60 cm wysokości, która ze względu na ograniczoną odporność na mróz jest często uprawiana jako roślina jednoroczna. Jej miękkie, zwisające liście mają latem zielone zabarwienie, podczas gdy kwitnące od czerwca do sierpnia, arystokratyczne, srebrzyste nasiona traw zmieniają kolor pod koniec lata na beżowy z czerwonawym akcentem. Zioło najlepiej sprawdza się, gdy jest sadzone w grupie. Ozdobne kwiatostany nadają się również do bukietów suchych kwiatów. **Naturalne położenie**: Foxtail Barley ma swoje naturalne środowisko na Alasce i Kanadzie, ale można go również znaleźć w Azji Wschodniej. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Jednak do uprawy rocznej zaleca się rozpoczęcie rozmnażania wczesną wiosną. Delikatnie wciśnij nasiona do wilgotnego kompostu doniczkowego, który najlepiej zawiera około 25% perlitu dla lepszego przenikania. Przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby ziemia nie wyschła, ale nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° do 25 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Najlepszym sposobem na to jest codzienne nawilżanie gleby za pomocą rozpylacza wody. Zwykle kiełkowanie trwa około dwóch do trzech tygodni. W maju można wysadzić jęczmień ogoniastego, **Najlepsza lokalizacja:** Foxtail Barley preferuje ciepłe i słoneczne miejsce do trzymania. **Optymalna pielęgnacja:** Foxtail Barley preferuje pożywną glebę, a nawet toleruje lekko słoną ziemię. Latem powinno być raczej suche niż wilgotne, ponieważ nie radzi sobie dobrze z podmokłą. Od maja do późnej jesieni, w okresie wzrostu, należy regularnie dostarczać roślinie trochę nawozu. **W zimę:** W rejonach o klimacie umiarkowanym z łagodną zimą jęczmień ogoniastego może być uprawiany z odpowiednią ochroną jako roślina wieloletnia, ale zwykle jest to roślina jednoroczna.



Cevada
Hordeum jubatum
Espigas de prata com cor avermelhada de outono

A cevada guará é um tipo de cevada perene que cresce até 60 centímetros de altura, mas geralmente é cultivada anualmente devido à sua baixa resistência ao gelo. Suas folhas são verdes e pendem suavemente no verão e suas hastes prateadas com longos arcos, que florescem de junho a agosto, tornam-se bege e muitas vezes com um leve tom vermelho no final do verão. A grama funciona especialmente bem quando plantada em grupos. As inflorescências decorativas também podem ser usadas para buquês secos. **Localização natural**: A origem da cevada juba está no Alasca e no Canadá - mas também ocorre no leste da Ásia. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes é possível dentro de casa durante todo o ano. No entanto, para uma atitude de um ano, recomenda-se o cultivo no início da primavera. Simplesmente pressione as sementes no substrato de crescimento úmido que você misturou anteriormente com 25% de perlita para melhorar. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso em um local claro e quente com temperatura entre 20° e 25° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não encharcado, umedecendo-o com um borrifador de água, idealmente todos os dias. Geralmente leva de duas a três semanas para germinar. **A melhor localização:** A cevada guará prefere um local ensolarado e quente. **Cuidado ideal:** A grama juba prefere um solo rico em nutrientes, que pode até ser levemente salino devido à tolerância ao sal da planta. No verão, a grama deve estar muito seca e não muito úmida, pois não suporta bem o encharcamento. Durante o período de vegetação, você deve fertilizar regularmente de maio até o final do outono. **No inverno:** Em locais quentes com invernos amenos, a grama juba pode ser cultivada por vários anos com proteção adequada no inverno. Geralmente é mantido como anual.



Orz De Coamă
Hordeum jubatum
Smocuri argintii de urechi cu culori roșiatice de toamnă

Orzul cu coamă este un tip peren de orz care crește până la 60 de centimetri înălțime, dar este cultivat mai ales anual, datorită rezistenței sale scăzute la îngheț. Frunzele sale sunt verzi și depășesc ușor vara, iar smocurile lor argintii de urechi cu lungi lungi, care înfloresc din iunie până în august, devin bej spre sfârșitul verii, adesea cu o ușoară nuanță roșie. Iarba funcționează deosebit de bine atunci când este plantată în grupuri. Inflorescențele decorative pot fi folosite bine și pentru buchete uscate. **Locație naturală**: Orzul Mane își are originea în Alaska și Canada - dar apare și în Asia de Est. **Cultivare de succes:** Se poate cultiva din semințe în interior tot timpul anului. Cu toate acestea, creșterea la începutul primăverii este recomandată pentru păstrarea anuală. Pur și simplu apăsați semințele pe un mediu de creștere umed pe care îl amestecați în prealabil cu 25% perlit pentru a îmbunătăți. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mucegaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc ușor și cald, cu o temperatură cuprinsă între 20 ° și 25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed, umezindu-l puțin zilnic cu un pulverizator de apă. De obicei durează două până la trei săptămâni până la germinare. **Cea mai bună locație:** Orzul de coamă preferă o locație însorită și caldă. **Îngrijire optimă:** Iarba de coamă preferă un sol bogat în nutrienți, care poate fi chiar ușor sărat datorită toleranței la sare a plantei. Vara, iarba ar trebui să fie prea uscată decât prea umedă, deoarece nu se poate descurca bine cu apa. În timpul sezonului de creștere ar trebui să fertilizați puțin regulat din mai până toamna târziu. **În iarnă:** În locurile calde, cu ierni blânde, iarba coamei poate fi cultivată timp de câțiva ani, cu protecție adecvată pentru iarnă. De obicei, se păstrează timp de un an.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Gräsbambu Mankorn
Hordeum jubatum
Silverknoppar i öron med rödaktiga höstfärger

Mankorn är en flerårig typ av korn som växer upp till 60 centimeter högt, men odlas mestadels som ettårigt på grund av dess låga frostmotstånd. Dess löv är gröna och försiktigt överhängande på sommaren och deras silverknoppar i öron med långa markiser, som blommar från juni till augusti, blir beige mot slutet av sommaren och ofta med en lätt rödaktig nyans. Gräset fungerar särskilt bra när det planteras i grupper. De dekorativa blomställningarna kan också användas bra för torra buketter. **Naturligt läge**: Mankorn har sitt ursprung i Alaska och Kanada - men det förekommer också i Östasien. **Framgångsrik odling:** Den kan odlas från frön inomhus året runt. Att växa tidigt på våren rekommenderas dock för årlig förvaring. Tryck helt enkelt frön på ett fuktigt odlingsmedium som du blandar i förväg med 25% perlit för att förbättra det. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en lätt och varm plats med en temperatur mellan 20 ° och 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig, men inte våt, genom att fukta den lite dagligen med en vattenspruta. Det tar vanligtvis två till tre veckor för spiring. **Den bästa platsen:** Mankornet föredrar ett soligt och varmt läge. **Optimal vård:** Mangräs föredrar en näringsrik jord, som till och med kan vara lite salt på grund av plantens salttolerans. På sommaren bör gräset vara för torrt snarare än för fuktigt, eftersom det inte kan hantera vattenloggning bra. Under växtsäsongen bör du gödsla lite regelbundet från maj till sen höst. **På vintern:** På varma platser med milda vintrar kan man gräset odlas i flera år med lämpligt vinterskydd. Vanligtvis hålls det i ett år.



Hrivový jačmeň
Hordeum jubatum
Strieborné špice s červenkastou jesennou farbou

Jačmeň hrivnatý je trváci druh jačmeňa, ktorý dorastá až do výšky 60 centimetrov, ale pre nízku mrazuvzdornosť sa zvyčajne pestuje ako jednoročný. Jej listy sú zelené a v lete jemne prevísajúce a jej strieborné klasy s dlhými plôškami, ktoré kvitnú od júna do augusta, sa koncom leta sfarbujú do béžovej a často s jemným červeným nádychom. Tráva funguje obzvlášť dobre, keď je vysadená v skupinách. Ozdobné súkvetia sa dajú použiť aj na sušené kytice. **Prirodzená poloha**: Pôvod hrivového jačmeňa je na Aljaške a v Kanade – vyskytuje sa však aj vo východnej Ázii. **Úspešná kultivácia:** Die Anzucht aus Samen ist im Haus das ganze Jahr über möglich. Allerdings empfiehlt sich für eine einjährige Haltung die Anzucht im zeitigen Frühjahr. Drücken Sie die Samen einfach auf feuchtes Anzuchtsubstrat, dass Sie vorher zur Verbesserung mit 25% Perlite vermischen. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit einer Temperatur zwischen 20° und 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass, indem Sie sie am besten täglich etwas mit einem Wassersprüher nachfeuchten. Bis zur Keimung vergehen in der Regel zwei bis drei Wochen. Im Mai kann es dann ins Freiland umgesetzt werden, muss aber anfangs noch vor späten Nachtfrösten geschützt werden. **Najlepšie umiestnenie:** Jačmeň hrivnatý preferuje slnečné a teplé stanovište. **Optimálna starostlivosť:** Tráva hriva uprednostňuje pôdu bohatú na živiny, ktorá môže byť dokonca mierne slaná kvôli tolerancii rastliny voči soli. V lete by mala byť tráva skôr príliš suchá ako príliš vlhká, pretože nezvláda dobre premokrenie. Počas vegetačného obdobia by ste mali pravidelne prihnojovať od mája do neskorej jesene. **V zime:** V teplých polohách s miernou zimou možno hrivu pestovať aj niekoľko rokov s vhodnou zimnou ochranou. Zvyčajne sa chová ako ročná.



Grivasti ječmen
Hordeum jubatum
Srebrne konice z rdečkasto jesensko barvo

Grivasti ječmen je trajna vrsta ječmena, ki zraste do 60 centimetrov visoko, vendar ga zaradi nizke odpornosti proti zmrzali običajno gojimo kot enoletnico. Njegovi listi so poleti zeleni in mehko previsni, srebrni klasi z dolgimi ostami, ki cvetijo od junija do avgusta, pa se ob koncu poletja obarvajo bež in pogosto z rahlim rdečim odtenkom. Trava se še posebej obnese, če je posajena v skupinah. Okrasna socvetja lahko uporabimo tudi za posušene šopke. **Naravni habitat**: Izvor grivnega ječmena je na Aljaski in v Kanadi – vendar se pojavlja tudi v vzhodni Aziji. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen je možno v zaprtih prostorih vse leto. Vendar pa je za enoletno držo priporočljivo gojenje zgodaj spomladi. Preprosto pritisnite semena na vlažen rastni substrat, ki ste ga predhodno zmešali s 25% perlita za izboljšanje. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo med 20° in 25° Celzija, zemljo v lončkih pa vzdržujte vlažno, vendar ne mokro, tako da jo vlažite z vodnim razpršilcem, najbolje vsak dan. Običajno traja dva do tri tedne, da vzklijejo. **Najboljša lokacija:** Grivasti ječmen ima najraje sončno in toplo rastišče. **Optimalna nega:** Grivasta trava ima raje zemljo, bogato s hranili, ki je zaradi odpornosti rastline na sol lahko celo rahlo slana. Poleti naj bo trava presuha in ne prevlažna, saj ne prenaša dobro namakanja. V vegetacijski dobi redno gnojimo od maja do pozne jeseni. **V zimskem času:** V toplih legah z milimi zimami lahko grivo ob ustrezni zimski zaščiti gojimo več let. Običajno se hrani kot enoletnica.



Cola de ardilla
Hordeum jubatum
Racimos de espigas de color plata que en otoño se cambia a rojizo

La cola de ardilla alcanza hasta 60 centímetros de altura, es perenne, pero por su baja tolerancia a heladas es anual. Sus hojas en verano son de color verde, con una caída suave. Sus espigas florecen de junio a agosto, con largas aristas a finales del verano que cambian a un color beige y a menudo con un toque rojizo. La hierba resalta muy bien cuando se planta en grupos. Las inflorescencias decorativas se pueden aprovechar muy bien para los ramos de flores secas. **Ubicación natural**: El origen de la cola de zorrillo se encuentra en Alaska y Canadá, pero también se encuentra en el Este de Asia. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Pero al ser una planta más bien anual se recomienda cultivarla en primavera. Introduzca las semillas en sustrato húmedo que previamente haya mezclado con un 25% de perlita. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. Diariamente se recomienda rociar el sustrato para mantenerlo húmedo. La germinación tarda habitualmente entre dos y tres semanas. A partir de mayo se puede trasplantar en exterior, pero debe ser protegida ante heladas nocturnas tardías. **La mejor ubicación:** La cola de zorrillo prefiere un lugar cálido y soleado. **Cuidado óptimo:** La cola de zorrillo prefiere un suelo rico en nutrientes, pero puede incluso ser un poco salino, por su tolerancia a la sal. En verano es recomendable mantener el suelo más bien seco que húmedo, porque no tolera el anegamiento. Durante el periodo de vegetación, de mayo a finales de otoño, se recomienda suministrarle regularmente abono. **En el invierno:** En zonas con inviernos cálidos la hierba puede mantenerse plurianual con una protección ante heladas. Normalmente es un cultivo anual.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Hříva ječmen
Hordeum jubatum
Stříbrné hroty s načervenalou podzimní barvou

Hřivnatý ječmen je vytrvalý druh ječmene, který dorůstá až do výšky 60 centimetrů, ale obvykle se pěstuje jako letnička pro nízkou mrazuvzdornost. Její listy jsou zelené a v létě měkce převislé a její stříbrné klasy s dlouhými natěmi, které kvetou od června do srpna, se koncem léta zbarvují do béžové a často s lehkým červeným nádechem. Tráva funguje obzvláště dobře, když je vysazena ve skupinách. Dekorativní květenství lze použít i na sušené kytice. **Přirozená poloha**: Původ hřívského ječmene je na Aljašce a v Kanadě – vyskytuje se ale i ve východní Asii. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semen je možné v interiéru po celý rok. Pro jednoroční postoj se však doporučuje pěstování brzy na jaře. Jednoduše přitlačte semínka na vlhký pěstební substrát, který jste pro vylepšení předtím smíchali s 25% perlitem. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Květináč umístěte na světlé a teplé místo s teplotou mezi 20° a 25° Celsia a udržujte zeminu v květináči vlhkou, ale ne mokrou, zvlhčováním rozprašovačem vody, ideálně každý den. Klíčení obvykle trvá dva až tři týdny. **Nejlepší umístění:** Ječmen hřivnatý preferuje slunné a teplé stanoviště. **Optimální péče:** Hřevnatá tráva preferuje půdu bohatou na živiny, která může být i mírně zasolená, protože rostlina snáší sůl. V létě by měla být tráva spíše příliš suchá než příliš vlhká, protože nezvládá dobře přemokření. Během vegetace byste měli hnojit pravidelně od května do pozdního podzimu. **V zimě:** V teplých polohách s mírnými zimami lze při vhodné zimní ochraně pěstovat hřívu i několik let. Obvykle se chová jako roční.



Yeleli arpa
Hordeum jubatum
Kırmızımsı sonbahar rengi ile gümüş çiviler

Yeleli arpa, yüksekliği 60 santimetreye kadar ulaşan çok yıllık bir arpa türüdür, ancak dona karşı direncinin düşük olması nedeniyle genellikle yıllık olarak yetiştirilir. Yaprakları yeşildir ve yazın hafifçe sarkıktır ve Haziran'dan Ağustos'a kadar çiçek açan uzun kılçıklı gümüş renkli sivri uçları yaz sonunda bej rengine döner ve genellikle hafif kırmızı bir renk alır. Çim, gruplar halinde ekildiğinde özellikle iyi çalışır. Dekoratif çiçek salkımları, kurutulmuş buketler için de kullanılabilir. **Doğal konum**: Yele arpasının kökeni Alaska ve Kanada'dır - ancak Doğu Asya'da da görülür. **Başarılı yetiştirme:** Die Anzucht aus Samen ist im Haus das ganze Jahr über möglich. Allerdings empfiehlt sich für eine einjährige Haltung die Anzucht im zeitigen Frühjahr. Drücken Sie die Samen einfach auf feuchtes Anzuchtsubstrat, dass Sie vorher zur Verbesserung mit 25% Perlite vermischen. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit einer Temperatur zwischen 20° und 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass, indem Sie sie am besten täglich etwas mit einem Wassersprüher nachfeuchten. Bis zur Keimung vergehen in der Regel zwei bis drei Wochen. Im Mai kann es dann ins Freiland umgesetzt werden, muss aber anfangs noch vor späten Nachtfrösten geschützt werden. **En iyi konum:** Yeleli arpa, güneşli ve sıcak bir yeri tercih eder. **Optimum bakım:** Yele otu, bitkinin tuz toleransı nedeniyle hafif tuzlu olabilen, besin açısından zengin bir toprağı tercih eder. Yaz aylarında, su basmasını iyi kaldıramayacağı için çimler çok nemli değil çok kuru olmalıdır. Vejetasyon döneminde, Mayıs'tan sonbaharın sonlarına kadar düzenli olarak gübreleme yapmalısınız. **Kışın:** Kışları ılıman geçen sıcak yerlerde yele otu, uygun kış korumasıyla birkaç yıl ekilebilir. Genellikle yıllık olarak tutulur.



Sörényárpa
Hordeum jubatum
Vöröses őszi színű ezüst tüskék

A sörényes árpa egy évelő árpafajta, amely akár 60 centiméter magasra is megnő, de alacsony fagyállósága miatt általában egynyári növényként termesztik. Levelei zöldek és nyáron puhán kilógnak, júniustól augusztusig virágzó ezüst tüskéi pedig hosszú tetővel, nyár végén bézs színűek és gyakran enyhe vörös árnyalatúak. A fű különösen jól működik, ha csoportosan ültetik. A dekoratív virágzat szárított csokrok készítéséhez is használható. **Természetes elhelyezkedés**: A sörényárpa eredete Alaszkából és Kanadából származik – de előfordul Kelet-Ázsiában is. **Sikeres termesztés:** Beltéri termesztés egész évben lehetséges. Egyéves hozzáállás esetén azonban a kora tavaszi termesztés javasolt. Egyszerűen nyomja a magokat a nedves termesztőfelületre, amelyet előzőleg 25% perlittel kevert a javítás érdekében. Fedje le a tenyészedényt ragasztófóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze az edényt világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20° és 25°C között van, és tartsa nedvesen, de ne nedvesen a virágföldet vízpermetezővel, ideális esetben minden nap. Általában két-három hétig tart a csírázás. **A legjobb hely:** A sörényes árpa a napos és meleg helyet kedveli. **Optimális gondozás:** A sörényfű a tápanyagban gazdag talajt kedveli, amely a növény sótűrése miatt akár enyhén szikes is lehet. Nyáron a fűnek inkább túl száraznak kell lennie, mint túl nedvesnek, mert nem bírja jól a vizesedést. A vegetációs időszakban májustól késő őszig rendszeresen műtrágyázni kell. **Télen:** Enyhe télű meleg helyeken a sörényfű megfelelő téli védelem mellett több évig termeszthető. Általában egyévesként tartják.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved

細野毛麦

Hordeum jubatum

銀色のシードヘッドと秋には赤く彩られた穂が美しい

最大60cmの高さの多年草のオオムギ属の品種です。限られた耐霜性のため、しばしば一年草として栽培されます。柔らかく突出した葉は6月から8月にかけて鮮やかな緑色で、銀色のシードヘッドは夏の終わりには赤みを帯びたベージュに変化します。この植物はグループで植えた時に最も美しさを発揮します。装飾的な花序はドライフラワーなどの花束にも適しています。

自然な場所: 生息地はアラスカとカナダですが、東アジアでも見られます。

栽培成功:
種子繁殖は室内で年間を通して可能です。一年草として栽培する場合は春の早い時期に種をまくことをお勧めします。浸透性をよくするためにパーライトを約25%含んだ湿った用土に、種をやさしく押しつけます。サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2～3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20℃～25℃の明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。水をスプレーして土壌を湿った状態に保つのが最善です。通常は約2～3週間で発芽します。5月には屋外に定植できますが、夜間の霜から保護する必要があります。

最高のロケーション: 暖かく日当たりのよい場所を好みます。

最適なケア:
栄養価が高く少々塩分を含んだ土壌を好みます。水溜まりを嫌うので、夏の間は湿った状態よりもむしろ乾燥した状態に保つ必要があります。成長期の5月から晩秋までは定期的に肥料を与える必要があります。

冬に: 通常は一年草ですが、冬の気候が穏やかな地域では、適切な保護を施す事で多年草として栽培することも可能です。

SKU: 13311 / Mähnengerste

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved