SAFLAX®

Tips

SKU: 13424 Tomate - Pink Brandywine



© Christina Dong - About © : Contact SAFLAX

Lycopersicon esculentum

Български	BG	2	
Dansk	DK	2	
Deutsch	DE	2	
English	UK	2	
Eesti	EE	3	
Suomalainen	FI	3	
Français	FR	3	
Ελληνική	GR	3	
Gaeilge	IE	4	
íslenskur	IS	4	
Italiano	IT	4	
Hrvatski	HR	4	
Latviešu	LV	5	
Lietuvių kalba	LT	5	
Malti	MT	5	
Nederlands	NL	5	
Norsk	NO	6	
Polski	PL	6	
Português	PT	6	
Românesc	RO	6	
Svenska	SE	7	
Slovensky	SK	7	
Slovenski	SI	7	
Español	ES	7	
Česky	CZ	8	
Türkçe	TR	8	
Magyar	HU	8	
日本語	JP	9	

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Домат - Розово Брендивайн

Lycopersicon esculentum

Доматът на амишите от повече от 200 години

Високодобивният и издръжлив сорт Pink Brandywine е майката на всички варианти на Brandywine, култивиран е от амишите от 200 години и определя вкусовата точка в САЩ, по която трябва да се измерват всички домати. Листата с формата на картофи, големите цветове и розовите, сочни плодове, тежащи до половин килограм, са нейните запазени марки. Сочният Brandywine с твърдото си месо е идеален за сосове (Sugo) и други ястия с домати. Добрите ресторантьори го използват, за да придадат решителен щрих на италианските ястия. **Естествено местоположение**: **Успешно отглеждане:** Сочният Brandywine с твърдото си месо е идеален за сосове (Sugo) и други ястия с домати. Добрите ресторантьори го използват, за да придадат решителен щрих на италианските ястия. **Най-доброто местоположение: Оптимална грижа:** Веднага след като вашите доматени растения достигнат височина от десет сантиметра, те се нуждаят от пръчка за опора и могат да бъдат на открито през деня при поне 5° по Целзий, за да се втвърдят. Осигурете достатъчно поливане, тъй като бързото изпаряване става чрез сега бързо нарастващата зеленина. След ледените светии в средата на май растенията могат да бъдат трансплантирани в градинската леха или кофа на разстояние 75 сантиметра на пълно слънце. Кофата трябва да побира най-малко десет литра пръст и да е добре дренирана. Доматите се нуждаят от здрави опорни пръти, добре закрепени в земята, или спирали от домати от градинския магазин. Място, защитено от дъжд и вятър също е идеално. Осигурете равномерен режим на поливане, към който растението може да свикне. Оттук нататък най-важната мярка за грижа е непрекъснатото ужилване на второстепенните издънки, така че главният издънка да получи достатъчно светлина за развитието си. Отстранете всички аксиларни издънки, които се образуват между ствола и основата на клона. Тъй като кореновата система първоначално се развива енергично, видимият растеж е бавен през първите няколко седмици. Наторете най-рано четири седмици след засаждането с наличен в търговската мрежа тор за домати и четири седмици по-късно втори път. **През зимата:** **Внимание: Доматите принадлежат към семейството на нощниците. Частите на растението са отровни. Но разбира се не зрелите плодове!**



Tomat - Pink Brandywine

Lycopersicon esculentum

Amish-folkets tomat i mere end 200 år

Den højtydende og hårdføre sort Pink Brandywine er moderen til alle Brandywine-varianter, er blevet dyrket af Amish People i 200 år og sætter smagspunktet i USA, som alle tomater skal måles efter. Kartoffelformede blade, store blomster og lyserøde, saftige frugter, der vejer op til et pund, er hendes varemærker. Den saftige Brandywine med sit faste kød er ideel til saucer (Sugo) og andre tomatretter. Gode restauratører bruger det til at give italienske retter det afgørende prægFløjte. **Naturlig beliggenhed**: **Succesfuld dyrkning:** Den saftige Brandywine med sit faste kød er ideel til saucer (Sugo) og andre tomatretter. Gode restauratører bruger det til at give italienske retter det afgørende prægFløjte. **Den bedste beliggenhed: Optimal pleje:** Så snart dine tomatplanter har nået en højde på ti centimeter, har de brug for en pind til støtte og kan stå udendørs i løbet af dagen ved mindst 5° Celsius for at stivne. Sørg for tilstrækkelig vanding, da hurtig fordampning sker via det nu hurtigt voksende løv. Efter ishelgenerne i midten af maj kan planterne transplanteres i havebedet eller spanden i en afstand af 75 centimeter i fuld sol. Spanden skal indeholde mindst ti liter jord og være godt drænet. Tomater har brug for stærke støttestænger forankret godt i jorden eller tomatspiraler fra havebutikken. Et sted beskyttet mod regn og vind er også ideelt. Giv en jævn vanding, som planten kan vænne sig til. Fra nu af er den vigtigste plejeforanstaltning den løbende stikning af sekundære skud, så hovedskuddet får nok lys til sin udvikling. Fjern eventuelle aksillære skud, der dannes mellem stammen og bunden af grenen. Da rodsystemet i starten udvikler sig kraftigt, er synlig vækst langsom i de første par uger. Gød tidligst fire uger efter plantning med en kommercielt tilgængelig tomatgødning og fire uger senere en anden gang. **Om vinteren:** **OBS: Tomater tilhører natskyggefamilien. Plantens dele er giftige. Men selvfølgelig ikke den modne frugt!**



Tomate - Pink Brandywine

Lycopersicon esculentum

Die Tomate der Amish People seit mehr als 200 Jahren

Die ertragreiche und widerstandsfähige Sorte Pink Brandywine ist die Mutter aller Brandywine Varianten, geht in der Zucht seit 200 Jahren auf die Amish People zurück und setzt in den USA den Geschmackspunkt, an dem sich alle Tomaten messen müssen. Kartoffelförmige Blätter, große Blüten und bis zu einem Pfund schwere, rosarote und saftige Früchte sind ihr Markenzeichen. Die saftige Brandywine mit ihrem festen Fruchtfleisch eignet sich wunderbar für Saucen (Sugo) und anderen Tomaten-Gerichten. Gute Gastronomen verleihen mit ihr italienischen Gerichten den entscheidenden Pfiff. **Naturstandort**: **Anzucht:** Die saftige Brandywine mit ihrem festen Fruchtfleisch eignet sich wunderbar für Saucen (Sugo) und anderen Tomaten-Gerichten. Gute Gastronomen verleihen mit ihr italienischen Gerichten den entscheidenden Pfiff. **Standort: Pflege:** Sobald Ihre Tomatenpflanzen eine Höhe von zehn Zentimetern erreicht haben, brauchen sie einen Stab als Stütze und können tagsüber bei mindestens 5° Celsius zur Abhärtung schon mal ins Freie. Achten Sie auf ausreichende Wässerung, da über das jetzt schnell zunehmende Blattwerk eine schnelle Verdunstung erfolgt. Nach den Eisheiligen Mitte Mai können die Pflanzen im Abstand von 75 Zentimetern an einem vollsonnigen Standort ins Gartenbeet oder in den Kübel umgepflanzt werden. Der Kübel sollte mindestens zehn Liter Erde fassen und gut drainagiert sein. Tomaten benötigen gut im Boden verankerte kräftige Stützstäbe oder Tomatenspiralen aus dem Gartenfachmarkt. Optimal ist zudem ein regen- und windgeschützter Platz. Sorgen Sie für eine Gleichmäßigkeit bei der Wässerung, an die die Pflanze sich gewöhnen kann. Die wichtigste Pflegemaßnahme ist ab jetzt das laufende Entgeizen der Nebentriebe, damit der Haupttrieb genug Licht für seine Entwicklung erhält. Entfernen Sie alle Achseltriebe, die sich zwischen Stamm und Zweigansatz bilden. Da sich zunächst das Wurzelwerk kräftig weiter entwickelt, verläuft das sichtbare Wachstum in den ersten Wochen nur langsam. Düngen Sie frühestens vier Wochen nach der Auspflanzung erstmals mit einem handelsüblichen Tomatendünger und nach weiteren vier Wochen ein zweites Mal. **Im Winter:** **Achtung: Tomaten zählen zu den Nachtschattengewächsen. Die Pflanzenteile giftig. Aber natürlich nicht die reifen Früchte!**



Tomato - Pink Brandywine

Lycopersicon esculentum

The tomato of the Amish People for more than 200 years

The rich and resilient variety Pink Brandywine is the mother of all Brandywine species and its cultivation goes back 200 years to the Amish People. The Pink Brandywine is top ranked for tastiness in the USA and a yardstick for all other varieties. Its main characteristics are the potato-shaped leaves, big blossoms and up to one pound weighing, pink-red, juicy fruits. The juicy Pink Brandywine contains firm fruit pulp and is nicely suited for sauces (sugo) and other tomato dishes. A good restaurant kitchen uses the Pink Brandywine to add a final touch to its Italian dishes. **Natural location**: **Successful cultivation:** Since tomato plants should only be planted out from mid May after the last nightly frosts, it is advisable to start propagation in mid or end of March in a bright and warm room indoors. Tomato plants germinate rather quickly and you don't need to start propagation earlier than that. When the outdoor temperatures are high enough, the plants will be strong and ready for planting out. Spread the seeds about 2 cm apart from each other onto moist potting compost, put just a little compost earth on top and moisten the earth again by using a water sprayer. Cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out, but don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20°C and 24° Celsius and keep the earth moist, but not wet. The first seedlings should come up after one or two weeks. Now, you can remove the clear film and keep the sprouts somewhat cool and as bright as possible, but not in the full midday sun. As soon as the seedlings develop the second pair of leaves, you can prick out until the first leave pair, and plant the sprouts into small 10 cm pots with potting earth for tomato plants and a bottom hole. Be gentle with the fine roots and don't forget to modestly water the fresh soil. **The best location: Optimal care:** As soon as the tomato plant grows higher than 10 cm, you need to provide a wooden stick as a stabilizer, and during the day you can already keep the plants outdoors with at least 5° Celsius for acclimatization. After the "Ice Saints" in mid May, you can plant the tomatoes in a full sunny spot and about 75 cm apart from each other into the garden bed or in a bigger pot. The pot should have at least 10 litres of earth and a good drainage. The tomato plants need a strong and firmly fixed strut or tomato stakes from the garden centre. A rain-sheltered and wind-protected place would be ideal for cultivation. Water the plant regularly and evenly, so it can adapt to the amount of water given. The most important part of the care is now the ongoing cutting of the sideshoots, particularly between the stem and the base of the branches, so that the main sprout has enough light and strength for development. The aerial part of the plant grows rather slow during the first weeks since the tomato strongly develops its rooting first. You can give standard fertilizer for tomato plants, but the first time not earlier than four weeks from planting out, and the second time another four weeks later. **In the winter:** **Caution: Tomatoes are part of the nightshade family. Plant parts are poisonous. But of course, not the fruit.**

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Tomat - Roosa Brandywine

Lycopersicon esculentum

Amiši rahva tomat rohkem kui 200 aastat

Saagikas ja vastupidav sort Pink Brandywine on kõikide Brandywine'i variantide ema, mida amishi rahvas on kasvatanud juba 200 aastat ja määrab USA-s maitsepunkti, mille järgi tuleb mõõta kõiki tomateid. Tema kaubamärgid on kartulikujulised lehed, suured õied ja roosad, mahlased viljad, mis kaaluvad kuni kilo. Tugeva viljalihaga mahlane Brandywine sobib ideaalselt kastmetesse (Sugo) ja muudesse tomatiroogadesse. Head restoranipidajad kasutavad seda Itaalia roogadele otsustava hõngu andmiseksVile. **Looduslik asukoht**: **Edukas kasvatamine:** Tugeva viljalihaga mahlane Brandywine sobib ideaalselt kastmetesse (Sugo) ja muudesse tomatiroogadesse. Head restoranipidajad kasutavad seda Itaalia roogadele otsustava hõngu andmiseksVile. **Parim asukoht: Optimaalne hooldus:** Niipea, kui teie tomatitaimed on saavutanud kümne sentimeetri kõrguse, vajavad nad toestamiseks pulka ja võivad päeval olla väljas vähemalt 5 °C juures, et kõveneda. Tagada piisav kastmine, sest kiire aurustumine toimub nüüd kiiresti kasvava lehestiku kaudu. Pärast mai keskpaiga jääpühakuid võib taimed lauspäikese käes istutada aiapeenrasse või ämbrisse 75 sentimeetri kaugusele. Ämber peaks mahutama vähemalt kümme liitrit mulda ja olema hästi kuivendatud. Tomatid vajavad tugevaid, hästi maasse ankurdatud tugivardaid või aiapoest pärit tomatispiraale. Ideaalne on ka vihma ja tuule eest kaitstud koht. Tagage ühtlane kastmisrežiim, millega taim saab harjuda. Edaspidi on kõige olulisem hooldusmeede sekundaarvõrsete jätkuv nõelamine, et põhivõrse saaks arenguks piisavalt valgust. Eemaldage kõik kaenlaalused võrsed, mis tekivad tüve ja oksa aluse vahele. Kuna juurestik areneb alguses jõuliselt, on nähtav kasv esimestel nädalatel aeglane. Väetage kõige varem neli nädalat pärast istutamist müügiloleva tomativäetisega ja neli nädalat hiljem teist korda. **Talvel:** **Tähelepanu: Tomatid kuuluvad öövihmade perekonda. Taime osad on mürgised. Aga loomulikult mitte küpsed viljad!**



Tomaatti - Pink Brandywine

Lycopersicon esculentum

Amish-kansan tomaatti yli 200 vuoden ajan

Satoinen ja kestävä Pink Brandywine -lajike on kaikkien Brandywine-muunnelmien äiti, jota Amish People on viljellyt 200 vuoden ajan ja se asettaa USA:n makupisteen, jolla kaikki tomaatit on mitattava. Perunan muotoiset lehdet, suuret kukat ja vaaleanpunaiset, mehukkaat jopa kilon painoiset hedelmät ovat hänen tavaramerkkejään. Mehukas Brandywine kiinteällä hedelmäisyydellä sopii erinomaisesti kastikkeisiin (Sugo) ja muihin tomaattiruokiin. Hyvät ravintoloitsijat käyttävät sitä antamaan italialaisille ruoille ratkaisevan vaikutuksenPilli. **Luonnollinen sijainti**: **Onnistunut viljely:** Mehukas Brandywine kiinteällä hedelmäisyydellä sopii erinomaisesti kastikkeisiin (Sugo) ja muihin tomaattiruokiin. Hyvät ravintoloitsijat käyttävät sitä antamaan italialaisille ruoille ratkaisevan vaikutuksenPilli. **Paras sijainti: Optimaalinen hoito:** Heti kun tomaatin kasvit ovat saavuttaneet kymmenen senttimetrin korkeuden, ne tarvitsevat kepin tueksi ja voivat olla ulkona päiväsaikaan vähintään 5 °C:ssa kovettumaan. Varmista riittävä kastelu, sillä nopea haihtuminen tapahtuu nyt nopeasti kasvavan lehtineen. Toukokuun puolivälin jääpyhien jälkeen kasvit voidaan istuttaa puutarhapenkkiin tai ämpäriin 75 senttimetrin etäisyydeltä täydessä auringossa. Ämpäriin tulee mahtua vähintään kymmenen litraa maata ja sen tulee olla hyvin valutettu. Tomaatit tarvitsevat vahvat tukitangot, jotka on ankkuroitu hyvin maahan tai tomaattispiraaleja puutarhakaupasta. Sateelta ja tuulelta suojattu paikka on myös ihanteellinen. Järjestä tasainen kastelujärjestelmä, johon kasvi voi tottua. Jatkossa tärkein hoitotoimenpide on sivuversojen jatkuva pistely, jotta pääverso saa riittävästi valoa kehittyäkseen. Poista kaikki kainaloversot, jotka muodostuvat rungon ja oksan pohjan väliin. Koska juurijärjestelmä kehittyy aluksi voimakkaasti, näkyvä kasvu on hidasta muutaman ensimmäisen viikon aikana. Lannoita aikaisintaan neljä viikkoa istutuksen jälkeen kaupallisesti saatavalla tomaattilannoitteella ja neljän viikon kuluttua toisen kerran. **Talvella:** **Huomio: Tomaatit kuuluvat yöviiriperheeseen. Kasvin osat ovat myrkyllisiä. Mutta ei tietenkään kypsiä hedelmiä!**



Tomate Brandywine

Lycopersicon esculentum

La tomate des Amish depuis plus de 200 ans

La tomate Brandywine rose productive et résistante est la mère de toutes les Brandywine, est cultivée depuis 200 ans par les Amish et a le goût que toutes les tomates doivent avoir aux Etats-Unis. Ses signes distinctifs sont des feuilles en forme de pomme de terre, des grandes fleurs, et des fruits roses et juteux qui peuvent peser jusqu'à un livre. La Brandywine juteuse avec sa pulpe ferme s'adapte merveilleusement à la préparation de sauces (Sugo) et d'autres recettes tomate. Les bons restaurateurs l'utilisent pour augmenter le charme des plats italiens. **Emplacement naturel**: **Culture réussie:** Comme les tomates ne doivent être entrenues dans le jardin qu'à partir de mi-mai, s'il n'y a plus de gels de nuit, vous pouvez mettre la tomate dans une salle lumineuse et chaude en mi-mars à fin mars, les tomates germent rapidement et une culture plus précoce n'est pas nécessaire. S'il fait assez chaud dans le jardin, les plantes sont déjà assez puissantes pour le repiquage. Parsemez les graines sur du substrat humide à deux centimètres les unes des autres, puis recouvez-les légèrement. Gardez le substrat humide, mais pas mouillé, en l'humidifiant de préférence tous les jours avec de l'eau pulvérisée. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 24° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. Les premières graines doivent apparaître après une à deux semaines. Enlevez la couverture et gardez les plantes dans le plus de lumière possible (mais pas de soleil de plomb de midi) et dans un endroit un peu plus froid pour que les plantes ne s'étiolent pas. Les jeunes plantes peuvent être repiquées (isolées) jusqu'à la première feuille dans des petits pots de 10 centimètres avec des trous dans la terre et de la terre pour tomates. Veillez à ce que vous ne blessiez pas les racines fines et à ce que vous arrosiez la terre légèrement. **Le meilleur emplacement: Soins optimaux:** Dès que vos tomates ont atteint une hauteur de dix centimètres, elles ont besoin d'une barre pour la protections et peuvent être en plein air dans des températures de 5° Celsius minimum pendant la journée pour le renforcement. Après les saints de glace en mi-mai, les plantes peuvent être rempotées dans un emplacement en plein soleil dans la plate-bande ou dans le pot à 75 centimètres les unes des autres. Le pot doit avoir au moins 10 litres de terre et être bien drainé. Les tomates ont besoin de barres de support puissantes ou des tuteurs à tomates de la jardinerie qui peuvent être ancrés dans la terre. Un endroit qui est aussi protégé de la pluie et du vent est idéal. Veillez à arroser la plante de façon à qu'elle puisse s'y habituer. La mesure de maintenance la plus importante à partir de là est de tailler les rameaux secondaires pour que le rameau principal reçoive assez de lumière pour son développement. Enlevez tous les rameaux axillaires qui se forment entre le tronc et l'entrée de la branche. Comme les racines se développent fortement d'abord, la croissance visible est lente pendant les premières semaines. Engraissez la tomate pour la première fois quatre semaines après le repiquage au plus tôt avec un engrais pour tomates commercial et pour une deuxième fois quatre semaines après. **En hiver:** **Attention: Les tomates appartiennent à la famille des solanacées. Les parties végétales sont toxiques. Le fruit mûr ne l'est bien évidemment pas!**



Ντομάτα - Pink Brandywine

Lycopersicon esculentum

Η ντομάτα του λαού Amish για περισσότερα από 200 χρόνια

Η υψηλής απόδοσης και ανθεκτική ποικιλία Pink Brandywine είναι η μητέρα όλων των παραλλαγών Brandywine, καλλιεργείται από τους Amish People εδώ και 200 χρόνια και θέτει το γευστικό σημείο στις ΗΠΑ με το οποίο πρέπει να μετρώνται όλες οι ντομάτες. Τα φύλλα σε σχήμα πατάτας, τα μεγάλα άνθη και τα ροζ, ζουμερά φρούτα που ζυγίζουν μέχρι και ένα κιλό είναι τα σήματα κατατεθέν της. Το ζουμερό Brandywine με τη σφιχτή σάρκα του είναι ιδανικό για σάλτσες (Sugo) και άλλα πιάτα με ντομάτα. Οι καλοί εστιάτορες το χρησιμοποιούν για να δώσουν στα ιταλικά πιάτα την αποφασιστική πινελιάΣφυρίζω. **Φυσική τοποθεσία**: **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Το ζουμερό Brandywine με τη σφιχτή σάρκα του είναι ιδανικό για σάλτσες (Sugo) και άλλα πιάτα με ντομάτα. Οι καλοί εστιάτορες το χρησιμοποιούν για να δώσουν στα ιταλικά πιάτα την αποφασιστική πινελιάΣφυρίζω. **Η καλύτερη τοποθεσία: Βέλτιστη φροντίδα:** Μόλις τα φυτά της ντομάτας σας φτάσουν σε ύψος δέκα εκατοστών, χρειάζονται ένα ραβδί για στήριξη και μπορούν να είναι σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια της ημέρας σε θερμοκρασία τουλάχιστον 5° Κελσίου για να σκληρύνουν. Εξασφαλίστε επαρκές πότισμα, καθώς η ταχεία εξάτμιση γίνεται μέσω του ταχέως αυξανόμενου πλέον φυλλώματος. Μετά τους αγίους του πάγου στα μέσα Μαΐου, τα φυτά μπορούν να μεταμοσχευθούν στο κρεβάτι ή στον κουβά του κήπου σε απόσταση 75 εκατοστών σε πλήρη ήλιο. Ο κάδος πρέπει να χωράει τουλάχιστον δέκα λίτρα χώματος και να είναι καλά στραγγισμένος. Οι ντομάτες χρειάζονται ισχυρές ράβδους στήριξης αγκυρωμένες καλά στο έδαφος ή σπείρες ντομάτας από το κατάστημα κήπου. Ένα μέρος προστατευμένο από τη βροχή και τον άνεμο είναι επίσης ιδανικό. Παρέχετε ένα ομοιόμορφο καθεστώς ποτίσματος στο οποίο μπορεί να συνηθίσει το φυτό. Από εδώ και πέρα, το πιο σημαντικό μέτρο φροντίδας είναι το συνεχές τσίμπημα των δευτερευόντων βλαστών, ώστε ο κύριος βλαστός να λαμβάνει αρκετό φως για την ανάπτυξή του. Αφαιρέστε τυχόν μασχαλιαίους βλαστούς που σχηματίζονται μεταξύ του κορμού και της βάσης του κλάδου. Δεδομένου ότι το ριζικό σύστημα αναπτύσσεται αρχικά έντονα, η ορατή ανάπτυξη είναι αργή τις πρώτες εβδομάδες. Λιπαίνετε τέσσερις εβδομάδες μετά τη φύτευση το νωρίτερο με ένα εμπορικά διαθέσιμο λίπασμα τομάτας και τέσσερις εβδομάδες αργότερα για δεύτερη φορά. **Το χειμώνα:** **Προσοχή: Οι ντομάτες ανήκουν στην οικογένεια των νυχτολούλουδων. Τα μέρη του φυτού είναι δηλητηριώδη. Μα φυσικά όχι το ώριμο φρούτο!**

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Trátaí - Brandywine Pink

Lycopersicon esculentum

An trátaí de na daoine Amish ar feadh níos mó ná 200 bliain

Is é an éagsúlacht ard-táirgeachta agus crua Pink Brandywine máthair gach leagan Brandywine, tá sé á chothú ag na Daoine Amish le 200 bliain agus socraíonn sé an pointe blas i SAM trína gcaithfear gach trátaí a thomhas. Is trádmharcanna iad duilleoga cruth prátaí, bláthanna móra, agus torthaí bándearga, súiteacha ar mheá suas le punt. Tá an Brandywine juicy lena flesh daingean oiriúnach le haghaidh anlainn (Sugo) agus miasa trátaí eile. Úsáideann bialanna maithe é chun teagmháil chinntitheach a thabhairt do miasa na hIodáileFeadóg. **Suíomh nádúrtha**: **Saothrú rathúil:** Tá an Brandywine juicy lena flesh daingean oiriúnach le haghaidh anlainn (Sugo) agus miasa trátaí eile. Úsáideann bialanna maithe é chun teagmháil chinntitheach a thabhairt do miasa na hIodáileFeadóg. **An suíomh is fearr:** **Cúram is fearr is féidir:** Chomh luath agus a bheidh airde de dheich ceintiméadar bainte amach ag do phlandaí trátaí, teastaíonn bata tacaíochta uathu agus is féidir leo a bheith amuigh faoin aer i rith an lae ag 5° Celsius ar a laghad chun iad a chruasú. Cinntigh go bhfuil dóthain uisce ann, mar go dtarlaíonn galú tapa tríd an duilliúr atá ag méadú go tapa anois. Tar éis na naomh oighir i lár mhí na Bealtaine, is féidir na plandaí a thrasphlandú isteach sa leaba gairdín nó buicéad ar fad de 75 ceintiméadar faoi lán ghrian. Ba chóir go mbeadh deich lítear ithreach ar a laghad sa bhuicéad agus go mbeadh sé draenáilte go maith. Ní mór slata tacaíochta láidre a bheith ag trátaí atá ar ancaire go maith sa talamh nó bíseanna trátaí ón siopa gairdín. Tá áit atá cosanta ó bháisteach agus ó ghaoth oiriúnach freisin. Cuir réim chothrom uisce ar fáil ar féidir leis an bplanda dul i dtaithí air. As seo amach, is é an beart cúraim is tábhachtaí ná gobadh leanúnach na shoots tánaisteacha ionas go bhfaighidh an príomh-shoot go leor solais dá fhorbairt. Bain aon shoots axillary atá idir an trunk agus bonn an brainse. Ós rud é go bhforbraíonn an córas fréimhe go bríomhar ar dtús, tá fás infheicthe mall sna chéad chúpla seachtain. Déan leasachán trátaí atá ar fáil ar bhonn tráchtála a leasú ceithre seachtaine tar éis a phlandála ar a luaithe agus ceithre seachtaine ina dhiaidh sin an dara huair. **Sa gheimhreadh:** **Aird: Baineann trátaí leis an teaghlach nightshade. Tá codanna an ghléasra nimhiúil. Ach ar ndóigh ní na torthaí aibí!**



Tómatur - bleikt brennivín

Lycopersicon esculentum

Tómatar Amish fólksins í meira en 200 ár

Afraksturinn og harðgerða afbrigðið Pink Brandywine er móðir allra Brandywine afbrigða, hefur verið ræktað af Amish fólkinu í 200 ár og setur bragðpunktinn í Bandaríkjunum sem alla tómata þarf að mæla með. Kartöflulöguð laufblöð, stór blóm og bleikir, safaríkir ávextir sem vega allt að pund eru vörumerki hennar. Safaríka Brandywine með stífu holdi er tilvalið í sósur (Sugo) og aðra tómatarétti. Góðir veitingamenn nota það til að gefa ítölskum réttum afgerandi blæFlauta. **Náttúruleg staðsetning**: **Árangursrík ræktun:** Safaríka Brandywine með stífu holdi er tilvalið í sósur (Sugo) og aðra tómatarétti. Góðir veitingamenn nota það til að gefa ítölskum réttum afgerandi blæFlauta. **Besta staðsetningin:** **Besta umönnun:** Um leið og tómataplönturnar þínar eru orðnar tíu sentímetrar á hæð þurfa þær staf sem stuðning og geta verið úti á daginn við að minnsta kosti 5° Celsíus til að harðna. Gakktu úr skugga um næga vökvun, þar sem hröð uppgufun á sér stað í gegnum laufin sem nú stækkar hratt. Eftir ísdýrlingana um miðjan maí er hægt að gróðursetja plönturnar í garðbeð eða fötu í 75 sentímetra fjarlægð í fullri sól. Fötnin ætti að taka að minnsta kosti tíu lítra af jarðvegi og vera vel tæmd. Tómatar þurfa sterkar stuðningsstangir sem eru vel festar í jörðu eða tómatspírala úr garðversluninni. Staður sem er varinn fyrir rigningu og vindi er líka tilvalinn. Veittu jafna vökvakerfi sem plöntan getur vanist. Héðan í frá er mikilvægasta varúðarráðstöfunin áframhaldandi sting í aukasprotunum þannig að aðalsprotinn fái næga birtu fyrir þróun sína. Fjarlægðu alla handarkjarnasprota sem myndast á milli stofnsins og botn greinarinnar. Þar sem rótarkerfið þróast kröftuglega í upphafi er sýnilegur vöxtur hægur fyrstu vikurnar. Frjóvgaðu í fyrsta lagi fjórum vikum eftir gróðursetningu með tómatáburði sem fæst í sölu og fjórum vikum síðar í annað sinn. **Á veturna:** **Athygli: Tómatar tilheyra næturskuggafjölskyldunni. Hlutar plöntunnar eru eitraðir. En auðvitað ekki þroskaðir ávextirnir!**



Pomodoro Pink Brandywine

Lycopersicon esculentum

Il pomodoro degli Amish, da oltre 200 anni

La varietà di pomodoro Pink Brandywine, fruttifera e resistente, è la madre di tutte le varietà Brandywin. La sua coltivazione risale a 200 anni fa presso la comunità Amish e negli USA rappresenta lo standard di gusto con cui tutti i pomodori devono misurarsi. I suoi segni distintivi sono le foglie a forma di patata, i grandi fiori e infine i frutti rosati, succosi e pesanti fino a mezzo chilo. Il gusto intenso di pomodoro rende questa varietà ideale per preparare condimenti per pasta, insalate e salse. **Posizione naturale**: **Coltivazione riuscita:** I pomodori andrebbero piantati in giardino da metà maggio, quando le gelate notturne sono finite, ma è possibile anticiparne la coltivazione a fine marzo, in un ambiente luminoso e caldo. I pomodori germogliano in fretta e non è necessario piantarli ancora prima. Quando in giardino farà abbastanza caldo, le piante saranno già abbastanza robuste per il trapianto. Distribuite i semi piatti sul substrato di coltivo umido, a distanza di due centimetri l'uno dall'altro, ricoprendoli solo leggermente. Mantenete il substrato umido ma non bagnato, utilizzando preferibilmente uno spruzzino per mantenere l'umidità. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura tra i 20° e i 24° C, mantenete la terra umida ma non bagnata. Le prime piantine compaiono di norma da una a due settimane dopo. Rimuovete la copertura e posizionate le piante il più possibile esposte alla luce (ma non al sole diretto) in un ambiente fresco, per evitare che le giovani piante crescano ingiallite, con steli lunghi e foglie piccole. Non appena si sviluppa il secondo paio di foglie, le piantine possono essere trapiantate fino alla prima foglia (diradandole) in vasi di circa 10 centimetri, con terreno traspirante e terriccio per pomodori. Fate attenzione a non danneggiare le radici delicate e ad innaffiare leggermente la terra fresca. **La posizione migliore:** **Cura ottimale:** Quando le vostre piante di pomodori avranno raggiunto l'altezza di 10 centimetri servirà un bastone di sostegno e di giorno potranno stare all'aperto, ad almeno 5° C, per irrobustirsi. Dopo la metà di maggio potete trapiantare le piante in un punto esposto al sole, in giardino oppure in vaso, distanziandole 75 centimetri l'una dall'altra. Se coltivate in vaso, questo dovrebbe contenere almeno dieci litri di terra ed essere ben drenato/drenante. I pomodori hanno bisogno di stecche di sostegno ben piantate nel terreno o di tutori a spirale, reperibili fra gli articoli per giardinaggio. Irrigate in maniera regolare in modo da far abituare la pianta. Il compito più importante d'ora in poi è recidere i getti secondari, per far sì che il fusto centrale assorba tutta la luce necessaria a crescere bene. Tagliate tutte le ascelle che germogliano fra il fusto centrale e la ramificazione. Poiché il sistema radicale si sviluppa in maniera molto forte, nelle prime settimane la crescita visibile della pianta appare lenta. Concimate non prima di quattro settimane dopo il trapianto, con concime per pomodori reperibile sul mercato, dopo altre quattro settimane concimate di nuovo. **In inverno:** **Attenzione: I pomodori si annoverano tra le Solanacee. Le parti della pianta sono tossiche. Non lo sono, naturalmente, i frutti maturi.**



Rajčica - Pink Brandywine

Lycopersicon esculentum

Rajčica Amiša više od 200 godina

Visoko prinosna i izdržljiva sorta Pink Brandywine je majka svih varijanti Brandywine, uzgajaju je Amiši već 200 godina i postavlja točku okusa u SAD-u prema kojoj se moraju mjeriti sve rajčice. Listovi u obliku krumpira, veliki cvjetovi i ružičasti sočni plodovi težine do pola kilograma njezini su zaštitni znaci. Sočni Brandywine sa svojim čvrstim mesom idealan je za umake (Sugo) i druga jela od rajčice. Dobri ugostitelji ga koriste kako bi talijanskim jelima dali odlučujuću notuZviždati. **Zemlja porijekla**: **Uspješan uzgoj:** Sočni Brandywine sa svojim čvrstim mesom idealan je za umake (Sugo) i druga jela od rajčice. Dobri ugostitelji ga koriste kako bi talijanskim jelima dali odlučujuću notuZviždati. **Najbolja lokacija:** **Optimalna njega:** Čim vaše biljke rajčice dosegnu visinu od deset centimetara, treba im štap kao oslonac i mogu biti na otvorenom tijekom dana na najmanje 5°C da očvrsnu. Pobrinite se za dovoljno zalijevanja, jer dolazi do brzog isparavanja preko lišća koje sada brzo raste. Nakon ledenih svetaca sredinom svibnja, biljke se mogu presaditi u vrtnu gredicu ili kantu na razmak od 75 centimetara na punom suncu. U kantu treba stati najmanje deset litara zemlje i biti dobro drenirana. Rajčicama su potrebne snažne potporne šipke dobro usidrene u tlu ili spirale rajčice iz trgovine u vrtu. Idealno je i mjesto zaštićeno od kiše i vjetra. Osigurajte ravnomjeran režim zalijevanja na koji se biljka može naviknuti. Od sada je najvažnija mjera njege kontinuirano bockanje sekundarnih izdanaka kako bi glavni izdanak dobio dovoljno svjetla za svoj razvoj. Uklonite sve aksilarne izdanke koji se formiraju između debla i baze grane. Budući da se korijenski sustav u početku snažno razvija, vidljivi rast je spor u prvih nekoliko tjedana. Gnojite najranije četiri tjedna nakon sadnje komercijalno dostupnim gnojivom za rajčice, a četiri tjedna kasnije drugi put. **U zimi:** **Pažnja: rajčice pripadaju obitelji noćurka. Dijelovi biljke su otrovni. Ali naravno ne zrelo voće!**

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Tomāts - Pink Brandywine

Lycopersicon esculentum

Amīšu tautas tomāts vairāk nekā 200 gadus

Augstražīgā un izturīgā šķirne Pink Brandywine ir visu Brandywine variantu māte, amīšu tauta kultivē jau 200 gadus un nosaka garšas punktu ASV, pēc kura jāmēra visi tomāti. Viņas preču zīmes ir kartupeļu formas lapas, lieli ziedi un rozā, sulīgi augļi, kas sver līdz mārciņai. Sulīgais Brandywine ar savu stingro mīkstumu ir ideāli piemērots mērcēm (Sugo) un citiem tomātu ēdieniem. Labi restorāni izmanto to, lai itāļu ēdieniem piešķirtu izšķirošu pieskārienuSvilpe. **Dabiska vieta**: **Veiksmīga audzēšana:** Sulīgais Brandywine ar savu stingro mīkstumu ir ideāli piemērots mērcēm (Sugo) un citiem tomātu ēdieniem. Labi restorāni izmanto to, lai itāļu ēdieniem piešķirtu izšķirošu pieskārienuSvilpe. **Labākā atrašanās vieta: Optimāla aprūpe:** Tiklīdz jūsu tomātu stādi ir sasnieguši desmit centimetru augstumu, tiem ir nepieciešams kāts atbalstam, un dienas laikā tie var atrasties ārā vismaz 5°C temperatūrā, lai sacietētu. Nodrošiniet pietiekamu laistīšanu, jo strauji iztvaiko, izmantojot tagad strauji augošo lapotni. Pēc ledus svētajiem maija vidū augus pilnā saulē var pārstādīt dārza dobē vai spainī 75 centimetru attālumā. Spainī jābūt vismaz desmit litriem augsnes un tam jābūt labi nosusinātam. Tomātiem ir nepieciešami spēcīgi atbalsta stieņi, kas labi noenkuroti zemē, vai tomātu spirāles no dārza veikala. Ideāla ir arī vieta, kas aizsargāta no lietus un vēja. Nodrošiniet vienmērīgu laistīšanas režīmu, pie kura augs var pierast. Turpmāk svarīgākais kopšanas pasākums ir sekundāro dzinumu nepārtraukta dzeltēšana, lai galvenais dzinums saņemtu pietiekami daudz gaismas savai attīstībai. Noņemiet visus paduses dzinumus, kas veidojas starp stumbru un zara pamatni. Tā kā sakņu sistēma sākotnēji attīstās enerģiski, pirmajās nedēļās redzamā augšana ir lēna. Mēslojiet ne agrāk kā četras nedēļas pēc stādīšanas ar komerciāli pieejamu tomātu mēslojumu un pēc četrām nedēļām otro reizi. **Ziemā:** **Uzmanību: tomāti pieder pie naktsvijoļu dzimtas. Augu daļas ir indīgas. Bet, protams, ne nogatavojušos augļus!**



Pomidoras – rožinis brendžio vynas

Lycopersicon esculentum

Amišų pomidoras daugiau nei 200 metų

Derlinga ir ištverminga veislė Pink Brandywine yra visų Brandywine variantų motina, amišų tauta auginama 200 metų ir nustato JAV skonio taško, pagal kurį turi būti matuojami visi pomidorai. Bulvės formos lapai, dideli žiedai ir rausvi, sultingi vaisiai, sveriantys iki kilogramo, yra jos prekės ženklai. Sultingas Brandywine su tvirtu minkštimu idealiai tinka padažams (Sugo) ir kitiems pomidorų patiekalams. Geri restoranai naudoja jį, kad suteiktų itališkiems patiekalams lemiamą pojūtįSvilpukas. **Natūrali vieta**: **Sėkmingas auginimas:** Sultingas Brandywine su tvirtu minkštimu idealiai tinka padažams (Sugo) ir kitiems pomidorų patiekalams. Geri restoranai naudoja jį, kad suteiktų itališkiems patiekalams lemiamą pojūtįSvilpukas. **Geriausia vieta: Optimali priežiūra:** Kai tik jūsų pomidorų daigai pasieks dešimties centimetrų aukštį, jiems prireiks pagaliuko, o dieną jie gali būti lauke bent 5°C temperatūroje, kad sukietėtų. Užtikrinkite pakankamą laistymą, nes greitai išgaruoja per dabar sparčiai augančius lapus. Po ledo šventųjų gegužės viduryje augalus galima persodinti į sodo lysvę ar kibirą 75 centimetrų atstumu saulėje. Į kibirą turi tilpti ne mažiau kaip dešimt litrų žemės ir jis turi būti gerai nusausintas. Pomidorams reikia tvirtų atraminių strypų, gerai įtvirtintų žemėje, arba pomidorų spiralių iš sodo parduotuvės. Taip pat ideali vieta, apsaugota nuo lietaus ir vėjo. Numatykite tolygų laistymo režimą, prie kurio augalas gali priprasti. Nuo šiol svarbiausia priežiūros priemonė – nuolatinis antrinių ūglių perštėjimas, kad pagrindinis ūglis gautų pakankamai šviesos savo vystymuisi. Pašalinkite visus pažastinius ūglius, kurie susidaro tarp kamieno ir šakos pagrindo. Kadangi šaknų sistema iš pradžių vystosi energingai, per pirmąsias savaites matomas augimas lėtas. Trėškite ne anksčiau kaip praėjus keturioms savaitėms po pasodinimo komercinėmis pomidorų trąšomis ir po keturių savaičių antrą kartą. **Žiemą:** **Dėmesio: Pomidorai priklauso nakvišų šeimai. Augalo dalys yra nuodingos. Bet, žinoma, ne prinokusių vaisių!**



Tadam - Roża Brandywine

Lycopersicon esculentum

It-tadam tal-poplu Amish għal aktar minn 200 sena

Il-varjetà Pink Brandywine b'rendiment għoli u li jifilħu hija l-omm tal-varjanti kollha tal-Bandywine, ilha kkultivata mill-Poplu Amish għal 200 sena u tistabbilixxi l-punt tat-togħma fl-Istati Uniti li bih it-tadam kollu jrid jitkejjel. Weraq f'forma ta 'patata, fjuri kbar, u frott roża u mmerraq li jiżnu sa libbra huma trademarks tagħha. Il-Brandywine mmerraq bil-laħam sod tiegħu huwa ideali għal zlazi (Sugo) u platti oħra tat-tadam. Ir-ristoranti tajbin jużawha biex jagħtu l-mess deċiżiv lill-platti TaljaniSfafar. **Post naturali**: **Kultivazzjoni b'suċċess:** Il-Brandywine mmerraq bil-laħam sod tiegħu huwa ideali għal zlazi (Sugo) u platti oħra tat-tadam. Ir-ristoranti tajbin jużawha biex jagħtu l-mess deċiżiv lill-platti TaljaniSfafar. **L-aħjar post: Kura ottimali:** Hekk kif il-pjanti tat-tadam tiegħek ikunu laħqu għoli ta 'għaxar ċentimetri, għandhom bżonn stick bħala appoġġ u jistgħu jkunu barra matul il-ġurnata tal-inqas 5° Celsius biex jibbies. Żgura biżżejjed tisqija, peress li l-evaporazzjoni mgħaġġla sseħħ permezz tal-weraq li issa qed jiżdied b'rata mgħaġġla. Wara l-qaddisin tas-silġ f'nofs Mejju, il-pjanti jistgħu jiġu trapjantati fis-sodda tal-ġnien jew barmil f'distanza ta 'ċentimetru 75 f'xemx sħiħa. Il-barmil għandu jżomm mill-inqas għaxar litri ta 'ħamrija u jkun imsaffi sew. It-tadam jeħtieġ vireg ta 'appoġġ qawwi ankrati sew fl-art jew spirali tat-tadam mill-maħżen tal-ġnien. Post protett mix-xita u r-riħ huwa wkoll ideali. Ipprovdi reġim ta 'tisqija uniformi li l-pjanta tista' tidra. Minn issa 'l quddiem, l-aktar miżura ta' kura importanti hija t-tingiż kontinwu tar-rimjiet sekondarji sabiex ir-rimja prinċipali tirċievi biżżejjed dawl għall-iżvilupp tagħha. Neħħi kwalunkwe rimjiet axillari li jiffurmaw bejn iz-zokk u l-bażi tal-fergħa. Peress li s-sistema ta 'l-għeruq inizjalment tiżviluppa b'mod vigoruż, it-tkabbir viżibbli huwa bil-mod fl-ewwel ftit ġimgħat. Fertilizza erba 'ġimgħat wara t-tħawwil l-aktar kmieni b'fertilizzant tat-tadam disponibbli kummerċjalment u erba' ġimgħat wara t-tieni darba. **Fix-xitwa:** **Attenzjoni: It-tadam jappartjeni għall-familja nightshade. Il-partijiet tal-pjanta huma velenużi. Imma ovvjament mhux il-frott misjur!**



Tomaat - Pink Brandywine

Lycopersicon esculentum

Al meer dan 200 jaar de Amish People's tomaat

De hoogproductieve en veerkrachtige variëteit Pink Brandywine is de moeder van alle Brandywine-varianten, wordt al 200 jaar door de Amish-bevolking geteeld en bepaalt het smaakpunt in de VS waaraan alle tomaten moeten worden afgemeten. Aardappelvormige bladeren, grote bloemen en tot een pond in gewicht, rozerood en sappig fruit zijn hun handelsmerk. De sappige cognacwijn met zijn stevige vruchtvlees is uitstekend geschikt voor sauzen (Sugo) en andere tomatengerechten. Goede restauranthouders geven met hun Italiaanse gerechten het beslissende fluitsignaal. **Natuurlijke locatie**: **Succesvolle teelt:** De sappige cognacwijn met zijn stevige vruchtvlees is uitstekend geschikt voor sauzen (Sugo) en andere tomatengerechten. Goede restauranthouders geven met hun Italiaanse gerechten het beslissende fluitsignaal. **De beste locatie: Optimale verzorging:** Zodra je tomatenplanten een hoogte van tien centimeter hebben bereikt, hebben ze een staafje nodig als ondersteuning en kunnen ze overdag bij minimaal 5 ° Celsius naar buiten om uit te harden. Zorg voor voldoende water, want via het nu snel groeiende loof vindt snelle verdamping plaats. Na de ijsheiligen half mei kunnen de planten worden overgeplant in de tuinbed of in de kuip op een afstand van 75 centimeter in de volle zon. De emmer moet minstens tien liter aarde bevatten en goed worden gedraineerd. Tomaten hebben sterke steunstangen nodig die goed in de grond verankerd zijn of tomatenspiralen vanuit het tuincentrum. Een plek die beschermd is tegen regen en wind is ook ideaal. Zorg voor een uniforme watergift waaraan de plant kan wennen. De belangrijkste onderhoudsmaatregel vanaf nu is het doorlopend afschuimen van de secundaire scheuten zodat de hoofdscheut voldoende licht krijgt voor zijn ontwikkeling. Verwijder eventuele okselscheuten die zich tussen de stam en de takbasis vormen. Omdat de wortels zich aanvankelijk krachtig ontwikkelen, is de zichtbare groei de eerste weken traag. Bemest voor de eerste keer met een commerciële tomatenmest op zijn vroegst vier weken na het planten en een tweede keer na nog eens vier weken. **In de winter:** **Let op: tomaten behoren tot de nachtschadefamilie. De delen van de plant zijn giftig. Maar natuurlijk niet de rijpe vruchten!**

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Tomat - Rosa Brandywine

Lycopersicon esculentum

Tomaten til Amish-folket i mer enn 200 år

Den høyytende og hardføre sorten Pink Brandywine er mor til alle Brandywine-varianter, har blitt dyrket av Amish People i 200 år og setter smakspunktet i USA som alle tomater må måles etter. Potetformede blader, store blomster og rosa, saftige frukter som veier opp til ett kilo er hennes varemerker. Den saftige Brandywine med sitt faste kjøtt er ideell til sauser (Sugo) og andre tomatretter. Gode restauratører bruker den til å gi italienske retter det avgjørende pregetPlystre. **Naturlig beliggenhet**: **Vellykket dyrking:** Den saftige Brandywine med sitt faste kjøtt er ideell til sauser (Sugo) og andre tomatretter. Gode restauratører bruker den til å gi italienske retter det avgjørende pregetPlystre. **Den beste beliggenheten:** **Optimal omsorg:** Så snart tomatplantene dine har nådd en høyde på ti centimeter, trenger de en pinne som støtte og kan stå utendørs på dagtid ved minst 5°C for å stivne. Sørg for tilstrekkelig vanning, da rask fordampning skjer via det nå raskt økende bladverket. Etter ishelgenene i midten av mai kan plantene transplanteres inn i hagebedet eller bøtta i en avstand på 75 centimeter i full sol. Bøtta skal romme minst ti liter jord og være godt drenert. Tomater trenger sterke støttestenger forankret godt i bakken eller tomatspiraler fra hagebutikken. Et sted beskyttet mot regn og vind er også ideelt. Gi et jevnt vanningsregime som planten kan venne seg til. Fra nå av er det viktigste pleietiltaket den pågående stikkingen av sekundærskuddene slik at hovedskuddet får nok lys for sin utvikling. Fjern eventuelle aksillære skudd som dannes mellom stammen og bunnen av grenen. Siden rotsystemet i utgangspunktet utvikler seg kraftig, er synlig vekst sakte de første ukene. Gjødsle tidligst fire uker etter planting med en kommersielt tilgjengelig tomatgjødsel og fire uker senere en gang til. **Om vinteren:** **Oppmerksomhet: Tomater tilhører nattskyggefamilien. Delene av planten er giftige. Men selvfølgelig ikke den modne frukten!**



Pomidor - Różowy Brandywine

Lycopersicon esculentum

Pomidor Amiszów od ponad 200 lat

Bogata i odporna odmiana Pink Brandywine jest matką wszystkich gatunków Brandywine, a jej uprawa sięga 200 lat wstecz do ludu Amiszów. Pink Brandywine zajmuje czołowe miejsce w USA pod względem smaku i stanowi punkt odniesienia dla wszystkich innych odmian. Jego głównymi cechami charakterystycznymi są ziemniaczane liście, duże kwiaty i do jednego funta, różowoczerwone, soczyste owoce. Soczysty Pink Brandywine zawiera jędrny miąższ owocowy i doskonale nadaje się do sosów (sugo) i innych potraw z pomidorów. Dobra kuchnia restauracyjna wykorzystuje Pink Brandywine, aby nadać ostateczny akcent włoskim potrawom. **Naturalne położenie**: **Udana uprawa:** Ponieważ sadzonki pomidorów należy sadzić dopiero od połowy maja po ostatnich nocnych przymrozkach, zaleca się rozpoczęcie rozmnażania w połowie lub pod koniec marca w jasnym i ciepłym pomieszczeniu w pomieszczeniu. Pomidory kiełkują dość szybko i nie trzeba wcześniej rozpoczynać rozmnażania. Gdy temperatura na zewnątrz będzie wystarczająco wysoka, rośliny będą mocne i gotowe do sadzenia. Rozłóż nasiona w odległości około 2 cm od siebie na wilgotnym kompoście doniczkowym, nałóż niewielką ilość ziemi kompostowej i ponownie zwilż ziemię za pomocą rozpylacza wodnego. Przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby ziemia nie wyschła, ale nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° C do 24 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Pierwsze sadzonki powinny pojawić się po jednym lub dwóch tygodniach. Teraz możesz usunąć przezroczystą folię i utrzymywać kiełki w chłodzie i jak najjaśniej, ale nie w pełnym południowym słońcu. Gdy tylko sadzonki rozwiną drugą parę liści, można wykłuwać do pierwszej pary liści i sadzić kiełki w małych 10 cm doniczkach z ziemią doniczkową dla pomidorów i dołem. Dbaj o delikatne korzenie i nie zapomnij skromnie podlać świeżej gleby. możesz usunąć przezroczystą folię i utrzymywać kiełki w chłodzie i jak najjaśniejszym świetle, ale nie w pełnym południowym słońcu. Gdy tylko sadzonki rozwiną drugą parę liści, można wykłuwać do pierwszej pary liści i sadzić kiełki w małych 10-centymetrowych doniczkach z ziemią do sadzenia pomidorów i dołem. Dbaj o delikatne korzenie i nie zapomnij skromnie podlać świeżej gleby. możesz usunąć przezroczystą folię i utrzymywać kiełki w chłodzie i jak najjaśniejszym świetle, ale nie w pełnym południowym słońcu. Gdy tylko sadzonki rozwiną drugą parę liści, można wykłuwać do pierwszej pary liści i sadzić kiełki w małych 10-centymetrowych doniczkach z ziemią do sadzenia pomidorów i dołem. Dbaj o delikatne korzenie i nie zapomnij skromnie podlać świeżej gleby. **Najlepsza lokalizacja:** **Optymalna pielęgnacja:** Gdy tylko pomidor wzrośnie powyżej 10 cm, należy zapewnić drewniany patyk jako stabilizator, aw ciągu dnia można już trzymać rośliny na zewnątrz w temperaturze co najmniej 5 ° Celsjusza do aklimatyzacji. Po „Lodowych Świętych" w połowie maja można sadzić pomidory w całkowicie nasłonecznionym miejscu, w odległości około 75 cm od siebie, do grządki ogrodowej lub do większej donicy. Garnek powinien mieć co najmniej 10 litrów ziemi i dobry drenaż. Rośliny pomidora wymagają mocnej i mocno zamocowanej rozpórki lub tyczki pomidora z centrum ogrodniczego. Miejsce osłonięte od deszczu i wiatru byłoby idealne do uprawy. Podlewaj roślinę regularnie i równomiernie, aby dostosowała się do ilości podawanej wody. Najważniejszą częścią pielęgnacji jest teraz ciągłe przycinanie pędów bocznych, szczególnie między łodygą a podstawą gałęzi, tak, aby główny kiełek miał wystarczająco dużo światła i siły do rozwoju. Część nadziemna rośliny rośnie raczej wolno w pierwszych tygodniach, ponieważ pomidor jako pierwszy silnie rozwija swoje ukorzenienie. Możesz podać standardowy nawóz dla pomidorów, ale za pierwszym razem nie wcześniej niż cztery tygodnie od wysadzenia, a drugi raz kolejne cztery tygodnie później. **W zimę:** **Uwaga: pomidory należą do rodziny psiankowatych. Części roślin są trujące. Ale oczywiście nie owoce.**



Tomate - Brandywine Rosa

Lycopersicon esculentum

O tomate do povo Amish há mais de 200 anos

A variedade de alto rendimento e resistente Pink Brandywine é a mãe de todas as variantes de Brandywine, foi cultivada pelo povo Amish por 200 anos e define o ponto de sabor nos EUA pelo qual todos os tomates devem ser medidos. Folhas em formato de batata, flores grandes e frutas rosadas e suculentas de até meio quilo são suas marcas registradas. O suculento Brandywine com a sua carne firme é ideal para molhos (Sugo) e outros pratos de tomate. Bons donos de restaurantes usam-no para dar um toque decisivo aos pratos italianosAssobiar. **Localização natural**: **Cultivo bem sucedido:** O suculento Brandywine com a sua carne firme é ideal para molhos (Sugo) e outros pratos de tomate. Bons donos de restaurantes usam-no para dar um toque decisivo aos pratos italianosAssobiar. **A melhor localização:** **Cuidado ideal:** Assim que seus pés de tomate atingirem dez centímetros de altura, eles precisam de um pedaço de pau para se apoiar e podem ficar ao ar livre durante o dia a pelo menos 5° Celsius para endurecer. Garanta rega suficiente, pois a rápida evaporação ocorre através da folhagem que agora cresce rapidamente. Após os santos do gelo em meados de maio, as plantas podem ser transplantadas para o canteiro ou balde a uma distância de 75 centímetros a pleno sol. O balde deve conter pelo menos dez litros de solo e ser bem drenado. Os tomates precisam de hastes de suporte fortes bem ancoradas no solo ou espirais de tomate da loja de jardinagem. Um local protegido da chuva e do vento também é o ideal. Forneça um regime de rega uniforme ao qual a planta possa se acostumar. A partir de agora, o cuidado mais importante é a picada contínua dos brotos secundários para que o broto principal receba luz suficiente para seu desenvolvimento. Remova quaisquer brotos axilares que se formem entre o tronco e a base do galho. Como o sistema radicular inicialmente se desenvolve vigorosamente, o crescimento visível é lento nas primeiras semanas. Fertilize quatro semanas após o plantio, no mínimo, com um fertilizante de tomate disponível comercialmente e quatro semanas depois uma segunda vez. **No inverno:** **Atenção: Os tomates pertencem à família das beladonas. As partes da planta são venenosas. Mas claro que não a fruta madura!**



Tomate - Brandywine Roz

Lycopersicon esculentum

Roșia poporului Amish de mai bine de 200 de ani

Soiul cu randament ridicat și rezistent Pink Brandywine este mama tuturor variantelor Brandywine, a fost cultivat de poporul Amish de 200 de ani și stabilește punctul de gust din SUA față de care trebuie să fie măsurate toate roșiile. Frunzele în formă de cartof, florile mari și până la o kilogramă în greutate, fructele roz-roșii și suculente sunt marca lor comercială. Brandywine-ul suculent, cu pulpa sa fermă, este minunat potrivit pentru sosuri (Sugo) și alte feluri de mâncare cu roșii. Cu mâncărurile lor italiene, restauratorii buni le oferă acel avantaj decisiv. **Locație naturală**: **Cultivare de succes:** Brandywine-ul suculent, cu pulpa sa fermă, este minunat potrivit pentru sosuri (Sugo) și alte feluri de mâncare cu roșii. Cu mâncărurile lor italiene, restauratorii buni le oferă acel avantaj decisiv. **Cea mai bună locație:** **Îngrijire optimă:** De îndată ce plantele de roșii au atins o înălțime de zece centimetri, au nevoie de o tijă ca suport și pot ieși în timpul zilei cu cel puțin 5 ° C pentru a se întări. Asigurați-vă că aveți suficientă udare, deoarece frunzele, care acum cresc rapid, provoacă evaporarea rapidă. După sfinții de gheață de la mijlocul lunii mai, plantele pot fi transplantate în patul de grădină sau în cadă la o distanță de 75 de centimetri în plin soare. Găleată trebuie să conțină cel puțin zece litri de sol și să fie bine drenată. Roșiile au nevoie de tije de sprijin puternice, care sunt bine ancorate în pământ sau spirale de roșii din centrul grădinii. Un loc protejat de ploaie și vânt este, de asemenea, ideal. Asigurați-vă că udarea este uniformă cu care se poate obișnui planta. Cea mai importantă măsură de întreținere de acum încolo este derularea continuă a lăstarilor secundari, astfel încât lăstarul principal să primească suficientă lumină pentru dezvoltarea sa. Îndepărtați orice lăstari axilari care se formează între trunchi și baza ramurii. Deoarece rădăcinile se dezvoltă viguros la început, creșterea vizibilă este lentă în primele câteva săptămâni. Fertilizați pentru prima dată cu un îngrășământ comercial cu roșii la patru săptămâni după plantare cel mai devreme și a doua oară după alte patru săptămâni. **În iarnă:** **Atenție: roșiile fac parte din familia Nightshade. Părțile plantei sunt otrăvitoare. Dar, desigur, nu fructele coapte!**

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Tomat - Pink Brandywine

Lycopersicon esculentum

Amish People's tomat i mer än 200 år

Den högavkastande och elastiska sorten Pink Brandywine är mor till alla Brandywine-varianter, har odlats av Amish-folket i 200 år och sätter smakpunkten i USA mot vilken alla tomater måste mätas. Potatisformade löv, stora blommor och upp till ett pund i vikt, rosa-röda och saftiga frukter är deras varumärke. Den saftiga Brandywine med sin fasta massa är underbart lämplig för såser (Sugo) och andra tomaträtter. Med sina italienska rätter ger bra restauratörer dem den avgörande kanten. **Naturligt läge**: **Framgångsrik odling:** Den saftiga Brandywine med sin fasta massa är underbart lämplig för såser (Sugo) och andra tomaträtter. Med sina italienska rätter ger bra restauratörer dem den avgörande kanten. **Den bästa platsen:** **Optimal vård:** Så snart dina tomatplanter har nått en höjd av tio centimeter behöver de en stav som stöd och kan gå ut under dagen vid minst 5 ° C för att härda. Se till att du har tillräcklig vattning, eftersom lövverket, som nu ökar snabbt, orsakar snabb avdunstning. Efter ishelgarna i mitten av maj kan växterna transplanteras i trädgårdsbädden eller i badkaret på ett avstånd av 75 centimeter i full sol. Skopan ska rymma minst tio liter jord och vara väl dränerad. Tomater behöver starka stödstänger som är väl förankrade i marken eller tomatspiraler från trädgårdscentret. En plats skyddad från regn och vind är också perfekt. Se till att vattningen är enhetlig som växten kan vänja sig vid. Den viktigaste underhållsåtgärden från och med nu är den pågående skumningen av sekundära skott så att huvudskottet får tillräckligt med ljus för sin utveckling. Ta bort eventuella axillära skott som bildas mellan bagageutrymmet och grenbasen. Eftersom rötterna utvecklas kraftigt först är den synliga tillväxten långsam under de första veckorna. Gödsla tidigast fyra veckor efter plantering för första gången med ett kommersiellt tillgängligt tomatgödselmedel och efter ytterligare fyra veckor en andra gång. **På vintern:** **Varning: Tomater är en del av nattskuggfamiljen. Växtens delar är giftiga. Men naturligtvis inte de mogna frukterna!**



Paradajkovo - ružové brandyvíno

Lycopersicon esculentum

Paradajka Amishov už viac ako 200 rokov

Vysokoúrodná a odolná odroda Pink Brandywine je matkou všetkých variantov Brandywine, pestujú ju Amish People už 200 rokov a v USA určuje chuťový bod, ktorým sa musia merať všetky paradajky. Listy v tvare zemiaka, veľké kvety a ružové, šťavnaté plody vážiace až pol kila sú jej poznávacími znakmi. Šťavnaté Brandywine s pevnou dužinou je ideálne do omáčok (Sugo) a iných paradajkových jedál. Dobrí reštaurátori ho používajú na to, aby talianskym jedlám dodali rozhodujúci nádychZapískať. **Prirodzená poloha**: **Úspešná kultivácia:** Šťavnaté Brandywine s pevnou dužinou je ideálne do omáčok (Sugo) a iných paradajkových jedál. Dobrí reštaurátori ho používajú na to, aby talianskym jedlám dodali rozhodujúci nádychZapískať. **Najlepšie umiestnenie:** **Optimálna starostlivosť:** Akonáhle vaše paradajkové rastliny dosiahnu výšku desať centimetrov, potrebujú palicu na oporu a môžu byť vonku počas dňa pri minimálne 5° Celzia, aby stvrdli. Zabezpečte dostatočnú zálievku, pretože cez teraz rýchlo pribúdajúce lístie dochádza k rýchlemu vyparovaniu. Po ľadových svätcoch v polovici mája možno rastliny presadiť do záhradného záhona alebo vedra vo vzdialenosti 75 centimetrov na plné slnko. Vedro by malo obsahovať aspoň desať litrov zeminy a malo by byť dobre odvodnené. Paradajky potrebujú silné oporné tyče dobre ukotvené v zemi alebo paradajkové špirály zo záhradníctva. Ideálne je aj miesto chránené pred dažďom a vetrom. Zabezpečte rovnomerný režim zavlažovania, na ktorý si rastlina môže zvyknúť. Odteraz je najdôležitejším opatrením starostlivosti priebežné štípanie vedľajších výhonkov, aby hlavný výhonok dostával dostatok svetla pre svoj vývoj. Odstráňte všetky axilárne výhonky, ktoré sa tvoria medzi kmeňom a základňou vetvy. Keďže koreňový systém sa spočiatku intenzívne vyvíja, viditeľný rast je v prvých týždňoch pomalý. Hnojte najskôr štyri týždne po výsadbe komerčne dostupným hnojivom na paradajky a o štyri týždne neskôr druhýkrát. **V zime:** **Pozor: Paradajky patria do čeľade nočných. Časti rastliny sú jedovaté. Ale samozrejme nie zrelé ovocie!**



Paradižnik - Pink Brandywine

Lycopersicon esculentum

Paradižnik Amišev že več kot 200 let

Visoko donosna in trpežna sorta Pink Brandywine je mati vseh variant Brandywine, gojijo jo Amiši že 200 let in določa okusno točko v ZDA, po kateri je treba meriti vse paradižnike. Krompirjasti listi, veliki cvetovi in rožnati, do pol kilograma težki sočni plodovi so njen zaščitni znak. Sočno Brandywine s čvrstim mesom je idealno za omake (Sugo) in druge paradižnikove jedi. Dobri gostinci z njim dajejo italijanskim jedem odločilen pečatPiščalka. **Naravni habitat**: **Navodila za gojenje:** Sočno Brandywine s čvrstim mesom je idealno za omake (Sugo) in druge paradižnikove jedi. Dobri gostinci z njim dajejo italijanskim jedem odločilen pečatPiščalka. **Najboljša lokacija:** **Optimalna nega:** Takoj, ko vaše rastline paradižnika dosežejo višino deset centimetrov, potrebujejo palico za oporo in so lahko čez dan na prostem pri vsaj 5°C, da se utrdijo. Poskrbite za zadostno zalivanje, saj hitro izhlapevanje poteka preko sedaj hitro rastočega listja. Po ledenih svetnikih sredi maja lahko rastline presadimo v gredico ali vedro na razdaljo 75 centimetrov na polnem soncu. Vedro naj vsebuje vsaj deset litrov zemlje in mora biti dobro odcedno. Paradižnik potrebuje močne oporne palice, dobro zasidrane v tla, ali paradižnikove spirale iz vrtne trgovine. Idealen je tudi prostor, zaščiten pred dežjem in vetrom. Zagotovite enakomeren režim zalivanja, na katerega se lahko rastlina navadi. Odslej je najpomembnejši negovalni ukrep sprotno žganje sekundarnih poganjkov, da dobi glavni poganjek dovolj svetlobe za svoj razvoj. Odstranite vse aksilarne poganjke, ki nastanejo med deblom in dnom veje. Ker se koreninski sistem na začetku močno razvija, je vidna rast v prvih nekaj tednih počasna. Gnojite najprej štiri tedne po sajenju s komercialno dostopnim gnojilom za paradižnike in štiri tedne pozneje drugič. **V zimskem času:** **Pozor: paradižnik spada v družino nočnih senčnikov. Deli rastline so strupeni. A seveda ne zrelega sadja!**



Tomate - Brandywine

Lycopersicon esculentum

El tomate de las personas amish desde más de 200 años

La variedad brandywine rosa es resistente, muy productiva y la madre de todas las variedades brandywine. Se cultiva desde hace más de 200 años por la población amish y pone el punto de sabor por el que todos los tomates en EEUU se deben medir. Sus hojas tienen forma de patata, tiene flores grandes y jugosos frutos de color rojo rosado, y un peso de hasta una libra. Estas son sus características. La sabrosa variedad brandywine con su pulpa fuerte, es ideal para salsas (Sugo) y otras recetas de pasta. Los buenos cocineros dan, con esta variedad, un toque decisivo a sus recetas italianas. **Ubicación natural**: **Cultivo exitoso:** El tomate se debe plantar a partir de mayo cuando ya no se esperen heladas nocturnas, por lo que se empieza a cultivar de mediados a finales de marzo, en un lugar luminoso y cálido. Los tomates brotan rápido por lo que no es necesario empezar a cultivarlos antes. Cuando las temperaturas en el jardín son cálidas las plántulas estarán lo suficientemente fuertes para ser trasplantadas en el exterior. Esparza las semillas sobre sustrato húmedo, con una distancia de dos centímetros y cúbralas ligeramente con el mismo sustrato. Mantenga el sustrato húmedo pero no mojado, por lo que se recomienda rociarlo. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 24 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. A las dos a tres semanas aparecerán las primeras plántulas. Retire la cobertura del recipiente y mantenga las plántulas en un espacio muy luminoso (pero sin sol directo al medio día) y algo más fresco, para que no amarillen las plántulas. En cuanto se desarrolle el segundo par de hojas se pueden trasplantar los plantones individualmente, en un macetero de 10 centímetros con el fondo agujereado y tierra para el cultivo de tomates. Preste atención de no dañar las raíces finas y riegue la tierra ligeramente. **La mejor ubicación:** **Cuidado óptimo:** Una vez que la planta de tomate haya alcanzado una altura de diez centímetros, necesitará una vara como soporte y puede permanecer en exterior durante el día con al menos 5 grados, para hacerles más resistentes. A mediados de mayo puede trasplantar las plantas con una distancia de 75 centímetros entre sí, en un lugar soleado en el jardín, en un arriate o en maceta. El macetero debe tener una capacidad de al menos diez litros de tierra y tener drenaje. Los tomates necesitan unos soportes bien anclados en el suelo. El lugar óptimo es protegido del viento y de la lluvia. Asegúrese de que haya uniformidad en el riego, al que se puede acostumbrar la planta. La medida más importante de cuidado a partir de ahora, es el eliminar los brotes nuevos laterales para que el brote principal reciba suficiente luz para su desarrollo. Durante las primeras semanas se desarrollan las raíces, por lo que no se aprecia a penas desarrollo superficial. Elimine cualquier brote axilar que se forma entre el vástago y el enfoque rama. Dado que inicialmente el desarrollo de la planta es más fuerte en el sistema de raíces, en la parte visible el crecimiento es más lento. Suministrele fertilizante para tomates como muy temprano a las cuatro semanas de trasplantar en exterior por primera vez y la segunda a otras cuatro semanas. **En el invierno:** **Advertencia: Los tomates pertenecen a las solanáceas. ¡Todas las partes de la planta son venenosas, por supuesto excepto el fruto maduro!**

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Rajče - růžové brandywine
Lycopersicon esculentum
Rajče Amishů již více než 200 let

Vysoce výnosná a odolná odrůda Pink Brandywine je matkou všech variant Brandywine, pěstují ji Amish People již 200 let a v USA nastavuje chuťový bod, kterým se musí měřit všechna rajčata. Bramborové listy, velké květy a růžové, šťavnaté plody vážící až kilo jsou její ochranné známky. Šťavnaté Brandywine s pevnou dužinou je ideální do omáček (Sugo) a dalších rajčatových pokrmů. Dobří restauratéři jím dodávají italským pokrmům rozhodující nádechPískat. **Přirozená poloha**: **Úspěšné pěstování:** Šťavnaté Brandywine s pevnou dužinou je ideální do omáček (Sugo) a dalších rajčatových pokrmů. Dobří restauratéři jím dodávají italským pokrmům rozhodující nádechPískat. **Nejlepší umístění:** **Optimální péče:** Jakmile vaše rostliny rajčat dosáhnou výšky deseti centimetrů, potřebují klacek na oporu a mohou být venku přes den alespoň při 5° Celsia, aby ztvrdly. Zajistěte dostatečné zavlažování, protože díky nyní rychle rostoucímu listí dochází k rychlému odpařování. Po ledových svatých v polovině května lze rostliny přesadit do zahradního záhonu nebo kbelíku ve vzdálenosti 75 centimetrů na plné slunce. Kbelík by měl pojmout alespoň deset litrů zeminy a měl by být dobře odvodněný. Rajčata potřebují silné podpůrné tyče dobře ukotvené v zemi nebo rajčatové spirálky ze zahradnictví. Ideální je také místo chráněné před deštěm a větrem. Zajistěte rovnoměrný režim zavlažování, na který si rostlina může zvyknout. Od nynějška je nejdůležitějším opatřením péče průběžné bodání vedlejších výhonů, aby hlavní výhon dostal dostatek světla pro svůj vývoj. Odstraňte všechny axilární výhonky, které se tvoří mezi kmenem a základnou větve. Protože se kořenový systém zpočátku vyvíjí bujně, viditelný růst je v prvních týdnech pomalý. Hnojte nejdříve čtyři týdny po výsadbě komerčně dostupným hnojivem na rajčata a po čtyřech týdnech podruhé. **V zimě:** **Pozor: Rajčata patří do čeledi hluchavkovitých. Části rostliny jsou jedovaté. Ale samozřejmě ne zralé ovoce!**



Domates - Pembe Brandywine
Lycopersicon esculentum
200 yılı aşkın süredir Amish halkının domatesi

Yüksek verimli ve dayanıklı Pink Brandywine çeşidi, tüm Brandywine çeşitlerinin anasıdır, Amish Halkı tarafından 200 yıldır yetiştirilmektedir ve ABD'de tüm domateslerin ölçülmesi gereken lezzet noktasını belirlemektedir. Patates şeklindeki yapraklar, büyük çiçekler ve bir pound ağırlığa sahip pembe, sulu meyveler onun alamet-i farikasıdır. Sert etli sulu Brandywine, soslar (Sugo) ve diğer domates yemekleri için idealdir. İyi restorancılar, İtalyan yemeklerine belirleyici bir dokunuş vermek için kullanırlar.Islık. **Doğal konum**: **Başarılı yetiştirme:** Sert etli sulu Brandywine, soslar (Sugo) ve diğer domates yemekleri için idealdir. İyi restorancılar, İtalyan yemeklerine belirleyici bir dokunuş vermek için kullanırlar.Islık. **En iyi konum:** **Optimum bakım:** Domates bitkileriniz on santimetre yüksekliğe ulaşır ulaşmaz, destek için bir çubuğa ihtiyaç duyarlar ve sertleşmek için gün boyunca en az 5°C'de açık havada kalabilirler. Hızlı buharlaşma artık hızla artan yapraklar aracılığıyla gerçekleştiğinden, yeterli sulama sağlayın. Mayıs ortasındaki buz azizlerinden sonra, bitkiler tam güneşte 75 santimetre mesafedeki bahçe yatağına veya kovaya ekilebilir. Kova en az on litre toprak tutmalı ve iyi drene edilmelidir. Domatesler, zemine iyice sabitlenmiş güçlü destek çubuklarına veya bahçe deposundan domates spirallerine ihtiyaç duyar. Yağmur ve rüzgardan korunan bir yer de idealdir. Bitkinin alışabileceği eşit bir sulama rejimi sağlayın. Şu andan itibaren en önemli bakım önlemi, ana sürgünün gelişmesi için yeterli ışığı alması için ikincil sürgünlerin sürekli batmasıdır. Gövde ile dalın tabanı arasında oluşan koltuk altı sürgünlerini çıkarın. Kök sistemi başlangıçta güçlü bir şekilde geliştiğinden, ilk birkaç haftada görünür büyüme yavaştır. Dikimden dört hafta sonra en erken piyasada bulunan bir domates gübresi ile ve dört hafta sonra ikinci kez gübreleyin. **Kışın:** **Dikkat: Domatesler, itüzümügiller familyasına aittir. Bitkinin kısımları zehirlidir. Ama tabii ki olgun meyve değil!**



Paradicsom - Pink Brandywine
Lycopersicon esculentum
Az amishok paradicsoma több mint 200 éve

A magas hozamú és szívós Pink Brandywine fajta az összes Brandywine változat anyja, amelyet az Amish People 200 éve termeszt, és meghatározza azt az ízpontot az USA-ban, amelyhez minden paradicsomot mérni kell. A burgonya alakú levelek, a nagy virágok és a rózsaszín, lédús, akár egy kilogramm súlyú gyümölcsök a védjegyei. **Természetes elhelyezkedés**: **Sikeres termesztés:** A lédús, kemény húsú Brandywine ideális szószokhoz (Sugo) és más paradicsomos ételekhez. A jó vendéglősök használják, hogy az olasz ételek döntő hatását adjákSíp. **A legjobb hely:** **Optimális gondozás:** Amint a paradicsomnövényei elérik a tíz centiméteres magasságot, botra van szükségük, hogy megtámasztják őket, és napközben legalább 5 Celsius-fokon a szabadban lehetnek, hogy megkeményedjenek. Biztosítson elegendő öntözést, mivel a mostanra gyorsan növekvő lombozaton keresztül gyors párolgás történik. A május közepén esedékes jégszentek után a növényeket 75 centiméteres távolságra, teljes napon át lehet ültetni a kerti ágyásba vagy vödörbe. A vödörnek legalább tíz liter talajnak kell lennie, és jól le kell eresztenie. A paradicsomnak erős támasztórudakra van szüksége, amelyeket jól rögzítenek a talajba, vagy paradicsomspirálokat a kerti boltból. Ideális az esőtől és széltől védett hely is. Biztosítson egyenletes öntözési rendszert, amelyhez a növény megszokhatja. Ezentúl a legfontosabb gondozási intézkedés a másodlagos hajtások folyamatos csípése, hogy a főhajtás elegendő fényt kapjon a fejlődéséhez. Távolítson el minden hónaljhajtást, amely a törzs és az ág alapja között képződik. Mivel a gyökérrendszer kezdetben erőteljesen fejlődik, a látható növekedés az első hetekben lassú. Az ültetés után legkorábban négy héttel műtrágyázzon kereskedelmi forgalomban kapható paradicsomműtrágyával, majd négy héttel később másodszor. **Télen:**

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved

ピンク・ブランディワイン

Lycopersicon esculentum

200年の歴史をもつアーミッシュのトマト

豊かで快活なピンク・ブランディワインはブランディワイン種の元となるもので、200年以上前からアーミッシュによって栽培されていました。ピンク・ブランディワインは米国で最も好まれる味で、他のすべての品種の基準となっています。ジャガイモの様な形の葉を持ち大きな花、重さ最大約450gのピンク色 - 赤色のジューシーな実が特徴です。
ジューシーでしっかりとした果肉はソースやその他様々なトマト料理に適しています。レストランではピンク・ブランディワインを仕上げとしてイタリア料理に加えます。

自然な場所:

栽培成功:
霜が降りなくなった5月中旬に定植するべきで、3月中旬または下旬には明るく暖かい屋内で栽培を開始するのがよいでしょう。かなり早く発芽するので、これ以前に栽培を開始する必要はありません。屋外の気温が十分に高くなったら植え付けの準備が整います。種を約2cm間隔で湿った栽培用土に広げ、少量の用土を被せ水をスプレーして土壌を湿らせます。サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20℃ー24℃の明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常は約1ー2週間後に発芽します。ここで透明フィルムを取外して、涼しくできるだけ明るい場所に保管します。しかし日中の強い陽射し避けてください。第二の対の葉が形成されたら、10㎝の大きさの底に水はけ用の穴のある鉢に植え替えます。根は繊細なので丁寧に扱い、新しい土壌に適度な水分を与える事を忘れないで下さい。

最高のロケーション:

最適なケア:
苗が10㎝の大きさになったら、安定のために木製の支柱を用意します。そして最低でも5℃の屋外に苗を保管して順応させます。寒の戻りの後の5月中旬には苗を75㎝間隔で庭や大きな鉢に植え、日当たりの良い場所で保管することができます。鉢には10リットルの水はけのよい土壌が必要です。トマトの苗にはガーデンセンターなどで販売している、しっかりとした支柱が必要です。栽培には雨に当たらない防風された場所が理想的です。水を定期的に均等に与えることにより、その水の量に適応するようになります。この時点での大切な手入れはサイドシュート、特に茎と枝の基部の定期的な剪定です。それにより、苗が十分な光を得ることができ強く成長します。トマトは最初に根を強く発達させるので、苗の地上部分の成長は最初の数週間は遅くなります。トマトの苗には定植して4週間目以降から標準的な肥料を与えることができます、二回目の施肥はそのまた4週間後に行ってください。

冬に:

注意：トマトはナイトシェードに属し 植物の一部は有毒です。 果実は安全です。

SKU: 13424 / Tomate - Pink Brandywine

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved